

Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial Tabellenanhang

Ergebnisbericht

Im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial Tabellenanhang

Ergebnisbericht

Autorin/Autor:

Julian Strizek
Tanja Schwarz

Fachliche Begleitung:

Franz Pietsch
Claudia Rafling
Raphael Bayer

Projektassistenz:

Monika Löbau

Die Inhalte dieser Publikation geben den Standpunkt der Autorin / des Autors und nicht unbedingt jenen des Auftraggebers wieder.

Wien, im April 2021

Im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Zitiervorschlag: Strizek, Julian; Schwarz, Tanja (2021): Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial. Tabellenanhang. Gesundheit Österreich, Wien

Zl. P4/11/4760

Eigentümerin, Herausgeberin und Verlegerin: Gesundheit Österreich GmbH,
Stubenring 6, 1010 Wien, Tel. +43 1 515 61, Website: www.goeg.at

Dieser Bericht trägt zur Umsetzung der Agenda 2030 bei – insbesondere zum Nachhaltigkeitsziel (SDG) 3, „Gesundheit und Wohlbefinden“, sowie zu den Unterzielen SDG 3.5 (Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken) sowie SDG 3.a (Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern nach Bedarf stärken).

Der Umwelt zuliebe:

Dieser Bericht ist auf chlorfrei gebleichtem Papier ohne optische Aufheller hergestellt.

Kurzfassung

Hintergrund

Prävalenzschätzungen auf Basis von Bevölkerungsbefragungen (auf Englisch: general population surveys, GPS) sind ein wichtiger Bestandteil des Suchtmonitorings. Die „Österreichische Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial 2020“ ist die umfassendste bundesweite Erhebung suchtrelevanter Konsum- und Verhaltensweisen sowie von Einstellungen gegenüber suchtrelevanten Fragestellungen und bietet umfassendes Datenmaterial zu den Themenbereichen Alkohol, Tabak und verwandte Produkte, illegale psychoaktive Substanzen, Medikamente, Teilnahme an Glücksspielen sowie Nutzung von Computerspielen (Ergebnisse zu Glücksspiel werden in einem eigenen Bericht publiziert). Durch die zufällige Koinzidenz der Erhebung mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie in Österreich wurden in ihrem Rahmen zudem Daten zu Veränderungen suchtspezifischer/suchtrelevanter/suchtbezogener Verhaltensweisen infolge der Pandemie erhoben.

Methode

Zielgruppe dieser Erhebung ist die österreichische Wohnbevölkerung ab 15 Jahren. Methodisch und inhaltlich vergleichbare Erhebungen wurden bereits in den Jahren 2004, 2008 und 2015 durchgeführt. Aufgrund der Kontakteinschränkungen infolge der Corona-Pandemie musste die Erhebungsmethode kurzfristig in eine reine Onlineerhebung abgeändert werden. Erstmals wurden heuer alle Teilnehmer/-innen der ersten Erhebungswelle (April bis Juni) auch zur Teilnahme an einer zweiten Erhebungswelle (September bis Oktober) eingeladen. Die Stichprobe der ersten Erhebungswelle umfasst gültige Angaben von 5.963 Personen (Beteiligungsrate = 55 %), die Stichprobe der zweiten Erhebungswelle 3.289 Angaben (Beteiligungsquote von 39 %). Die Datensätze aus den beiden Erhebungswellen wurden jeweils separat so gewichtet, dass sie nach den Variablen Alter und Geschlecht einer repräsentativen Auswahl der österreichischen Wohnbevölkerung entsprechen.

Ergebnisse

Der vorliegende Tabellenanhang bietet umfassende und ergänzende Auswertungen zu den im Forschungsbericht dargestellten Ergebnissen. Dazu werden alle Variablen beider Erhebungswellen nach Geschlecht, nach Alter (drei Kategorien: 15–34 Jahre, 35–64 Jahre und 65 Jahre oder älter) sowie nach dem höchsten Bildungsabschluss (drei Kategorien: Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, tertiärer Bildungsabschluss) dargestellt.

Schlüsselwörter

Bevölkerungsbefragung, Alkohol, Tabak, Cannabis, illegale Drogen, Computerspiele, Corona

Summary

Background

Prevalence estimates based on general population surveys (GPS) are a central component for the monitoring of addictive behaviour. The “Austrian Representative Survey on Addictive Behaviours 2020” is the most comprehensive nationwide survey on addictive behaviours and also covers attitudes towards alcohol, tobacco, illicit psychoactive substances, medications, and gambling. Due to the timely coincidence of the survey with the first wave of the Corona pandemic in Austria (April to June 2020), data on short time changes in behaviour as a result of the pandemic were also collected.

Methods

The target group of this survey is the resident population of Austria aged 15 years and older. Methodologically comparable surveys have already been conducted in 2004, 2008 and 2015, thus enabling trend analyses over a period of sixteen years. Due to physical distancing measures as a result of the Corona pandemic, data was collected using an online survey. Respondents were randomly selected from a pre-existing representative panel. All participants of the first survey wave (April to June) were also invited to take part in a second survey wave (September to October). The sample of the first survey wave includes valid data from 5,963 persons (response rate = 55 %), the sample of the second survey wave includes valid data from 3,289 respondents (response rate = 39 %). The data sets from the two survey waves were each weighted separately so that they correspond to a representative sample of the Austrian resident population according to the variables age and gender.

Findings

This appendix offers comprehensive and supplementary information to the results presented in the research report. For this purpose, all variables of both survey waves are presented by gender, by age (three categories: 15–34 years, 35–64 years and 65 years or older) as well as by the highest educational attainment (three categories: lower secondary education, upper secondary education, tertiary education).

Keywords

general population survey, substance use, gambling, gaming, addictive behaviour

Inhalt

Kurzfassung	III
Summary	IV
Tabellen	VI
Bedeutung der Spaltenbezeichnungen.....	XXIII
1 Einleitung	1
2 Soziodemografie und Angaben zur Person	2
3 Auswirkungen der Corona-Pandemie	20
4 Nikotinkonsum	24
5 Alkoholkonsum	50
6 Schlaf- und Beruhigungsmittel.....	97
7 Cannabis	106
8 Andere illegale Substanzen	134
9 Neue psychoaktive Substanzen	140
10 Computerspiele	142
11 Risikoeinschätzung.....	151
12 Wissen zu Jugendschutz	158

Tabellen

Tabelle 2.1: Ihr Geschlecht?	2
Tabelle 2.2: sd2_rec Alterskategorien (5 Jahresstufen).....	2
Tabelle 2.3: sd2_rec2 Alterskategorien (grobe Kategorien)	2
Tabelle 2.4: sd4 Haben Sie eine fixe Partnerin / einen fixen Partner?	3
Tabelle 2.5: sd5 Was ist Ihr derzeitiger Familienstand?.....	3
Tabelle 2.6: sd6 Wie viele Personen leben derzeit in Ihrem Haushalt (inklusive Ihrer selbst)?	4
Tabelle 2.7: sd6_opn Anzahl der Personen, die im Haushalt leben, inklusive Ihrer selbst:	4
Tabelle 2.8: sd7 Anzahl der Personen unter 18 Jahren.....	4
Tabelle 2.9: sd8 Welche dieser Kategorien beschreibt am besten Ihre Wohnumgebung?.....	5
Tabelle 2.10: sd9 In welchem Bundesland haben Sie Ihren Lebensmittelpunkt?	5
Tabelle 2.11: sd10 Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?.....	6
Tabelle 2.12: sd10_rec Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? (kategorisiert)	6
Tabelle 2.13: sd11 Sind Sie derzeit berufstätig oder nicht berufstätig?	7
Tabelle 2.14: sd12 Welche der folgenden Kategorien beschreibt am besten Ihre derzeitige berufliche Tätigkeit?	7
Tabelle 2.15: sd13 Wenn Sie derzeit nicht berufstätig sind, so sind Sie derzeit	8
Tabelle 2.16: sd14 Waren Sie in der Vergangenheit berufstätig?	8
Tabelle 2.17: sd15 Welche der folgenden Kategorien beschreibt am besten Ihre letzte berufliche Tätigkeit?.....	9
Tabelle 2.18: sd16a Hatte die Corona-Krise irgendwelche Auswirkungen auf Ihrer Arbeitstätigkeit? (Mehrfachantworten möglich)	10
Tabelle 2.19: sd17 Wie hoch ist das derzeitige monatliche Nettoeinkommen in Ihrem Haushalt?	11
Tabelle 2.20: sd18 Hat sich infolge der Corona-Krise ihr Haushaltseinkommen verändert? Falls ja, wie hoch war dieses monatliche Nettoeinkommen vor Ausbruch der Corona-Krise?	12
Tabelle 2.21: sd18_ Veränderung im Haushaltseinkommen seit der Corona-Krise (berechnet aus sd17 und sd18)	12
Tabelle 2.22: sd19 Leiden Sie unter einer der folgenden chronischen Erkrankungen? (kategorisiert)	13
Tabelle 2.23: sd19a Leiden Sie unter einer der folgenden chronischen Erkrankungen?	13

Tabelle 2.24: sd20 Was ist Ihre Religionszugehörigkeit, bzw. welcher Glaubensrichtung fühlen Sie sich zugehörig?	14
Tabelle 2.25: WELLE 2: s0a Beginnen wir mit dem Thema Ernährung. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung?.....	14
Tabelle 2.26: WELLE 2: s0b Betreiben Sie Ausdauersport (z. B. Laufen, Radfahren, Fitnessstudio, Schwimmen, Wandern) oder nicht?	15
Tabelle 2.27: WELLE 2: s1 Wie viele Menschen stehen Ihnen so nahe, dass Sie sich auf sie verlassen können, wenn Sie ernste persönliche Probleme haben? Sowohl Familienmitglieder als auch andere Personen (Freundinnen/Freunde, Nachbarinnen/Nachbarn, Kolleginnen/Kollegen etc.) sind zu zählen.....	15
Tabelle 2.28: WELLE 2: s2 Wie viel Interesse und emotionale Anteilnahme zeigen andere Menschen an dem, was Sie tun? Bitte treffen Sie eine Auswahl zwischen 1 (viel) und 5 (gar nicht).....	16
Tabelle 2.29: WELLE 2: s3 Wie einfach ist es für Sie, praktische Hilfe von Nachbarinnen/Nachbarn zu erhalten, wenn Sie diese benötigen? Bitte treffen Sie eine Auswahl zwischen 1 (sehr einfach) und 5 (sehr schwierig).	16
Tabelle 2.30: WELLE 2: s4 Wie oft haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen an Geselligkeit mangelt?.....	16
Tabelle 2.31: WELLE 2: s5 Wie oft haben Sie das Gefühl, ausgeschlossen zu sein?	17
Tabelle 2.32: WELLE 2: s6 Wie oft fühlen Sie sich von anderen isoliert?	17
Tabelle 2.33: WELLE 2: s7a Haben Sie Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren betreffende Betreuungspflichten?.....	17
Tabelle 2.34: WELLE 2: s7a_x Haben Sie Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren betreffende Betreuungspflichten? Ja, Anzahl der Kinder	17
Tabelle 2.35: s8 Haben Sie sonst private Betreuungspflichten gegenüber anderen Personen, die auf Ihre Hilfe angewiesen sind (z. B. Ältere oder Gebrechliche oder Menschen mit physischen oder kognitiven Einschränkungen)?	18
Tabelle 2.36: WELLE 2: s9 Haben sich Ihre Betreuungspflichten gegenüber Kindern oder sonstigen Personen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie verändert?	18
Tabelle 2.37: WELLE 2: s10 Sind Sie derzeit berufstätig (zumindest in Teilzeit)?.....	18
Tabelle 2.38: WELLE 2: s11 Aus heutiger Sicht: Hatte die Corona-Krise irgendwelche negativen Auswirkungen auf Ihre Arbeitstätigkeit?	19
Tabelle 3.1: c1a Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein psychisches Wohlbefinden deutlich verschlechtert (z. B. aus Angst vor einer Ansteckung, aus Sorge um nahestehende Menschen).....	20
Tabelle 3.2: c1b Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich meine Arbeits- und Einkommenssituation deutlich verschlechtert (z. B. Sorge um meinen Arbeitsplatz, arbeitslos geworden, in Kurzarbeit, ich habe jetzt ein deutlich geringeres Einkommen).....	20

Tabelle 3.3: c1c Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein soziales Wohlbefinden deutlich verschlechtert (z. B. durch Einsamkeit, fehlende Kontakte zu wichtigen Menschen, intensive Betreuungsaufgaben).....	21
Tabelle 3.4: c1d Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein Leben insgesamt deutlich verschlechtert.	21
Tabelle 3.5: WELLE 2: c1a Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein psychisches Wohlbefinden deutlich verschlechtert (z. B. aus Angst vor einer Ansteckung, aus Sorge um nahestehende Menschen).....	22
Tabelle 3.6: WELLE 2: c1b Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich meine Arbeits- und Einkommenssituation deutlich verschlechtert (z. B. Sorge um meinen Arbeitsplatz, arbeitslos geworden, in Kurzarbeit, ich habe jetzt ein deutlich geringeres Einkommen).....	22
Tabelle 3.7: WELLE 2: c1c Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein soziales Wohlbefinden deutlich verschlechtert (z. B. durch Einsamkeit, fehlende Kontakte zu wichtigen Menschen, intensive Betreuungsaufgaben).	23
Tabelle 3.8: WELLE 2: c1d Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein Leben insgesamt deutlich verschlechtert.	23
Tabelle 4.1: prävalenz_zigaretten Übersichtvariable Zigarettenkonsum (berechnet aus n1 bis n6)	24
Tabelle 4.2: n1 Haben Sie jemals in Ihrem Leben eine ganze Zigarette geraucht?	24
Tabelle 4.3: n2 Haben Sie auch jemals in Ihrem Leben regelmäßig geraucht?	25
Tabelle 4.4: n3 Haben Sie auch in den letzten 12 Monaten mindestens einen Monat lang täglich geraucht (unabhängig davon, ob Sie aktuell täglich rauchen)?.....	25
Tabelle 4.5: n4 Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, mit dem Rauchen aufzuhören (unabhängig davon, ob dieser Aufhörversuch erfolgreich war oder nicht)?	26
Tabelle 4.6: n5 Haben Sie bei Ihrem letzten Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, externe Hilfsmittel zum Rauchstopp verwendet, z. B. Apps, Nikotinersatzprodukte, Beratungsangebote oder Ähnliches?	26
Tabelle 4.7: n6 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Zigaretten geraucht?.....	27
Tabelle 4.8: n8_rec An Tagen, an denen Sie geraucht haben: Wie viel Stück Zigaretten waren das im Durchschnitt pro Tag? (kategorisiert).....	27
Tabelle 4.9: n9a Haben Sie in den 30 Tagen vor Ausbruch der Corona-Krise, also zwischen Mitte Februar und Mitte März, täglich Zigaretten geraucht?	28
Tabelle 4.10: n9b Wie (falls überhaupt) hat sich Ihr Rauchverhalten seit dem Ausbruch der Corona-Krise (Mitte März) verändert?.....	28
Tabelle 4.11: n9c_1 bis n9c_7 Ich rauche jetzt weniger, weil ich ...(Mehrfachantworten möglich)	29

Tabelle 4.12: n9c_8 bis n9c_11 Ich rauche mehr, weil ich ... (Mehrfachantworten möglich)	30
Tabelle 4.13: n10 In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal eine ganze Zigarette geraucht? Mit ... Jahren.....	30
Tabelle 4.14: n11 In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal regelmäßig geraucht? Mit ... Jahren	31
Tabelle 4.15: n12 Wie viele Stunden pro Tag sind Sie bei sich zu Hause dem Tabakrauch durch andere ausgesetzt?	31
Tabelle 4.16: n13 Sind Sie seit Ausbruch der Corona-Krise (ca. Mitte März) häufiger oder weniger häufig zu Hause dem Tabakrauch durch andere ausgesetzt?.....	32
Tabelle 4.17: prävalenz_ezig ÜbersichtsvARIABLE E-Zigarettenkonsum (berechnet aus n14 bis n16)	32
Tabelle 4.18: n14 Haben Sie jemals in Ihrem Leben E-Zigaretten konsumiert?	32
Tabelle 4.19: n15 Haben Sie in den letzten 12 Monaten E-Zigaretten konsumiert?.....	33
Tabelle 4.20: n16 Haben Sie in den letzten 30 Tagen E-Zigaretten konsumiert?	33
Tabelle 4.21: n17 Wie (falls überhaupt) hat sich seit Ausbruch der Corona-Krise Ihr Konsum von E-Zigaretten verändert?	34
Tabelle 4.22: n18 Spielen gesundheitliche Überlegungen eine Rolle für Ihren Konsum von E-Zigaretten (z. B. um das Konsumieren „normaler“ Rauchwaren zu reduzieren oder ganz aufzugeben)?.....	34
Tabelle 4.23: prävalenz_shisha ÜbersichtsvARIABLE Shishakonsum (berechnet aus n19 bis n21).....	35
Tabelle 4.24: n19 Haben Sie jemals in Ihrem Leben Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht?	35
Tabelle 4.25: n20 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht?.....	35
Tabelle 4.26: n21 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht?	36
Tabelle 4.27: n22 Wie häufig haben Sie zwischen November 2019 und dem Ausbruch der Corona-Krise (März 2020) Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht?.....	36
Tabelle 4.28: n23a Konsumprävalenz Zigarre.....	37
Tabelle 4.29: n23b Konsumprävalenz Pfeife.....	37
Tabelle 4.30: Konsumprävalenz E-Shisha.....	38
Tabelle 4.31: n23d Konsumprävalenz E-Pfeife	38
Tabelle 4.32: n23e Konsumprävalenz Heated-Tobacco-Produkte (z. B. Iqos, Glows)	39
Tabelle 4.33: n23f Konsumprävalenz Kautabak	39
Tabelle 4.34: n23g Konsumprävalenz Schnupftabak.....	40
Tabelle 4.35: n23h Konsumprävalenz Snus (werden über den Mund konsumiert und enthalten Tabak)	40

Tabelle 4.36: n23i Konsumprävalenz Nikotinsäckchen (sind ähnlich wie Snus, enthalten aber keinen Tabak, sondern den Wirkstoff Nikotin)	41
Tabelle 4.37: prävalenz_nik_rauchfrei ÜbersichtsvARIABLE rauchfreie Produkte (berechnet aus n23c bis n23i).....	41
Tabelle 4.38: n23j Konsumprävalenz pflanzliche Raucherzeugnisse (z. B. Kräuterzigaretten; nicht gemeint ist Cannabis)	42
Tabelle 4.39: n24 Welches dieser Produkte haben Sie als Allererstes probiert? (nur an Personen gerichtet, die mindestens zwei nikotinhaltige Produkte konsumiert haben).....	42
Tabelle 4.40: WELLE 2: zig_phase1 Zigarettenkonsum in Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020)	43
Tabelle 4.41: WELLE 2: zig_phase2 Zigarettenkonsum in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März-Juni 2020).....	43
Tabelle 4.42: WELLE 2: zig_phase3 Zigarettenkonsum in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli - Anfang September 2020)	44
Tabelle 4.43: WELLE 2: zig_phase4 Zigarettenkonsum in Phase 4: Aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)	44
Tabelle 4.44: WELLE 2: zig_anzahl_phase1_rec Anzahl der Zigaretten an einem üblichen Tag, an dem ich Zigaretten geraucht habe (Phase 4, in den letzten 4 Wochen, rekodiert).45	
Tabelle 4.45: WELLE 2: zig_anzahl_phase4_rec Anzahl der Zigaretten an einem üblichem Tag, an dem ich Zigaretten geraucht habe (Phase 1, vor Corona, rekodiert).....	45
Tabelle 4.46: WELLE 2: ezig_phase1 E-Zigaretten-Konsum in Phase 1: Vor Corona (Jänner - Februar 2020).....	46
Tabelle 4.47: WELLE 2: ezig_phase2 E-Zigaretten-Konsum in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März-Juni 2020).....	46
Tabelle 4.48: WELLE 2: E-Zigaretten-Konsum in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli - Anfang September 2020)	47
Tabelle 4.49: WELLE 2: ezig_phase4 E-Zigaretten-Konsum in Phase 4: Aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)	48
Tabelle 4.50: WELLE 2: ezig_reaktion1 Reaktion auf geschlossene Vape-Shops (Mehrfachantworten möglich).....	49
Tabelle 5.1: a1 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol konsumiert?	50
Tabelle 5.2: a1_u Haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol konsumiert (undersamplingadjustiert*).....	50
Tabelle 5.3: bsqf1a Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Bier getrunken (inklusive Bier-Mixgetränken)?	51
Tabelle 5.4: bsqf2a Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Wein oder Sekt getrunken?	52

Tabelle 5.5: bsqf3a Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Spirituosen (z. B. Schnaps, Gin, Wodka, Whisky) getrunken (inklusive Spirituosen-Mixgetränken wie z. B. Cocktails oder Alkopops)?	53
Tabelle 5.6: bsqf4a Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen alkoholhaltigen Most (Apfel- und Birnenwein), Sturm (gärenden Traubensaft) und andere Obstweine (z. B. Ribiselwein, Pflaumenwein) getrunken?	54
Tabelle 5.7: Alkoholkonsumgruppe (Rohwerte, berechnet auf Basis von a1 bis bsqf4a)	55
Tabelle 5.8: Alkoholkonsumgruppe_uu (undersampling- und underreportingadjustiert*, berechnet auf Basis von a1 bis bsqf4a)	56
Tabelle 5.9: a2 Zusammenfassend: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken, unabhängig von Getränkeart und Menge?	57
Tabelle 5.10: a2_u Zusammenfassend: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken, unabhängig von Getränkeart und Menge (undersamplingadjustiert*)?	58
Tabelle 5.11: a3a Haben Sie vor Ausbruch der Corona-Krise (Mitte März) täglich oder fast täglich Alkohol (mindestens 5 Tage pro Woche) getrunken?	58
Tabelle 5.12: a3b Wie (falls überhaupt) hat sich Ihr Alkoholkonsum seit Ausbruch der Corona-Krise (Mitte März) verändert?	59
Tabelle 5.13: a4_1 Ich trinke jetzt keinen Alkohol oder weniger, weil ich	60
Tabelle 5.14: a4_9 Ich trinke jetzt mehr, weil ich	61
Tabelle 5.15: rsod1m Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 3 alkoholische Getränkeeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Männer, Rohwerte)	62
Tabelle 5.16: rsod1m_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 3 alkoholische Getränkeeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Männer, undersamplingadjustiert*)	63
Tabelle 5.17: rsod1w Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 2 alkoholische Getränkeeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Frauen, Rohwerte)	64
Tabelle 5.18: rsod1w_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 2 alkoholische Getränkeeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Frauen, undersamplingadjustiert*)	65
Tabelle 5.19: rsod1g Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 2 bzw. 3 Getränkeeinheiten bei einer Gelegenheit konsumiert? (Männer und Frauen, Rohwerte)	66
Tabelle 5.20: rsod1g_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 2 bzw. 3 Getränkeeinheiten bei einer Gelegenheit konsumiert? (Männer und Frauen, undersamplingadjustiert*)	67

Tabelle 5.21: rsod3m Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 6 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Männer, Rohwerte)	68
Tabelle 5.22: rsod3m_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 6 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Männer, undersamplingadjustiert*).....	69
Tabelle 5.23: rsod3w Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 4 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Frauen, Rohwerte)	70
Tabelle 5.24: rsod3w_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 4 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Frauen, undersamplingadjustiert*).....	71
Tabelle 5.25: rsod3g Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 4 bzw. 6 Getränkeinheiten bei einer Gelegenheit konsumiert? (Männer und Frauen, Rohwerte).....	72
Tabelle 5.26: rsod3g_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 4 bzw. 6 Getränkeinheiten bei einer Gelegenheit konsumiert? (Männer und Frauen, undersamplingadjustiert*)	73
Tabelle 5.27: dr1 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen so viel getrunken, dass Sie sich unsicher auf den Beinen gefühlt haben oder Ihre Aussprache undeutlich wurde?. 74	
Tabelle 5.28: h1 Hat sich jemals eine Person (z. B. Freund/-in, Verwandte[r] oder Ärztin/Arzt) besorgt über Ihr Trinken gezeigt?.....	74
Tabelle 5.29: h2 Haben Sie jemals selbst daran gedacht, wegen Ihres Alkoholkonsums Rat und Hilfe zu suchen?.....	75
Tabelle 5.30: h3 Hat Ihre Entscheidung, Hilfe zu suchen, mit der aktuellen Corona-Krise zu tun?	75
Tabelle 5.31: h4 Haben Sie jemals wegen Ihres Alkoholkonsums auch tatsächlich Rat und Hilfe in Anspruch genommen?.....	76
Tabelle 5.32: mnd Motive für Abstinenz (Mehrfachantworten möglich)	77
Tabelle 5.33: mnd Motive für Abstinenz (Fortsetzung; Mehrfachantworten möglich)	78
Tabelle 5.34: hd1 Gibt es Personen in Ihrem Haushalt, die viel Alkohol trinken und Ihnen dadurch Probleme verursachen?	78
Tabelle 5.35: hd2a bis hd2f: Personen, die durch ihren Alkoholkonsum Probleme verursachen (Mehrfachantworten möglich).....	79
Tabelle 5.36: hd3a Um welche Art von Problemen handelt es sich dabei? (Mehrfachantworten möglich)	80
Tabelle 5.37: hd4 Würden es Ihrer Meinung nach zu den genannten Problemen auch kommen, wenn die betreffende Person keinen Alkohol trinken würde?.....	81

Tabelle 5.38: hd5 Wie (falls überhaupt) haben sich diese Probleme seit Ausbruch der Corona-Krise verändert?	82
Tabelle 5.39: WELLE 2: alk_phase1 Alkoholkonsum in Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020)	82
Tabelle 5.40: WELLE 2: alk_phase2 Alkoholkonsum in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März-Juni 2020).....	83
Tabelle 5.41: WELLE 2: alk_phase3 Alkoholkonsum in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli – Anfang September 2020)	83
Tabelle 5.42: WELLE 2: alk_phase4 Alkoholkonsum in Phase 4: Aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)*	84
Tabelle 5.43: WELLE 2: alk_anzahl_phase1_rec Durchschnittliche Anzahl der Alkoholstandardgläser an einem üblichen Konsumtag (Phase 1, vor Corona, rekodiert)	84
Tabelle 5.44: WELLE 2: alk_anzahl_phase4_rec Durchschnittliche Anzahl der Alkoholstandardgläser an einem üblichen Konsumtag (Phase 4, in den letzten 4 Wochen, rekodiert).....	85
Tabelle 5.45: WELLE 2: alk_ort_phase1 Trinken Sie Alkohol tendenziell eher zu Hause oder außer Haus (in der Gastronomie, im Freien)? (Phase 1, vor Corona).....	85
Tabelle 5.46: WELLE 2: alk_ort_phase4 Trinken Sie Alkohol tendenziell eher zu Hause oder außer Haus (in der Gastronomie, im Freien)? (Phase 4, in den letzten 4 Wochen).....	86
Tabelle 5.47: WELLE 2: alk_alleine_phase1 Trinken Sie Alkohol tendenziell eher allein (also ohne dass andere Menschen dabei sind) oder in Gesellschaft mit anderen Menschen? (Phase 1, vor Corona).....	86
Tabelle 5.48: WELLE 2: alk_alleine_phase4 Trinken Sie Alkohol tendenziell eher allein (also ohne dass andere Menschen dabei sind) oder in Gesellschaft mit anderen Menschen? (Phase 4, in den letzten 4 Wochen).....	87
Tabelle 5.49: WELLE 2: alk_wirkung1 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Mir fällt es leichter, auf andere Menschen zuzugehen.....	87
Tabelle 5.50: WELLE 2: alk_wirkung2 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich kann offener mit anderen Personen über meine Gefühle und Probleme sprechen.*	88
Tabelle 5.51: WELLE 2: alk_wirkung3 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich habe das Gefühl, anziehender und attraktiver zu sein.*	88
Tabelle 5.52: WELLE 2: alk_wirkung4 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich werde anderen gegenüber aggressiv.	88
Tabelle 5.53: WELLE 2: alk_wirkung5 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich werde traurig und niedergeschlagen.	89

Tabelle 5.54: WELLE 2: alk_wirkung6 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich werde entspannter bzw. bin weniger gestresst.	89
Tabelle 5.55: WELLE 2: alk_wirkung7 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich bin weniger niedergeschlagen oder kann Probleme besser vergessen.	89
Tabelle 5.56: WELLE 2: alk_wirkung8 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich fühle mich in Gruppen wohler und weniger unsicher.....	90
Tabelle 5.57: WELLE 2: alk_wirkung9 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich habe mehr Spaß bei dem, was ich gerade tue.	90
Tabelle 5.58: alk_einstellung1 Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? Es spricht nichts dagegen, dass Eltern ihren kleinen Kindern einmal erlauben, Bier oder Wein zu kosten. Das schmeckt den Kindern ohnehin nicht, und ein Schluck kann nicht schaden.....	90
Tabelle 5.59: WELLE 2: alk_einstellung2 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich finde es äußerst verantwortungslos, wenn Eltern ihren kleinen Kindern erlauben, an alkoholischen Getränken zu nippen.*	91
Tabelle 5.60: WELLE 2: alk_einstellung3 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Es gibt keinen Grund, warum eine gesunde Frau in Gesellschaft keinen Alkohol trinken sollte.	91
Tabelle 5.61: WELLE 2: alk_einstellung4 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Es gibt keinen Grund, warum ein gesunder Mann in Gesellschaft keinen Alkohol trinken sollte.	91
Tabelle 5.62: WELLE 2: alk_einstellung5 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich halte ein Werbeverbot für alkoholische Getränke für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.....	92
Tabelle 5.63: WELLE 2: alk_einstellung6 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich halte Warnhinweise auf alkoholischen Getränken für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.....	92
Tabelle 5.64: WELLE 2: alk_einstellung7 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich halte Steuererhöhungen für alkoholische Getränke für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.....	93
Tabelle 5.65: WELLE 2: alk_einstellung8 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich halte Informations- und Aufklärungskampagnen für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.....	93
Tabelle 5.66: WELLE 2: alk_einstellung9 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich fühle mich zum Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Schwangerschaft ausreichend informiert.*	94
Tabelle 5.67: WELLE 2: alk_einstellung10 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Während einer Schwangerschaft sollten Frauen absolut keinen Alkohol trinken.	94

Tabelle 5.68: WELLE 2: alk_einstellung11 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Gelegentlich ein Glas Alkohol kann auch während der Schwangerschaft nicht schaden.	94
Tabelle 5.69: WELLE 2: alk_einstellung12 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Am Arbeitsplatz sollte auch während der Essenspause ein völliges Alkoholverbot gelten.	95
Tabelle 5.70: WELLE 2: alk_einstellung13 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Wenn Alkohol deutlich teurer wäre, würde ich für den Privatgebrauch weniger Alkohol kaufen.	95
Tabelle 5.71: WELLE 2: alk_einstellung14 Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? Alkohol verursacht für die Gesellschaft mehr Probleme als illegale Drogen.	95
Tabelle 5.72: WELLE 2: onl1 Haben Sie schon einmal alkoholhaltige Getränke über das Internet gekauft?	96
Tabelle 6.1: m1 Haben Sie selbst jemals rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?	97
Tabelle 6.2: m2 In welchem Alter haben zum ersten Mal Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?	97
Tabelle 6.3: m3 Haben Sie in den letzten 12 Monaten rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?.....	98
Tabelle 6.4: m4 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten durchschnittlich rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmittel eingenommen?.....	98
Tabelle 6.5: m5 Haben Sie in den letzten 30 Tagen rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?.....	99
Tabelle 6.6: m6 Auf welche Weise erhalten Sie diese rezeptpflichtigen Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente? (Mehrfachantworten möglich).....	100
Tabelle 6.7: m7 Wie (falls überhaupt) hat sich Ihre Einnahme rezeptpflichtiger Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente seit Ausbruch der Corona-Krise verändert?.....	101
Tabelle 6.8: WELLE 2: med_phase1 Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020).....	102
Tabelle 6.9: WELLE 2: med_phase2 Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März-Juni 2020).....	102
Tabelle 6.10: WELLE 2: med_phase3 Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli – Anfang September 2020)	103
Tabelle 6.11: WELLE 2: med_phase4 Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in Phase 4: Aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen).....	103
Tabelle 6.12: WELLE 2: bezug_med1_phase1 bis bezug_med7_phase1: Auf welche Weise erhalten Sie rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente? (Phase 1: vor Corona, Mehrfachantworten möglich).....	104

Tabelle 6.13: bezug_med1_phase4 bis bezug_med7_phase7: Auf welche Weise erhalten Sie rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente? (Phase 4, in den letzten 4 Wochen)*	105
Tabelle 7.1: can0 Ist Ihnen die Diskussion über den unterschiedlichen THC-Gehalt bzw. CBD-Gehalt von Cannabis geläufig?.....	106
Tabelle 7.2: can1 Haben Sie selbst jemals in Ihrem Leben folgende Cannabisprodukte konsumiert? Ja, ich habe Cannabisprodukte mit THC konsumiert (Haschisch oder Marihuana; Mehrfachantworten möglich).....	107
Tabelle 7.3: can_thc3 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch oder Marihuana) mit THC konsumiert?	107
Tabelle 7.4: can_thc4 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Cannabis (Haschisch oder Marihuana) mit THC konsumiert?	108
Tabelle 7.5: can_thc6a Haben Sie Cannabis (mit THC) am Vormittag geraucht?	108
Tabelle 7.6: can_thc6b Haben Sie Cannabis (mit THC) geraucht, als Sie allein waren?.....	109
Tabelle 7.7: can_thc6c Hatten Sie Gedächtnisprobleme, als Sie Cannabis (mit THC) geraucht haben?.....	109
Tabelle 7.8: can_thc6d Haben Freundinnen/Freunde oder Mitglieder Ihrer Familie Ihnen geraten, Ihren Cannabiskonsum (mit THC) zu reduzieren oder damit aufzuhören?.....	110
Tabelle 7.9: can_thc6e Haben Sie erfolglos versucht, Ihren Cannabiskonsum mit THC zu reduzieren oder damit aufzuhören?.....	110
Tabelle 7.10: can_thc6f Hatten Sie Probleme wegen Ihres Cannabiskonsums (mit THC), wie z. B. Streit, Raufereien, Unfälle, Probleme in der Arbeit bzw. Ausbildung?.....	111
Tabelle 7.11: can_thc7 Wie (falls überhaupt) hat sich Ihr Cannabiskonsumverhalten (mit THC) seit Ausbruch der Corona-Krise verändert?.....	112
Tabelle 7.12: can_thc7a Welche Gründe sind Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für die Veränderung Ihres Cannabiskonsums (mit THC)? Ich konsumiere jetzt weniger oder kein Cannabis ... (Mehrfachantworten möglich)	113
Tabelle 7.13: can_thc7b Welche Gründe sind Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für die Veränderung Ihres Cannabiskonsums (mit THC)? Ich konsumiere jetzt mehr Cannabis, ... (Mehrfachantworten möglich).....	114
Tabelle 7.14: can_cbd2 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabisprodukte konsumiert, die ausschließlich CBD und kein (oder nur sehr geringe Anteile von) THC enthalten?	114
Tabelle 7.15: can_cbd3 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Cannabisprodukte konsumiert, die ausschließlich CBD und kein (oder nur sehr geringe Anteile von) THC enthalten?	115

Tabelle 7.16: can_cbd4a bis can_cbd4e In welcher Form haben Sie Cannabisprodukte konsumiert, die ausschließlich CBD und kein (oder nur sehr geringe Anteile von) THC enthalten? (Mehrfachantworten möglich).....	115
Tabelle 7.17: can_cbd6 Wie (falls überhaupt) hat sich Ihr Konsumverhalten bei Cannabisprodukten, die ausschließlich CBD (oder nur sehr geringe Anteile von) THC enthalten, seit Ausbruch der Corona-Krise verändert?.....	116
Tabelle 7.18: can_unb3 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis mit unbekanntem Inhalt konsumiert?.....	117
Tabelle 7.19: can_unb4 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Cannabis mit unbekanntem Inhalt konsumiert?.....	117
Tabelle 7.20: WELLE 2: canthc_phase1 Konsum von THC-haltigem Cannabis in Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020).....	118
Tabelle 7.21: WELLE 2: canthc_phase2 Konsum von THC-haltigem Cannabis in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März-Juni 2020)	119
Tabelle 7.22: WELLE 2: canthc_phase3 Konsum von THC-haltigem Cannabis in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli - Anfang September 2020)	120
Tabelle 7.23: WELLE 2: canthc_phase4 Konsum von THC-haltigem Cannabis in Phase 4: Aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)	121
Tabelle 7.24: WELLE 2: canthc_verfügbarkeit Welche Auswirkungen hatte der Lockdown (März-Juni 2020) auf die Verfügbarkeit von THC-Cannabis für Sie?.....	122
Tabelle 7.25: WELLE 2: canthc_online_phase1 Nutzen Sie auch das Internet (z. B. Kryptomärkte im Darknet), um THC-Cannabis zu kaufen? Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020)	122
Tabelle 7.26: WELLE 2: canthc_online_phase2 Nutzen Sie auch das Internet (z. B. Kryptomärkte im Darknet), um THC-Cannabis zu kaufen? Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März-Juni 2020).....	123
Tabelle 7.27: WELLE 2: canthc_online_phase3 Nutzen Sie auch das Internet (z. B. Kryptomärkte im Darknet), um THC-Cannabis zu kaufen? Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli - Anfang September 2020)	123
Tabelle 7.28: WELLE 2: canthc_online_phase4 Nutzen Sie auch das Internet (z. B. Kryptomärkte im Darknet), um THC-Cannabis zu kaufen? Phase 4: In den letzten 4 Wochen....	123
Tabelle 7.29: WELLE 2: canthc_problem1 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Haben Sie THC-Cannabis am Vormittag geraucht?*	124
Tabelle 7.30: WELLE 2: canthc_problem2 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Haben Sie THC-Cannabis geraucht, als Sie allein waren?	124

Tabelle 7.31: WELLE 2: canthc_problem3 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Hatten Sie Gedächtnisprobleme, als Sie THC-Cannabis geraucht haben?.....	124
Tabelle 7.32: WELLE 2: canthc_problem4 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Haben Freundinnen/Freunde oder Mitglieder Ihrer Familie Ihnen geraten, Ihren THC-Cannabiskonsum zu reduzieren oder ganz aufzuhören?	125
Tabelle 7.33: WELLE 2: canthc_problem5 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Haben Sie erfolglos versucht, Ihren THC-Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören?	125
Tabelle 7.34: WELLE 2: canthc_problem6 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Hatten Sie Probleme wegen Ihres THC-Cannabiskonsums wie z. B. Streit, Raufereien, Unfälle, Probleme in der Arbeit bzw. Ausbildung?.....	126
Tabelle 7.35: WELLE 2: canthc_reg1 Wie stehen Sie zur medizinischen Abgabe von THC-Cannabis an Menschen mit Krankheiten, bei denen Cannabis eine Verbesserung der gesundheitlichen Situation bewirken kann?.....	126
Tabelle 7.36: WELLE 2: canthc_reg2 Wie stehen Sie zur gesetzlichen Regelung von THC-Cannabis im Allgemeinen (abgesehen von der medizinischen Abgabe)?	127
Tabelle 7.37: WELLE 2: cancbd Haben Sie in den letzten 12 Monaten CBD-Produkte benutzt/konsumiert?	127
Tabelle 7.38: WELLE 2: cancbd_form1 In welcher Form haben Sie CBD-Produkte verwendet? Bitte alles Zutreffende ankreuzen! (Mehrfachantworten möglich)	128
Tabelle 7.39: WELLE 2: cancbd_reg0 Unabhängig davon, ob Sie selbst CBD-Produkte konsumieren: Fühlen Sie sich ausreichend zum Thema CBD-Produkte informiert, um Fragen zu dessen Regulierung zu beantworten?.....	128
Tabelle 7.40: WELLE 2: cancbd_reg1 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Es wäre wichtig, dass CBD-Produkte einer konsequenten behördlichen Qualitätskontrolle unterliegen.	129
Tabelle 7.41: WELLE 2: cancbd_reg2 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Es wäre wichtig, den Verkauf von CBD-Produkten komplett zu verbieten.	129
Tabelle 7.42: WELLE 2: cancbd_reg3 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Es wäre wichtig, dass CBD-Produkte nur an Volljährige (18 Jahre oder älter) verkauft werden dürfen.	130
Tabelle 7.43: WELLE 2: cancbd_reg4 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Es wäre wichtig, die Anzahl der Verkaufsorte von CBD-Produkten gering zu halten.	130
Tabelle 7.44: WELLE 2: cancbd_reg5 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Werbung für CBD-Produkte sollte nicht erlaubt sein.	131

Tabelle 7.45: WELLE 2: cancbd_reg6 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Es wäre wichtig, dass CBD-Produkte für medizinische Zwecke (z. B. Schmerzinderung) zur Verfügung stehen.	131
Tabelle 7.46: WELLE 2: cancbd_reg7 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? CBD-Produkte sollten im Handel frei erhältlich sein.....	132
Tabelle 7.47: WELLE 2: cancbd_reg8 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? CBD-Produkte sollten nur in Apotheken erhältlich sein.....	132
Tabelle 7.48: WELLE 2: cancbd_reg9 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? CBD-Produkte sollten nur in speziellen Geschäften (verbunden mit behördlichen Auflagen) erhältlich sein.....	133
Tabelle 8.1: s1a Konsumprävalenz Ecstasy.....	134
Tabelle 8.2: s1b Konsumprävalenz Methamphetamin (Crystal Meth).....	134
Tabelle 8.3: s1c Konsumprävalenz Amphetamin (Speed) – ausgenommen Methamphetamin / Crystal Meth	135
Tabelle 8.4: s1d Konsumprävalenz Kokain	135
Tabelle 8.5: s1e Konsumprävalenz Heroin.....	136
Tabelle 8.6: s1f Konsumprävalenz Euphotrem (fiktive Droge)	136
Tabelle 8.7: s1g Konsumprävalenz LSD.....	137
Tabelle 8.8: s1h Konsumprävalenz biogene Drogen (psychoaktive Pilze, Engelstropfete, Stechapfel oder Ähnliches)	137
Tabelle 8.9: s1i Konsumprävalenz Schnüffelstoffe (Poppers, Lachgas, Lösungsmittel ...).....	138
Tabelle 8.10: WELLE 2: dro_einstellungen1 Aus Ihrer Sicht: Ist ein drogenabhängiger Mensch eher eine Straftäterin / ein Straftäter oder eher eine Kranke / ein Kranker? Was würden Sie sagen?	138
Tabelle 8.11: WELLE 2: dro_einstellungen2 Angenommen, es wird eine Beratungsstelle für Drogenabhängige in Ihrer näheren Wohnumgebung errichtet. Wie würden Sie reagieren?.....	139
Tabelle 8.12: WELLE 2: onl2 Haben Sie jemals über das Internet Drogen, neue psychoaktive Substanzen oder verschreibungspflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente gekauft?	139
Tabelle 8.13: onl3 Haben Sie dazu das Clearnet (also das normal zugängliche Internet) oder Kryptomärkte aus dem sogenannten Darknet (also aus einem Bereich des Internets, der nur über Verschlüsselung zugänglich ist) benutzt?.....	139
Tabelle 9.1: nps1 Haben Sie jemals neue psychoaktive Substanzen (NPS) konsumiert?	140
Tabelle 9.2: nps2 Haben Sie in den letzten 12 Monaten NPS konsumiert?	140
Tabelle 9.3: nps3 Haben Sie in den letzten 30 Tagen NPS konsumiert?	140

Tabelle 9.4: nps5 Wie (falls überhaupt) hat sich Ihr Konsumverhalten bei NPS seit Ausbruch der Corona-Krise verändert?	141
Tabelle 10.1: gam1 Haben Sie jemals oder in den letzten 12 Monaten Spiele via Computer, Tablet, Spielkonsole oder Smartphone gespielt?	142
Tabelle 10.2: gam2 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Spiele via Computer, Tablet, Spielkonsole oder Smartphone gespielt?.....	142
Tabelle 10.3: gam3_rec Wie viele Stunden haben Sie in den letzten 30 Tagen im Durchschnitt pro Woche Spiele via Computer, Tablet, Spielkonsole oder Smartphone gespielt? (rekodiert)	143
Tabelle 10.4: gam4a Hat sich Ihr Spielverhalten am Computer, Tablet, an der Spielkonsole oder am Smartphone seit dem Ausbruch der Corona-Krise verändert oder nicht? Spielen Sie jetzt mehr, weniger oder gleich viel wie vor der Corona-Krise?.....	143
Tabelle 10.5: gam5 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Geld für den Kauf von Lootboxen ausgegeben?.....	144
Tabelle 10.6: gam6_rec Ich habe monatlich durchschnittlich ... Euro für Lootboxen ausgegeben (rekodiert)	144
Tabelle 10.8: WELLE 2: gam_phase1 Computerspielverhalten in Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020).....	145
Tabelle 10.9: WELLE 2: gam_phase2 Computerspielverhalten in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März-Juni 2020).....	146
Tabelle 10.10: WELLE 2: gam_phase3 Computerspielverhalten in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli – Anfang September 2020).....	147
Tabelle 10.11: WELLE 2: gam_phase4 Computerspielverhalten in Phase 4: Aktuelles Spielverhalten (in den letzten 4 Wochen)	148
Tabelle 10.12: WELLE 2: gam_dauer_phase1_rec Anzahl der Spielstunden an einem üblichen Spieltag (Phase 1, vor Corona, rekodiert).....	149
Tabelle 10.13: WELLE 2: gam_dauer_phase4_rec Anzahl der Spielstunden an einem üblichen Spieltag (Phase 4, in den letzten 4 Wochen, rekodiert)	150
Tabelle 12.1: WELLE 2: risiko1 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig Zigaretten rauchen*	151
Tabelle 12.2: risiko2 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Eine oder mehrere Packungen Zigaretten täglich rauchen*	151
Tabelle 12.3: risiko3 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? E-Zigaretten regelmäßig konsumieren.....	151
Tabelle 12.4: risiko4 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig Alkohol trinken	152

Tabelle 12.5: risiko5 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Fünf oder mehr alkoholische Getränke jedes Wochenende trinken	152
Tabelle 12.6: risiko6 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Ein- oder zweimal THC-haltiges Cannabis (Haschisch oder Marihuana) probieren.....	152
Tabelle 12.7: risiko7 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig THC-haltiges Cannabis (Haschisch oder Marihuana) rauchen	153
Tabelle 12.8: risiko8 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Ein- oder zweimal CBD-haltiges Cannabis probieren.....	153
Tabelle 12.9: risiko9 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig CBD-haltiges Cannabis konsumieren.....	153
Tabelle 12.10: risiko10 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Ein- oder zweimal Heroin probieren.	154
Tabelle 12.11: risiko11 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig Heroin konsumieren	154
Tabelle 12.12: risiko12 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Ein- oder zweimal Kokain probieren.	154
Tabelle 12.13: risiko13 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig Kokain konsumieren.....	155
Tabelle 12.14: risiko14 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Beim Autofahren riskant überholen .	155
Tabelle 12.15: risiko15 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Nicht auf die Ernährung achten	155
Tabelle 12.16: risiko16 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Zu wenig körperliche Bewegung machen	156
Tabelle 12.17: risiko17 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Paragleiten oder Extrembergsteigen	156
Tabelle 12.18: risiko18 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Vor dem Autofahren ein bisschen mehr trinken als erlaubt ist.....	156
Tabelle 12.19: risiko19 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Im Vollrausch mit dem Auto fahren .	157

Tabelle 13.1: WELLE 2: schutzalter_bier Kennen Sie die Altersgrenze, ab der man in Ihrem Bundesland laut Gesetz Bier trinken darf?.....	158
Tabelle 13.2: WELLE 2: schutzalter_wein Kennen Sie die Altersgrenze, ab der man in Ihrem Bundesland laut Gesetz Wein trinken darf?	159
Tabelle 13.3: WELLE 2: schutzalter_spirituosen Kennen Sie die Altersgrenze, ab der man in Ihrem Bundesland laut Gesetz Spirituosen trinken darf?.....	159
Tabelle 13.8: WELLE 2: schutzalter_ Wie sicher sind Sie sich in Bezug auf Ihre Angaben betreffend diese Altersgrenzen?.....	160

Bedeutung der Spaltenbezeichnungen

gesamt	alle Befragten
weibl.	weiblich
männl.	männlich
15–34 J.	im Alter zwischen 15 und 34 Jahren
35–64 J.	im Alter zwischen 35 und 64 Jahren
65 J. +	65 Jahre alt oder älter
Sek. I	Abschluss der Sekundarstufe I als höchster Bildungsabschluss
Sek. II	Abschluss der Sekundarstufe II als höchster Bildungsabschluss
tertiär	Abschluss einer tertiären Bildungseinrichtung als höchster Bildungsabschluss

1 Einleitung

Die österreichische Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial 2020 bietet aktuelle Daten in Bezug auf Konsummuster bei legalen und illegalen psychoaktiven Substanzen, auf das Nutzungsverhalten bei Glücksspiel sowie Computerspielen und auf Einstellungen gegenüber Substanzkonsum sowie Glücksspiel- und Computerspielverhalten. Diese Untersuchung stellt die umfangreichste österreichweite Datenerhebung seit drei vergleichbaren Repräsentativerhebungen zu Substanzgebrauch (in den Jahren 2004, 2008 und 2015) dar.

Aufgrund der Kontakteinschränkungen infolge der Corona-Pandemie musste die Erhebungsmethode kurzfristig in eine reine Onlineerhebung abgeändert werden. Erstmals wurden heuer alle Teilnehmer/-innen der ersten Erhebungswelle (April bis Juni) auch zur Teilnahme an einer zweiten Erhebungswelle (September bis Oktober) eingeladen. Die Stichprobe der ersten Erhebungswelle umfasst gültige Angaben von 5.963 Personen (Beteiligungsrate = 55 %), die Stichprobe der zweiten Erhebungswelle 3.289 Angaben (Beteiligungsquote von 39 %). Die tatsächliche Anzahl gültiger Angaben für jede Variable befindet sich jeweils in der untersten Zeile der Tabellen.

Die Datensätze aus den beiden Erhebungswellen wurde jeweils separat so gewichtet, dass sie nach den Variablen Alter und Geschlecht einer repräsentativen Auswahl der österreichischen Wohnbevölkerung entsprechen. Sämtliche Variablen aus der zweiten Erhebungswelle sind mit dem Zusatz „WELLE 2“ versehen. Fragen zu Alkoholkonsum werden dort, wo es inhaltlich sinnvoll ist, zusätzlich auch in einer korrigierten Version dargestellt, die dem Umstand Rechnung trägt, dass Personen mit einem exzessiven Alkoholkonsum in Befragungen unterrepräsentiert sind bzw. Befragungsteilnehmer/-innen ihren Alkoholkonsum unterschätzen. Alle Fragen, die derart korrigiert wurden, sind mit „u“ („undersamplingadjustiert“) oder „uu“ („undersampling- und underreportingadjustiert“) markiert¹.

Der gegenständliche Tabellenband bietet eine Übersicht über alle Variablen, die nach den Merkmalen Geschlecht, Alter, Bildungsabschluss ausgewertet wurden. Zusätzlich zu diesem Kreuztabellenband bietet ein Forschungsbericht einen umfassenden Einblick in die Ergebnisse der Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial 2020 in Österreich.

1

Eine ausführliche Beschreibung dieses Korrekturvorgangs befindet sich im Forschungsbericht.

2 Soziodemografie und Angaben zur Person

Tabelle 2.1:
Ihr Geschlecht?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
männlich	48,8 %	100,0 %	0,0 %	51,3 %	49,8 %	43,3 %	47,0 %	50,3 %	47,8 %
weiblich	51,2 %	0,0 %	100,0 %	48,7 %	50,2 %	56,7 %	53,0 %	49,7 %	52,2 %
gültige Angaben	5.963	2.910	3053	1.713	2.938	1.313	543	3.311	1.897

Tabelle 2.2:
sd2_rec Alterskategorien (5 Jahresstufen)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
15 bis 19 Jahre	6 %	6 %	5 %	20 %	0 %	0 %	35 %	3 %	0 %
20 bis 24 Jahre	7 %	7 %	7 %	24 %	0 %	0 %	6 %	9 %	4 %
25 bis 29 Jahre	8 %	8 %	8 %	28 %	0 %	0 %	7 %	7 %	10 %
30 bis 34 Jahre	8 %	8 %	8 %	28 %	0 %	0 %	1 %	7 %	11 %
35 bis 39 Jahre	8 %	8 %	8 %	0 %	16 %	0 %	2 %	7 %	12 %
40 bis 44 Jahre	7 %	8 %	7 %	0 %	15 %	0 %	3 %	7 %	11 %
45 bis 49 Jahre	8 %	9 %	8 %	0 %	17 %	0 %	3 %	8 %	11 %
50 bis 54 Jahre	9 %	10 %	9 %	0 %	19 %	0 %	7 %	10 %	10 %
55 bis 59 Jahre	9 %	9 %	9 %	0 %	18 %	0 %	7 %	10 %	7 %
60 bis 64 Jahre	7 %	7 %	7 %	0 %	15 %	0 %	7 %	8 %	6 %
65 bis 69 Jahre	6 %	6 %	6 %	0 %	0 %	27 %	6 %	7 %	4 %
70 bis 74 Jahre	5 %	5 %	5 %	0 %	0 %	23 %	5 %	6 %	4 %
75 Jahre und älter	11 %	9 %	13 %	0 %	0 %	50 %	10 %	12 %	9 %
gültige Angaben	5.964	2.911	3.053	1.713	2.938	1.313	543	3.309	1.897

Tabelle 2.3:
sd2_rec2 Alterskategorien (grobe Kategorien)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
15 bis 34	29 %	30 %	27 %	100 %	0 %	0 %	50 %	26 %	26 %
35 bis 64	49 %	50 %	48 %	0 %	100 %	0 %	28 %	49 %	57 %
65 plus	22 %	20 %	24 %	0 %	0 %	100 %	22 %	25 %	17 %
gültige Angaben	5.964	2.911	3.053	1.712	2.938	1.313	542	3.311	1.897

Tabelle 2.4:

sd4 Haben Sie eine fixe Partnerin / einen fixen Partner?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ja, ich habe eine fixe Partnerin / einen fixen Partner, und wir leben zusammen in einem Haushalt.	62,0 %	65,2 %	59,0 %	43,3 %	69,5 %	69,0 %	44,1 %	62,8 %	67,3 %
Ja, ich habe eine fixe Partnerin / einen fixen Partner, aber wir leben nicht zusammen in einem Haushalt.	12,1 %	11,9 %	12,2 %	19,1 %	11,0 %	5,5 %	15,1 %	12,1 %	11,5 %
Nein, ich habe derzeit keine fixe Partnerin / keinen fixen Partner.	26,0 %	23,0 %	28,8 %	37,6 %	19,5 %	25,6 %	40,8 %	25,2 %	21,2 %
gültige Angaben	5.880	2.866	3.014	1.664	2.917	1.299	524	3.273	1.885

Tabelle 2.5:

sd5 Was ist Ihr derzeitiger Familienstand?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich bin verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft und lebe mit der betreffenden Person zusammen.	48,1 %	51,0 %	45,4 %	19,1 %	56,9 %	63,6 %	35,5 %	49,3 %	49,9 %
Ich bin verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft, aber lebe nicht mit der betreffenden Person zusammen.	2,7 %	3,0 %	2,4 %	4,9 %	1,7 %	2,2 %	6,5 %	2,4 %	2,1 %
Ich bin ledig, d. h. ich war nie verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft.	34,0 %	35,8 %	32,3 %	72,9 %	25,7 %	5,4 %	43,3 %	32,2 %	34,9 %
Ich bin geschieden und habe nicht wieder geheiratet.	10,5 %	8,2 %	12,6 %	1,3 %	13,6 %	14,5 %	6,9 %	11,1 %	10,2 %
Ich bin verwitwet und habe nicht wieder geheiratet.	4,7 %	2,0 %	7,3 %	1,8 %	2,1 %	14,2 %	7,9 %	5,0 %	2,9 %
gültige Angaben	5.789	2.805	2.984	1.573	2.910	1.306	496	3.252	1.874

Tabelle 2.6:

sd6 Wie viele Personen leben derzeit in Ihrem Haushalt (inklusive Ihrer selbst)?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich lebe allein.	23,1 %	21,1 %	24,9 %	21,8 %	21,7 %	27,9 %	20,3 %	23,6 %	22,4 %
Ich lebe mit anderen Menschen gemeinsam in einem Haushalt.	76,9 %	78,9 %	75,1 %	78,2 %	78,3 %	72,1 %	79,7 %	76,4 %	77,6 %
gültige Angaben	5.775	2.807	2.967	1.580	2.903	1.293	497	3.236	1.858

Tabelle 2.7:

sd6_opn Anzahl der Personen, die im Haushalt leben, inklusive Ihrer selbst:

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
2 Personen	52,5 %	53,7 %	51,3 %	41,9 %	43,7 %	88,2 %	46,1 %	55,1 %	49,6 %
3 Personen	20,9 %	20,0 %	21,8 %	25,6 %	23,4 %	8,6 %	23,2 %	19,6 %	22,7 %
4 Personen	18,6 %	18,8 %	18,5 %	21,9 %	23,6 %	2,3 %	17,1 %	17,8 %	20,2 %
5 Personen	6,2 %	5,8 %	6,5 %	8,2 %	7,2 %	0,9 %	11,3 %	5,5 %	6,1 %
6 Personen	1,3 %	1,1 %	1,4 %	1,6 %	1,6 %	0,1 %	2,0 %	1,5 %	,9 %
7 Personen	,3 %	,3 %	,3 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	,3 %	,4 %	,2 %
8 Personen	,1 %	,2 %	,1 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,2 %
9 Personen	,0 %	,0 %	,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,0 %	0,0 %
11 Personen	,0 %	,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,0 %	0,0 %
gültige Angaben	4.442	2.216	2.227	1.236	2.276	932	397	2.475	1.443

Tabelle 2.8:

sd7 Anzahl der Personen unter 18 Jahren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
keine	63,3 %	65,5 %	61,0 %	53,6 %	54,7 %	97,2 %	51,3 %	67,7 %	59,4 %
1 Person	17,9 %	16,2 %	19,5 %	26,0 %	20,1 %	2,0 %	24,3 %	16,0 %	19,0 %
2 Personen	15,0 %	14,8 %	15,2 %	16,1 %	20,1 %	0,8 %	16,6 %	13,4 %	17,0 %
3 Personen	3,3 %	3,1 %	3,4 %	3,4 %	4,5 %	0,0 %	7,0 %	2,2 %	4,0 %
4 Personen	,5 %	,3 %	,6 %	0,6 %	0,6 %	0,0 %	,5 %	,4 %	,5 %
5 Personen	,1 %	,0 %	,2 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %	,3 %	,2 %	0,0 %
6 Personen	,0 %	,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,0 %	0,0 %
gültige Angaben	4.178	2.089	2.087	1.117	2.192	870	374	2.323	1.368

Tabelle 2.9:

sd8 Welche dieser Kategorien beschreibt am besten Ihre Wohnumgebung?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich lebe auf dem Land oder in einem kleinen Dorf.	25,9 %	25,9 %	25,9 %	28,3 %	26,6 %	21,5 %	35,6 %	27,3 %	20,4 %
Ich lebe in oder im Umkreis einer Kleinstadt mit weniger als 50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern.	14,7 %	17,0 %	12,5 %	17,4 %	12,9 %	15,2 %	18,0 %	15,1 %	13,0 %
Ich lebe in oder im Umkreis einer mittelgroßen Stadt mit 50.000 bis 250.000 Einwohnerinnen/Einwohnern.	11,9 %	12,4 %	11,4 %	15,7 %	9,7 %	12,0 %	13,0 %	11,5 %	12,5 %
Ich lebe in oder im Umkreis einer Großstadt mit mehr als 250.000 Einwohnerinnen/Einwohnern.	47,5 %	44,7 %	50,2 %	38,6 %	50,9 %	51,3 %	33,3 %	46,2 %	54,2 %
gültige Angaben	5.873	2.860	3.014	1.653	2.926	1.296	522	3.293	1.883

Tabelle 2.10:

sd9 In welchem Bundesland haben Sie Ihren Lebensmittelpunkt?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Burgenland	3,1 %	3,1 %	3,1 %	3,5 %	3,1 %	2,7 %	4,3 %	3,2 %	2,4 %
Kärnten	5,8 %	6,0 %	5,5 %	6,7 %	5,2 %	5,6 %	6,7 %	5,8 %	5,3 %
Niederösterreich	18,8 %	18,8 %	18,8 %	15,3 %	20,1 %	20,5 %	16,3 %	21,0 %	15,4 %
Oberösterreich	20,7 %	20,3 %	21,0 %	10,5 %	26,4 %	21,0 %	15,4 %	23,1 %	18,4 %
Salzburg	5,4 %	6,1 %	4,8 %	7,4 %	5,3 %	3,0 %	7,1 %	5,0 %	5,7 %
Steiermark	13,1 %	12,8 %	13,4 %	16,9 %	10,8 %	13,5 %	16,3 %	12,3 %	13,6 %
Tirol	8,0 %	9,1 %	6,9 %	10,0 %	7,0 %	7,3 %	9,3 %	7,5 %	8,2 %
Vorarlberg	3,1 %	3,3 %	2,9 %	4,2 %	2,6 %	2,7 %	4,8 %	2,9 %	3,1 %
Wien	22,1 %	20,4 %	23,7 %	25,5 %	19,4 %	23,6 %	19,9 %	19,2 %	27,9 %
gültige Angaben	5.946	2.899	3.048	1.697	2.938	1.310	539	3.309	1.892

Tabelle 2.11:
sd10 Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
weniger als Volksschule, Kindergarten, Vorschule	,3 %	,5 %	,1 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	3,1 %	0,0 %	0,0 %
Volksschule, Sonderschule	,6 %	,5 %	,8 %	0,9 %	0,2 %	1,3 %	7,0 %	0,0 %	0,0 %
Hauptschule, Unterstufe AHS, NMS, Sonderschule	8,3 %	8,0 %	8,7 %	14,5 %	5,1 %	7,8 %	89,9 %	0,0 %	0,0 %
Lehre, BMS	28,6 %	29,5 %	27,7 %	17,3 %	30,5 %	38,5 %	0,0 %	50,6 %	0,0 %
Matura an einer AHS	13,3 %	13,9 %	12,7 %	17,0 %	10,9 %	14,2 %	0,0 %	23,6 %	0,0 %
Matura an einer BHS	14,6 %	14,7 %	14,4 %	18,1 %	14,7 %	9,8 %	0,0 %	25,8 %	0,0 %
Fachlehrgang oder Kolleg mit Hochschulcharakter	5,7 %	4,3 %	7,2 %	3,2 %	6,0 %	8,2 %	0,0 %	0,0 %	17,8 %
universitärer Abschluss: Bachelor	7,1 %	6,4 %	7,7 %	13,0 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	21,8 %
universitärer Abschluss: Master, Magistra/Magister, Diplomingenieur/-in	16,1 %	16,7 %	15,5 %	12,5 %	21,2 %	9,3 %	0,0 %	0,0 %	49,9 %
universitärer Abschluss: Doktorat, PhD	3,4 %	4,3 %	2,6 %	1,0 %	4,2 %	4,8 %	0,0 %	0,0 %	10,5 %
nicht klassifizierbar, andere Art des Abschlusses	2,0 %	1,3 %	2,7 %	1,5 %	1,7 %	3,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
gültige Angaben	5.868	2.863	3.005	1.645	2.920	1.302	542	3.311	1.897

Tabelle 2.12:
sd10_rec Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? (kategorisiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Sekundarstufe I	9,3 %	8,9 %	9,6 %	16,4 %	5,3 %	9,1 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
Sekundarstufe II	56,4 %	58,2 %	54,7 %	52,3 %	56,0 %	62,5 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Hochschule	32,3 %	31,6 %	33,0 %	29,8 %	37,0 %	25,1 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
nicht klassifizierbar, andere Art des Abschlusses	2,0 %	1,3 %	2,7 %	1,5 %	1,7 %	3,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
gültige Angaben	5.869	2.863	3.005	1.645	2.920	1.302	543	3.311	1.897

Tabelle 2.13:

sd11 Sind Sie derzeit berufstätig oder nicht berufstätig?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich bin derzeit berufstätig.	58,7 %	63,3 %	54,3 %	61,8 %	79,7 %	6,4 %	32,6 %	56,7 %	70,6 %
Ich bin derzeit nicht berufstätig.	41,3 %	36,7 %	45,7 %	38,2 %	20,3 %	93,6 %	67,4 %	43,3 %	29,4 %
gültige Angaben	5.824	2.844	2.981	1.633	2.918	1.272	516	3.249	1.887

Tabelle 2.14:

sd12 Welche der folgenden Kategorien beschreibt am besten Ihre derzeitige berufliche Tätigkeit?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
angelernte körperliche Tätigkeiten und körperliche Hilfstätigkeiten	13,7 %	16,3 %	11,1 %	16,8 %	17,5 %	,8 %	31,6 %	10,4 %	14,7 %
höher oder hoch qualifizierte überwiegend körperliche Facharbeitstätigkeiten	5,8 %	8,2 %	3,5 %	7,1 %	7,6 %	,2 %	,6 %	8,0 %	3,5 %
angelernte nichtkörperliche Tätigkeiten und überwiegend nichtkörperliche Hilfsarbeiten	4,6 %	4,0 %	5,1 %	8,5 %	4,1 %	,2 %	0,0 %	6,3 %	3,2 %
höher oder hoch qualifizierte überwiegend nichtkörperliche Tätigkeiten	27,5 %	27,9 %	27,2 %	23,2 %	40,2 %	2,7 %	,2 %	24,8 %	41,1 %
Gewerbebesitzer/-in, z. B. Besitzer/-in eines Unternehmens, Geschäfts oder eines Lokals.	3,5 %	4,3 %	2,8 %	1,4 %	5,8 %	1,1 %	0,0 %	3,6 %	4,4 %
andere Tätigkeit	3,0 %	2,3 %	3,8 %	2,8 %	4,3 %	1,1 %	,2 %	3,0 %	3,5 %
derzeit nicht berufstätig	41,9 %	37,0 %	46,6 %	40,1 %	20,5 %	94,0 %	67,4 %	44,0 %	29,7 %
gültige Angaben	5.747	2.820	2.926	1.712	2.939	1.314	516	3.203	1.868

Tabelle 2.15:

sd13 Wenn Sie derzeit nicht berufstätig sind, so sind Sie derzeit ...

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in Ausbildung: Schüler/-in, Student/-in	6,9 %	6,8 %	7,1 %	24,5 %	,4 %	0,0 %	24,9 %	6,0 %	3,2 %
arbeitslos oder derzeit nicht berufstätig	4,7 %	5,6 %	3,8 %	7,1 %	5,1 %	,4 %	8,0 %	4,7 %	3,8 %
karenziert	1,8 %	,6 %	3,0 %	4,4 %	1,0 %	,1 %	1,6 %	1,2 %	2,9 %
in Pension oder aufgrund von Krankheit berufsunfähig	24,2 %	22,1 %	26,2 %	0,0 %	9,5 %	90,1 %	27,3 %	27,4 %	17,2 %
überwiegend im Haushalt tätig	2,6 %	,5 %	4,6 %	1,4 %	3,2 %	2,8 %	4,2 %	2,9 %	1,5 %
nicht erwerbstätig aus anderen Gründen	,6 %	,6 %	,5 %	,5 %	,7 %	,4 %	,6 %	,6 %	,4 %
nicht zutreffend, weil derzeit berufstätig	59,3 %	63,9 %	54,9 %	62,0 %	80,1 %	6,3 %	33,5 %	57,2 %	71,0 %
gültige Angaben	5.764	2.818	2.948	1.631	2.906	1.247	502	3.216	1.878

Tabelle 2.16:

sd14 Waren Sie in der Vergangenheit berufstätig?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	35,4 %	31,2 %	39,5 %	20,2 %	19,6 %	92,4 %	40,5 %	39,0 %	27,5 %
nein	5,2 %	4,9 %	5,5 %	17,9 %	,3 %	1,2 %	25,9 %	3,7 %	1,5 %
nicht zutreffend, weil derzeit berufstätig	59,4 %	63,9 %	55,0 %	61,9 %	80,1 %	6,4 %	33,5 %	57,3 %	71,1 %
gültige Angaben	5.754	2.817	2.939	1.630	2.907	1.244	501	3.212	1.876

Tabelle 2.17:

sd15 Welche der folgenden Kategorien beschreibt am besten Ihre letzte berufliche Tätigkeit?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
angelernte manuelle Tätigkeiten und manuelle Hilfstätigkeiten	3,2 %	2,2 %	4,2 %	6,6 %	1,6 %	3,3 %	13,8 %	3,2 %	1,0 %
höher oder hoch qualifizierte überwiegend manuelle Facharbeits-tätigkeiten	4,6 %	5,4 %	3,9 %	3,0 %	2,6 %	11,3 %	6,9 %	6,4 %	1,1 %
angelernte nichtmanuelle Tätigkeiten und überwiegend nichtmanuelle Hilfstätigkeiten	1,8 %	1,2 %	2,4 %	3,0 %	1,0 %	2,5 %	5,0 %	2,1 %	,7 %
höher oder hoch qualifizierte überwiegend nichtmanuelle Tätigkeiten	12,6 %	8,7 %	16,4 %	4,7 %	7,2 %	34,3 %	10,5 %	13,2 %	11,7 %
im Management oder in leitender Funktion tätig	8,4 %	10,4 %	6,5 %	1,5 %	3,6 %	27,1 %	8,6 %	8,4 %	8,4 %
Gewerbebesitzer/-in, z. B. Besitzer/-in eines Unternehmens, eines Geschäfts oder eines Lokals.	1,7 %	1,8 %	1,6 %	,4 %	1,1 %	5,1 %	1,4 %	2,2 %	1,0 %
andere Tätigkeit	4,2 %	2,5 %	5,9 %	3,5 %	2,1 %	9,9 %	7,5 %	4,3 %	3,4 %
nicht zutreffend, weil derzeit berufstätig	63,4 %	67,9 %	59,1 %	77,3 %	80,7 %	6,6 %	46,4 %	60,3 %	72,5 %
gültige Angaben	5.388	2.651	2.737	1.338	2.895	1.224	362	3.053	1.839

Tabelle 2.18:

sd16a Hatte die Corona-Krise irgendwelche Auswirkungen auf Ihrer Arbeitstätigkeit?
(Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ja, ich bin weiterhin berufstätig, arbeite aber vor allem von zu Hause aus im Home-Office.	24,8 %	27,4 %	22,2 %	30,3 %	31,8 %	2,5 %	8,8 %	18,5 %	39,7 %
Ja, ich bin zwar weiterhin berufstätig, aber befinde mich in Kurzarbeit.	11,9 %	13,0 %	10,8 %	18,6 %	13,7 %	0,4 %	10,2 %	13,0 %	10,9 %
Ja, ich gehöre einer Berufsgruppe an, die derzeit nicht arbeiten darf.	3,9 %	3,3 %	4,4 %	5,9 %	3,9 %	1,7 %	4,8 %	3,9 %	3,7 %
Ja, ich habe infolge der Corona-Krise meinen Arbeitsplatz verloren.	2,5 %	2,8 %	2,2 %	6,6 %	1,5 %	0,5 %	4,3 %	2,7 %	1,7 %
Nein, ich bin weiterhin berufstätig und arbeite weiterhin an meinem gewohnten Arbeitsplatz.	23,4 %	25,5 %	21,3 %	24,5 %	31,6 %	2,8 %	19,8 %	25,5 %	20,0 %
Nein, ich war bereits vor der Corona-Krise nicht berufstätig.	30,3 %	26,8 %	33,7 %	14,8 %	15,7 %	81,2 %	45,6 %	33,2 %	22,2 %
andere Auswirkungen	6,9 %	5,1 %	8,7 %	5,3 %	5,9 %	11,1 %	7,2 %	6,4 %	7,3 %
gültige Angaben	5.434	2.638	2.796	1.314	2.885	1.234	373	3.091	1.831

Tabelle 2.19:

sd17 Wie hoch ist das derzeitige monatliche Nettoeinkommen in Ihrem Haushalt?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1000 € oder weniger	7,6 %	6,0 %	9,3 %	15,0 %	5,4 %	3,2 %	17,7 %	7,4 %	4,7 %
zwischen 1001 € und 1300 €	5,6 %	4,9 %	6,2 %	9,0 %	4,7 %	3,1 %	10,7 %	6,4 %	2,8 %
zwischen 1301 € und 1600 €	6,3 %	4,1 %	8,6 %	7,8 %	4,7 %	8,0 %	8,2 %	7,1 %	4,4 %
zwischen 1601 € und 2000 €	10,0 %	9,3 %	10,8 %	11,8 %	8,8 %	10,7 %	14,2 %	11,4 %	6,6 %
zwischen 2001 € und 2300 €	9,0 %	8,6 %	9,5 %	8,4 %	8,0 %	12,0 %	8,7 %	10,4 %	6,6 %
zwischen 2301 € und 2700 €	10,0 %	10,4 %	9,6 %	7,3 %	10,5 %	12,2 %	10,0 %	10,3 %	9,5 %
zwischen 2701 € und 3200 €	12,3 %	13,5 %	11,1 %	10,4 %	12,9 %	13,3 %	10,5 %	12,7 %	12,3 %
zwischen 3201 € und 3700 €	11,9 %	13,7 %	10,1 %	9,8 %	13,0 %	12,1 %	6,7 %	11,7 %	13,6 %
zwischen 3701 € und 4700 €	14,7 %	15,3 %	14,0 %	12,0 %	16,0 %	15,2 %	6,7 %	14,0 %	18,0 %
mehr als 4700 €	12,6 %	14,3 %	10,9 %	8,6 %	16,0 %	10,1 %	6,5 %	8,6 %	21,6 %
gültige Angaben	4.748	2.409	2.338	1.341	2.358	1.049	401	2.676	1.554

Tabelle 2.20:

sd18 Hat sich infolge der Corona-Krise ihr Haushaltseinkommen verändert? Falls ja, wie hoch war dieses monatliche Nettoeinkommen vor Ausbruch der Corona-Krise?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Mein Haushaltseinkommen hat sich seit Ausbruch der Corona-Krise nicht geändert.	57,7 %	56,2 %	59,2 %	43,7 %	57,3 %	75,8 %	52,7 %	57,2 %	59,5 %
1000 € oder weniger	3,5 %	3,6 %	3,4 %	7,3 %	2,8 %	0,3 %	8,2 %	3,3 %	2,5 %
zwischen 1001 € und 1300 €	2,7 %	2,7 %	2,9 %	5,9 %	1,8 %	1,0 %	7,8 %	2,5 %	1,9 %
zwischen 1301 € und 1600 €	3,1 %	2,7 %	3,5 %	4,6 %	2,9 %	1,7 %	3,5 %	3,9 %	1,7 %
zwischen 1601 € und 2000 €	3,9 %	3,7 %	4,0 %	6,5 %	3,1 %	2,3 %	4,7 %	4,3 %	2,9 %
zwischen 2001 € und 2300 €	3,9 %	4,3 %	3,6 %	5,7 %	3,3 %	3,3 %	4,5 %	3,9 %	3,7 %
zwischen 2301 € und 2700 €	3,8 %	4,1 %	3,5 %	4,5 %	3,7 %	3,1 %	4,0 %	3,9 %	3,5 %
zwischen 2701 € und 3200 €	4,5 %	4,6 %	4,5 %	4,9 %	4,9 %	3,2 %	4,7 %	5,1 %	3,8 %
zwischen 3201 € und 3700 €	5,1 %	5,4 %	4,8 %	5,4 %	6,0 %	2,6 %	2,6 %	5,5 %	5,2 %
zwischen 3701 € und 4700 €	6,1 %	6,2 %	6,0 %	6,2 %	7,0 %	4,0 %	3,1 %	5,9 %	7,3 %
mehr als 4700 €	5,7 %	6,7 %	4,7 %	5,3 %	7,2 %	2,6 %	4,2 %	4,5 %	8,2 %
gültige Angaben	5.107	2.556	2.553	1.413	2.548	1.146	425	2.873	1.677

Tabelle 2.21:

sd18_ Veränderung im Haushaltseinkommen seit der Corona-Krise (berechnet aus sd17 und sd18)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
keine Veränderung	58,3 %	56,8 %	59,9 %	44,3 %	58,0 %	76,0 %	53,0 %	57,9 %	60,1 %
niedrigere Einkommenskategorie nach Corona	34,8 %	35,7 %	33,9 %	42,9 %	36,4 %	21,4 %	36,6 %	35,3 %	33,6 %
höhere Einkommenskategorie seit Corona	6,9 %	7,6 %	6,3 %	12,8 %	5,6 %	2,5 %	10,4 %	6,8 %	6,3 %
gültige Angaben	5.056	2.529	2.526	1.395	2.517	1.143	423	2.840	1.660

Tabelle 2.22:

sd19 Leiden Sie unter einer der folgenden chronischen Erkrankungen? (kategorisiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
keine chronische Erkrankung	68,4 %	66,9 %	69,8 %	82,3 %	69,4 %	48,2 %	65,0 %	67,1 %	71,5 %
chronische Erkrankung laut Home-Office-Verordnung	22,7 %	26,2 %	19,4 %	11,0 %	20,3 %	43,2 %	25,7 %	24,0 %	19,7 %
andere chronische Erkrankungen	8,9 %	6,8 %	10,9 %	6,6 %	10,3 %	8,6 %	9,3 %	8,9 %	8,8 %
gültige Angaben	5.683	2.774	2.909	1.594	2.844	1.245	506	3.169	1.832

Tabelle 2.23:

sd19a Leiden Sie unter einer der folgenden chronischen Erkrankungen?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Nein, ich leide an keiner chronischen Erkrankung.	68,4 %	66,9 %	69,8 %	82,4 %	69,4 %	48,2 %	65,0 %	67,1 %	71,5 %
Ja, ich leide an einer Herzerkrankung.	4,3 %	5,1 %	3,6 %	1,2 %	2,3 %	12,9 %	4,0 %	4,3 %	4,6 %
Ja, ich leide an Diabetes.	5,7 %	7,9 %	3,6 %	1,8 %	5,0 %	12,3 %	8,7 %	6,0 %	4,1 %
Ja, ich leide an Bluthochdruck.	14,3 %	16,5 %	12,2 %	2,3 %	14,2 %	30,0 %	14,0 %	15,2 %	12,7 %
Ja, ich leide an einer Erkrankung der Lunge, z. B. Asthma, COPD.	5,9 %	5,9 %	5,8 %	5,1 %	4,8 %	9,3 %	7,1 %	6,2 %	5,1 %
Ja, ich leide an einem Immundefekt oder nehme Medikamente ein, die mein Immunsystem beeinflussen (z. B. Immunsuppressiva oder Cortisontherapie).	2,5 %	2,3 %	2,6 %	2,8 %	2,5 %	2,2 %	3,8 %	2,7 %	1,6 %
Ja, ich leide an anderen chronischen Erkrankungen.	8,9 %	6,8 %	10,9 %	6,6 %	10,3 %	8,6 %	9,3 %	8,9 %	8,8 %
gültige Angaben	5.683	2.774	2.909	1.594	2.844	1.246	506	3.169	1.832

Tabelle 2.24:

sd20 Was ist Ihre Religionszugehörigkeit, bzw. welcher Glaubensrichtung fühlen Sie sich zugehörig?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ohne Bekenntnis	30,9 %	32,8 %	29,1 %	28,2 %	33,5 %	28,4 %	26,8 %	30,0 %	33,2 %
römisch-katholisch	57,5 %	55,9 %	59,0 %	54,0 %	57,8 %	61,1 %	54,0 %	59,5 %	55,4 %
islamisch	2,0 %	2,6 %	1,5 %	6,0 %	0,5 %	0,3 %	6,1 %	1,8 %	1,1 %
evangelisch	5,6 %	5,1 %	6,0 %	4,6 %	5,2 %	7,5 %	4,2 %	5,1 %	6,7 %
orthodox	1,3 %	1,3 %	1,2 %	3,2 %	0,5 %	0,5 %	4,2 %	1,0 %	,9 %
andere christliche Kirchen	1,1 %	1,0 %	1,2 %	1,7 %	0,8 %	0,9 %	2,5 %	1,1 %	,8 %
mosaisch	,3 %	,4 %	,2 %	0,7 %	0,1 %	0,2 %	,8 %	,1 %	,4 %
buddhistisch	,3 %	,3 %	,3 %	0,4 %	0,4 %	0,1 %	,4 %	,2 %	,5 %
hinduistisch	,1 %	,1 %	,1 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,1 %	,1 %
andere	1,0 %	,8 %	1,3 %	0,9 %	1,1 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	,9 %
gültige Angaben	5.739	2.800	2.939	1.621	2.835	1.284	526	3.210	1.826

Tabelle 2.25:

WELLE 2: s0a Beginnen wir mit dem Thema Ernährung. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich achte sehr auf ausgewogene Ernährung.	35,0 %	27,2 %	42,5 %	32,5 %	32,2 %	44,2 %	31,8 %	32,2 %	40,6 %
Ich achte ein wenig auf ausgewogene Ernährung.	58,6 %	64,6 %	52,9 %	59,1 %	61,5 %	51,5 %	61,1 %	60,6 %	54,3 %
Ich achte gar nicht auf ausgewogene Ernährung.	6,4 %	8,2 %	4,6 %	8,3 %	6,3 %	4,3 %	7,1 %	7,1 %	5,1 %
gültige Angaben	3.250	1.581	1.668	839	1.665	746	198	1.892	1.072

Tabelle 2.26:

WELLE 2: s0b Betreiben Sie Ausdauersport (z. B. Laufen, Radfahren, Fitnessstudio, Schwimmen, Wandern) oder nicht?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
3-mal pro Woche oder öfter	23,4 %	24,5 %	22,4 %	24,0 %	21,4 %	27,3 %	20,0 %	22,0 %	26,9 %
2-mal pro Woche	20,4 %	19,6 %	21,3 %	17,5 %	22,1 %	20,1 %	16,4 %	19,7 %	22,6 %
1-mal pro Woche	17,4 %	17,8 %	17,0 %	18,3 %	17,5 %	15,9 %	16,4 %	16,6 %	18,7 %
1- bis 3-mal pro Monat	12,5 %	13,5 %	11,6 %	14,6 %	13,1 %	8,8 %	10,3 %	13,7 %	11,2 %
Seltener als 1-mal pro Monat	12,0 %	12,5 %	11,6 %	14,1 %	12,1 %	9,7 %	13,8 %	12,2 %	11,3 %
nie	10,6 %	9,2 %	12,0 %	8,1 %	10,1 %	14,6 %	17,4 %	11,7 %	7,2 %
Ich betreibe zwar wenig oder nie Ausdauersport, mache aber beruflich viel Bewegung.	3,6 %	3,0 %	4,2 %	3,4 %	3,7 %	3,5 %	5,6 %	4,0 %	2,1 %
gültige Angaben	3.239	1.582	1.656	842	1.659	740	195	1.887	1.071

Tabelle 2.27:

WELLE 2: s1 Wie viele Menschen stehen Ihnen so nahe, dass Sie sich auf sie verlassen können, wenn Sie ernste persönliche Probleme haben? Sowohl Familienmitglieder als auch andere Personen (Freundinnen/Freunde, Nachbarinnen/Nachbarn, Kolleginnen/Kollegen etc.) sind zu zählen.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
keine	2,8 %	3,8 %	2,0 %	4,9 %	2,5 %	1,5 %	5,9 %	2,8 %	2,1 %
1 oder 2	29,3 %	31,6 %	27,2 %	29,4 %	27,8 %	32,8 %	37,6 %	32,1 %	22,9 %
3 bis 5	48,3 %	47,2 %	49,4 %	45,7 %	50,3 %	46,9 %	40,6 %	47,2 %	51,7 %
6 oder mehr	19,5 %	17,4 %	21,4 %	20,0 %	19,5 %	18,8 %	15,8 %	17,9 %	23,3 %
gültige Angaben	3.266	1.590	1.677	855	1.668	744	202	1.900	1.075

Tabelle 2.28:

WELLE 2: s2 Wie viel Interesse und emotionale Anteilnahme zeigen andere Menschen an dem, was Sie tun? Bitte treffen Sie eine Auswahl zwischen 1 (viel) und 5 (gar nicht).

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
viel	37,9 %	30,5 %	44,9 %	37,5 %	37,4 %	39,4 %	26,7 %	35,5 %	44,7 %
etwas	39,8 %	42,8 %	37,0 %	41,2 %	40,3 %	37,1 %	39,6 %	40,3 %	39,2 %
weder viel noch wenig	15,5 %	17,8 %	13,3 %	13,8 %	15,6 %	17,1 %	22,3 %	17,4 %	10,4 %
wenig	5,3 %	7,0 %	3,6 %	5,6 %	5,2 %	5,0 %	7,4 %	5,4 %	4,3 %
gar nicht	1,6 %	1,9 %	1,3 %	1,9 %	1,6 %	1,5 %	4,0 %	1,5 %	1,4 %
gültige Angaben	3.265	1.589	1.675	856	1.667	744	202	1.901	1.074

Tabelle 2.29:

WELLE 2: s3 Wie einfach ist es für Sie, praktische Hilfe von Nachbarinnen/Nachbarn zu erhalten, wenn Sie diese benötigen? Bitte treffen Sie eine Auswahl zwischen 1 (sehr einfach) und 5 (sehr schwierig).

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr einfach	24,1 %	22,3 %	25,8 %	16,7 %	27,4 %	25,2 %	26,1 %	25,3 %	22,2 %
einfach	37,5 %	39,2 %	35,9 %	34,1 %	36,7 %	43,2 %	35,0 %	36,9 %	37,9 %
weder einfach noch schwierig	25,9 %	26,6 %	25,2 %	33,4 %	22,4 %	24,8 %	26,6 %	26,2 %	25,7 %
schwierig	9,5 %	8,9 %	10,1 %	11,3 %	10,5 %	5,2 %	8,9 %	8,8 %	10,7 %
sehr schwierig	3,0 %	3,0 %	3,0 %	4,4 %	2,9 %	1,6 %	3,4 %	2,7 %	3,5 %
gültige Angaben	3.268	1.593	1.673	858	1.667	743	203	1.900	1.076

Tabelle 2.30:

WELLE 2: s4 Wie oft haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen an Geselligkeit mangelt?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
oft	7,9 %	7,2 %	8,5 %	11,6 %	6,4 %	7,1 %	6,9 %	7,7 %	7,9 %
manchmal	43,1 %	41,1 %	45,0 %	48,7 %	42,3 %	38,5 %	43,6 %	42,7 %	44,1 %
fast nie	49,0 %	51,7 %	46,5 %	39,7 %	51,4 %	54,4 %	49,5 %	49,6 %	48,0 %
gültige Angaben	3.267	1.592	1.675	854	1.668	746	202	1.902	1.073

Tabelle 2.31:

WELLE 2: s5 Wie oft haben Sie das Gefühl, ausgeschlossen zu sein?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
oft	5,4 %	4,6 %	6,1 %	10,5 %	3,9 %	2,7 %	5,9 %	5,3 %	5,1 %
manchmal	28,2 %	26,4 %	29,9 %	39,4 %	25,8 %	20,7 %	24,8 %	28,0 %	29,5 %
fast nie	66,5 %	69,0 %	64,0 %	50,1 %	70,3 %	76,6 %	69,3 %	66,7 %	65,4 %
gültige Angaben	3.266	1.593	1.674	855	1.669	744	202	1.903	1.072

Tabelle 2.32:

WELLE 2: s6 Wie oft fühlen Sie sich von anderen isoliert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
oft	5,1 %	5,2 %	4,8 %	10,5 %	3,6 %	2,0 %	5,0 %	5,0 %	4,8 %
manchmal	22,7 %	20,4 %	25,0 %	28,8 %	21,5 %	18,2 %	23,6 %	21,8 %	24,1 %
fast nie	72,2 %	74,4 %	70,2 %	60,7 %	74,9 %	79,7 %	71,4 %	73,2 %	71,1 %
gültige Angaben	3.263	1.590	1.671	855	1.667	740	199	1.898	1.075

Tabelle 2.33:

WELLE 2: s7a Haben Sie Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren betreffende Betreuungspflichten?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja (Anzahl der Kinder bitte eintragen)	24,0 %	23,9 %	24,1 %	23,9 %	33,1 %	3,7 %	15,3 %	21,6 %	30,5 %
nein	76,0 %	76,1 %	75,9 %	76,1 %	66,9 %	96,3 %	84,7 %	78,4 %	69,5 %
gültige Angaben	3.278	1.597	1.681	859	1.672	747	202	1.909	1.077

Tabelle 2.34:

WELLE 2: s7a_x Haben Sie Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren betreffende Betreuungspflichten? Ja, Anzahl der Kinder ...

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1	50,1 %	51,7 %	48,6 %	61,5 %	46,4 %	40,7 %	67,7 %	50,0 %	48,8 %
2	42,1 %	42,5 %	41,7 %	35,1 %	44,2 %	51,9 %	22,6 %	43,4 %	42,1 %
3	6,4 %	4,5 %	8,1 %	2,9 %	7,8 %	3,7 %	9,7 %	4,9 %	7,9 %
4	1,4 %	1,3 %	1,5 %	0,5 %	1,6 %	3,7 %	0,0 %	1,7 %	1,2 %
gültige Angaben	786	381	405	205	552	27	31	412	328

Tabelle 2.35:

s8 Haben Sie sonst private Betreuungspflichten gegenüber anderen Personen, die auf Ihre Hilfe angewiesen sind (z. B. Ältere oder Gebrechliche oder Menschen mit physischen oder kognitiven Einschränkungen)?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	15,5 %	13,4 %	17,5 %	7,6 %	18,7 %	17,7 %	13,9 %	16,8 %	12,6 %
nein	84,5 %	86,6 %	82,5 %	92,4 %	81,3 %	82,3 %	86,1 %	83,2 %	87,4 %
gültige Angaben	3.278	1.596	1.681	859	1.672	747	201	1.909	1.077

Tabelle 2.36:

WELLE 2: s9 Haben sich Ihre Betreuungspflichten gegenüber Kindern oder sonstigen Personen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie verändert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Die Betreuungspflichten haben stark zugenommen.	12,8 %	12,4 %	13,2 %	23,3 %	10,6 %	6,5 %	25,5 %	11,2 %	14,5 %
Die Betreuungspflichten haben zugenommen.	30,6 %	28,9 %	31,9 %	20,6 %	34,2 %	28,6 %	20,0 %	31,0 %	31,5 %
keine Veränderung	52,3 %	55,9 %	49,2 %	51,4 %	51,6 %	57,8 %	50,9 %	54,2 %	49,5 %
Die Betreuungspflichten haben abgenommen.	3,5 %	2,0 %	4,7 %	4,3 %	2,7 %	5,8 %	1,8 %	3,3 %	2,8 %
Die Betreuungspflichten haben deutlich abgenommen.	,9 %	,7 %	,9 %	0,4 %	0,9 %	1,3 %	1,8 %	,3 %	1,7 %
gültige Angaben	1.174	540	634	253	767	154	55	662	422

Tabelle 2.37:

WELLE 2: s10 Sind Sie derzeit berufstätig (zumindest in Teilzeit)?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	61,1 %	66,4 %	56,1 %	71,9 %	80,0 %	6,5 %	40,1 %	58,3 %	71,3 %
nein	38,9 %	33,6 %	43,9 %	28,1 %	20,0 %	93,5 %	59,9 %	41,7 %	28,7 %
gültige Angaben	3.261	1.587	1.673	853	1.666	741	202	1.900	1.071

Tabelle 2.38:

WELLE 2: s11 Aus heutiger Sicht: Hatte die Corona-Krise irgendwelche negativen Auswirkungen auf Ihre Arbeitstätigkeit?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ja, ich bin weiterhin berufstätig, arbeite aber derzeit vor allem von zu Hause aus.	8,7 %	10,3 %	7,2 %	11,4 %	10,8 %	0,8 %	4,0 %	6,9 %	13,2 %
Ja, ich bin zwar weiterhin berufstätig, aber befinde mich derzeit in Kurzarbeit.	3,2 %	3,1 %	3,2 %	5,6 %	3,3 %	0,0 %	3,5 %	3,2 %	3,4 %
Ja, ich gehöre einer Berufsgruppe an, die derzeit nicht arbeiten darf.	,4 %	,3 %	,5 %	1,0 %	0,1 %	0,3 %	0,0 %	,4 %	,7 %
Ja, ich habe infolge der Corona-Krise meinen Arbeitsplatz verloren und bin derzeit arbeitslos.	2,0 %	1,7 %	2,2 %	3,6 %	2,0 %	0,0 %	2,0 %	2,3 %	1,6 %
Ja, ich habe infolge der Corona-Krise meinen Arbeitsplatz verloren, habe aber wieder einen Job gefunden.	1,7 %	1,8 %	1,6 %	3,4 %	1,5 %	0,0 %	1,0 %	1,9 %	1,6 %
Nein, ich bin weiterhin berufstätig und arbeite weiterhin an meinem gewohnten Arbeitsplatz.	43,0 %	47,0 %	39,1 %	47,5 %	57,4 %	4,8 %	27,2 %	42,2 %	47,6 %
Nein, ich war bereits vor der Corona-Krise nicht berufstätig.	31,4 %	28,1 %	34,6 %	19,7 %	14,6 %	82,2 %	50,5 %	34,2 %	21,8 %
andere Auswirkungen	9,7 %	7,8 %	11,5 %	7,3 %	10,1 %	11,4 %	11,9 %	9,0 %	10,2 %
gültige Angaben	3.266	1.590	1.675	859	1.671	747	202	1.904	1.074

3 Auswirkungen der Corona-Pandemie

Tabelle 3.1:

c1a Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein psychisches Wohlbefinden deutlich verschlechtert (z. B. aus Angst vor einer Ansteckung, aus Sorge um nahestehende Menschen).

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 trifft überhaupt nicht zu	29,9 %	31,0 %	28,9 %	26,2 %	30,6 %	33,0 %	29,9 %	30,9 %	27,3 %
2	17,9 %	19,5 %	16,4 %	14,6 %	18,6 %	20,6 %	14,9 %	17,7 %	19,5 %
3	14,2 %	15,3 %	13,2 %	13,3 %	15,0 %	13,6 %	9,8 %	13,8 %	16,4 %
4	6,8 %	6,4 %	7,3 %	9,5 %	5,8 %	5,7 %	8,0 %	6,6 %	7,1 %
5	9,3 %	9,3 %	9,4 %	9,4 %	9,3 %	9,4 %	12,7 %	9,3 %	8,2 %
6	6,2 %	5,6 %	6,7 %	8,4 %	5,7 %	4,4 %	7,8 %	6,0 %	5,9 %
7	7,1 %	6,5 %	7,7 %	8,6 %	7,1 %	5,1 %	7,0 %	6,9 %	7,5 %
8	4,2 %	3,2 %	5,2 %	5,0 %	3,9 %	4,1 %	3,5 %	4,4 %	4,2 %
9	1,9 %	1,4 %	2,4 %	2,0 %	1,8 %	2,0 %	3,1 %	1,8 %	1,9 %
10 trifft sehr zu	2,4 %	1,9 %	2,9 %	3,1 %	2,1 %	2,1 %	3,1 %	2,5 %	2,0 %
gültige Angaben	5.867	2.856	3.011	1.635	2.926	1.305	511	3.271	1.889

Tabelle 3.2:

c1b Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich meine Arbeits- und Einkommenssituation deutlich verschlechtert (z. B. Sorge um meinen Arbeitsplatz, arbeitslos geworden, in Kurzarbeit, ich habe jetzt ein deutlich geringeres Einkommen).

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 trifft überhaupt nicht zu	54,0 %	50,8 %	57,0 %	36,4 %	50,4 %	84,0 %	56,9 %	53,9 %	52,5 %
2	10,1 %	10,4 %	9,9 %	9,7 %	11,7 %	7,1 %	9,4 %	10,1 %	10,2 %
3	6,7 %	7,2 %	6,2 %	8,8 %	7,6 %	1,9 %	7,3 %	6,0 %	7,9 %
4	4,1 %	4,7 %	3,6 %	6,6 %	4,2 %	0,9 %	4,3 %	4,3 %	4,0 %
5	5,0 %	5,8 %	4,3 %	7,3 %	5,1 %	1,8 %	4,9 %	5,0 %	5,4 %
6	3,8 %	4,7 %	3,0 %	6,2 %	3,9 %	0,6 %	3,3 %	4,0 %	3,4 %
7	4,0 %	4,6 %	3,5 %	6,8 %	4,0 %	0,6 %	3,9 %	3,9 %	4,1 %
8	3,8 %	3,8 %	3,8 %	7,0 %	3,4 %	0,5 %	3,5 %	3,4 %	4,5 %
9	2,6 %	2,5 %	2,7 %	3,4 %	3,0 %	0,7 %	1,4 %	3,0 %	2,5 %
10 trifft sehr zu	5,8 %	5,4 %	6,1 %	7,8 %	6,5 %	1,8 %	4,9 %	6,3 %	5,3 %
gültige Angaben	5.856	2.845	3.007	1.633	2.921	1.299	508	3.262	1.890

Tabelle 3.3:

c1c Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein soziales Wohlbefinden deutlich verschlechtert (z. B. durch Einsamkeit, fehlende Kontakte zu wichtigen Menschen, intensive Betreuungsaufgaben).

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 trifft überhaupt nicht zu	21,0 %	21,2 %	20,7 %	17,0 %	20,7 %	26,6 %	22,1 %	21,4 %	19,3 %
2	16,9 %	17,8 %	16,1 %	10,4 %	19,2 %	20,1 %	12,5 %	17,3 %	17,5 %
3	13,9 %	14,8 %	12,9 %	11,2 %	14,0 %	16,7 %	15,4 %	13,6 %	14,0 %
4	7,9 %	7,5 %	8,3 %	9,2 %	7,6 %	7,1 %	7,7 %	7,8 %	8,1 %
5	9,0 %	9,6 %	8,4 %	10,0 %	9,1 %	7,6 %	10,1 %	9,2 %	8,5 %
6	7,7 %	7,8 %	7,7 %	11,6 %	6,8 %	5,2 %	8,3 %	7,8 %	7,5 %
7	8,4 %	8,2 %	8,6 %	11,1 %	7,8 %	6,3 %	8,1 %	8,2 %	9,1 %
8	7,4 %	6,9 %	7,8 %	11,2 %	6,8 %	3,9 %	6,7 %	7,0 %	8,3 %
9	3,5 %	2,6 %	4,3 %	4,7 %	3,1 %	2,8 %	4,0 %	3,5 %	3,4 %
10 trifft sehr zu	4,3 %	3,5 %	5,1 %	3,6 %	4,9 %	3,7 %	5,1 %	4,3 %	4,2 %
gültige Angaben	5.830	2.835	2.996	1.626	2.912	1.291	506	3.246	1.882

Tabelle 3.4:

c1d Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein Leben insgesamt deutlich verschlechtert.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 trifft überhaupt nicht zu	30,1 %	29,2 %	30,9 %	24,7 %	29,0 %	39,0 %	34,7 %	30,0 %	28,2 %
2	22,1 %	22,6 %	21,6 %	16,0 %	23,9 %	25,6 %	14,1 %	23,1 %	23,2 %
3	13,0 %	13,1 %	12,9 %	13,2 %	13,5 %	11,6 %	11,3 %	12,6 %	13,9 %
4	7,1 %	8,1 %	6,2 %	10,1 %	6,7 %	4,3 %	6,3 %	6,4 %	8,3 %
5	9,4 %	9,5 %	9,3 %	12,0 %	8,5 %	8,1 %	13,3 %	9,4 %	8,4 %
6	6,4 %	6,4 %	6,4 %	9,6 %	6,0 %	3,2 %	8,9 %	6,2 %	6,4 %
7	5,3 %	5,1 %	5,5 %	6,7 %	5,4 %	3,2 %	5,6 %	5,3 %	5,1 %
8	3,2 %	3,2 %	3,2 %	4,1 %	3,1 %	2,3 %	2,0 %	3,3 %	3,4 %
9	1,6 %	1,4 %	1,9 %	2,0 %	1,6 %	1,3 %	1,4 %	1,8 %	1,6 %
10 trifft sehr zu	1,9 %	1,5 %	2,2 %	1,6 %	2,3 %	1,3 %	2,4 %	2,0 %	1,5 %
gültige Angaben	5.736	2.808	2.928	1.581	2.883	1.272	496	3.199	1.855

Tabelle 3.5:

WELLE 2: c1a Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein psychisches Wohlbefinden deutlich verschlechtert (z. B. aus Angst vor einer Ansteckung, aus Sorge um nahestehende Menschen).

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 trifft überhaupt nicht zu	31,9 %	34,0 %	29,9 %	25,2 %	32,3 %	38,6 %	37,6 %	32,2 %	29,9 %
2	16,6 %	16,8 %	16,4 %	13,0 %	18,0 %	17,9 %	11,9 %	17,2 %	16,5 %
3	13,9 %	15,4 %	12,5 %	15,1 %	13,5 %	13,5 %	8,9 %	13,7 %	15,4 %
4	7,1 %	6,0 %	8,1 %	8,5 %	6,8 %	5,9 %	5,4 %	6,5 %	8,6 %
5	9,5 %	9,1 %	9,9 %	9,9 %	9,0 %	10,0 %	12,4 %	9,8 %	8,3 %
6	7,1 %	7,5 %	6,7 %	12,6 %	6,2 %	2,9 %	5,4 %	7,6 %	6,8 %
7	6,6 %	4,7 %	8,5 %	7,2 %	6,6 %	5,7 %	6,4 %	5,9 %	7,7 %
8	3,5 %	3,1 %	3,9 %	4,3 %	3,6 %	2,7 %	5,9 %	3,4 %	3,5 %
9	1,3 %	1,1 %	1,5 %	1,2 %	1,3 %	1,5 %	1,5 %	1,3 %	1,1 %
10 trifft sehr zu	2,4 %	2,3 %	2,6 %	3,0 %	2,6 %	1,3 %	4,5 %	2,4 %	2,2 %
gültige Angaben	3.274	1.591	1.680	857	1.670	749	202	1.908	1.074

Tabelle 3.6:

WELLE 2: c1b Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich meine Arbeits- und Einkommenssituation deutlich verschlechtert (z. B. Sorge um meinen Arbeitsplatz, arbeitslos geworden, in Kurzarbeit, ich habe jetzt ein deutlich geringeres Einkommen).

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 trifft überhaupt nicht zu	58,5 %	55,8 %	61,1 %	40,9 %	55,7 %	85,1 %	58,6 %	59,4 %	56,1 %
2	11,3 %	12,0 %	10,6 %	11,1 %	13,0 %	7,8 %	15,3 %	10,3 %	12,5 %
3	7,5 %	7,9 %	7,1 %	10,5 %	8,0 %	2,8 %	3,9 %	8,3 %	6,9 %
4	3,5 %	3,3 %	3,6 %	5,8 %	3,7 %	0,4 %	6,4 %	3,1 %	3,7 %
5	5,7 %	6,9 %	4,7 %	9,7 %	5,6 %	1,5 %	6,4 %	5,6 %	5,9 %
6	2,2 %	2,1 %	2,3 %	3,0 %	2,5 %	0,7 %	1,0 %	2,0 %	2,7 %
7	3,3 %	3,5 %	3,2 %	6,5 %	3,0 %	0,4 %	2,5 %	3,4 %	3,6 %
8	2,8 %	2,8 %	2,9 %	5,2 %	2,6 %	0,5 %	3,4 %	2,7 %	2,9 %
9	1,6 %	1,8 %	1,4 %	2,6 %	1,7 %	0,4 %	,5 %	1,8 %	1,7 %
10 trifft sehr zu	3,5 %	4,0 %	3,1 %	4,8 %	4,4 %	0,4 %	2,0 %	3,5 %	4,1 %
gültige Angaben	3.269	1.589	1.678	859	1.667	744	203	1.902	1.075

Tabelle 3.7:

WELLE 2: c1c Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein soziales Wohlbefinden deutlich verschlechtert (z. B. durch Einsamkeit, fehlende Kontakte zu wichtigen Menschen, intensive Betreuungsaufgaben).

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 trifft überhaupt nicht zu	30,0 %	30,8 %	29,1 %	24,5 %	29,8 %	36,6 %	37,9 %	30,3 %	27,0 %
2	17,9 %	17,5 %	18,3 %	11,9 %	19,4 %	21,7 %	16,7 %	18,3 %	18,2 %
3	12,4 %	13,0 %	11,8 %	11,2 %	12,8 %	12,9 %	12,3 %	13,1 %	11,4 %
4	7,2 %	8,2 %	6,1 %	9,5 %	6,2 %	6,7 %	5,4 %	7,2 %	7,5 %
5	9,4 %	10,1 %	8,7 %	11,4 %	9,4 %	6,8 %	8,4 %	9,3 %	9,5 %
6	6,5 %	6,5 %	6,6 %	9,7 %	6,6 %	2,8 %	7,9 %	6,1 %	7,3 %
7	6,2 %	4,5 %	7,6 %	8,6 %	5,4 %	4,8 %	3,9 %	5,5 %	7,9 %
8	4,8 %	4,2 %	5,5 %	5,4 %	4,8 %	4,4 %	3,9 %	4,9 %	4,8 %
9	2,6 %	2,6 %	2,7 %	4,0 %	2,6 %	1,1 %	2,5 %	2,5 %	2,9 %
10 trifft sehr zu	3,1 %	2,6 %	3,5 %	3,9 %	3,1 %	2,0 %	1,0 %	2,9 %	3,6 %
gültige Angaben	3.265	1.589	1.676	857	1.662	745	203	1.899	1.073

Tabelle 3.8:

WELLE 2: c1d Seit Ausbruch der Corona-Krise hat sich mein Leben insgesamt deutlich verschlechtert.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 trifft überhaupt nicht zu	34,3 %	34,7 %	33,9 %	26,3 %	34,1 %	43,4 %	41,5 %	34,6 %	32,1 %
2	22,4 %	22,4 %	22,4 %	17,3 %	22,8 %	27,3 %	16,0 %	22,4 %	23,7 %
3	11,9 %	12,7 %	11,1 %	14,7 %	12,0 %	8,7 %	11,0 %	12,1 %	11,5 %
4	5,5 %	4,7 %	6,3 %	6,7 %	5,6 %	4,3 %	8,5 %	5,3 %	5,7 %
5	8,8 %	9,0 %	8,6 %	11,6 %	8,3 %	6,8 %	9,5 %	8,5 %	8,8 %
6	6,0 %	6,3 %	5,8 %	9,1 %	6,0 %	2,7 %	4,0 %	5,6 %	7,2 %
7	4,6 %	3,8 %	5,4 %	6,6 %	4,4 %	2,7 %	2,5 %	4,9 %	4,7 %
8	3,5 %	3,2 %	3,6 %	4,5 %	3,1 %	3,0 %	4,0 %	3,5 %	3,2 %
9	1,1 %	1,0 %	1,1 %	0,8 %	1,3 %	0,7 %	,5 %	1,0 %	1,4 %
10 trifft sehr zu	2,0 %	2,1 %	1,8 %	2,4 %	2,4 %	0,4 %	2,5 %	2,0 %	1,7 %
gültige Angaben	3.229	1.570	1.657	837	1.655	737	200	1.872	1.068

4 Nikotinkonsum

Tabelle 4.1:
prävalenz_zigaretten Übersichtvariable Zigarettenkonsum (berechnet aus n1 bis n6)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten 30 Tagen: täglich oder fast täglich geraucht	17,2 %	17,3 %	17,0 %	17,3 %	19,4 %	12,1 %	21,0 %	18,3 %	13,9 %
in den letzten 30 Tagen: gelegentlich bis sehr selten geraucht	6,5 %	7,0 %	6,0 %	12,7 %	4,5 %	2,8 %	7,3 %	6,6 %	6,1 %
kein aktueller Konsum, aber früher täglich geraucht	24,9 %	27,5 %	22,4 %	9,8 %	28,0 %	37,4 %	17,6 %	27,5 %	23,0 %
kein aktueller Konsum, aber früher gelegentlich probiert	5,8 %	4,7 %	6,8 %	4,9 %	5,6 %	7,2 %	3,8 %	6,3 %	5,6 %
kein aktueller Konsum, aber früher vereinzelt probiert	20,2 %	19,6 %	20,9 %	19,3 %	20,7 %	20,4 %	13,9 %	18,7 %	25,3 %
nie im Leben eine ganze Zigarette geraucht	25,5 %	23,9 %	27,1 %	36,0 %	21,9 %	20,1 %	36,5 %	22,7 %	26,1 %
gültige Angaben	5.909	2.885	3.024	1.679	2.929	1.300	524	3.294	1.887

Tabelle 4.2:
n1 Haben Sie jemals in Ihrem Leben eine ganze Zigarette geraucht?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	74,6 %	76,2 %	73,0 %	64,2 %	78,2 %	80,0 %	64,0 %	77,4 %	74,0 %
nein	25,4 %	23,8 %	27,0 %	35,8 %	21,8 %	20,0 %	36,0 %	22,6 %	26,0 %
gültige Angaben	5.927	2.893	3.033	1.688	2.935	1.304	530	3.299	1.893

Tabelle 4.3:

n2 Haben Sie auch jemals in Ihrem Leben regelmäßig geraucht?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Nein, ich habe Zigaretten nur vereinzelt probiert.	21,5 %	20,9 %	22,1 %	22,4 %	21,3 %	20,8 %	16,6 %	19,8 %	26,6 %
Ja, ich habe regelmäßig geraucht, aber nie täglich.	9,5 %	8,8 %	10,2 %	13,1 %	7,7 %	8,9 %	9,7 %	10,0 %	8,4 %
Ja, ich habe regelmäßig geraucht, und im stärksten Monat habe ich täglich geraucht.	43,4 %	46,4 %	40,6 %	28,4 %	49,1 %	50,2 %	37,2 %	47,5 %	38,9 %
Nein, ich habe nie im Leben eine ganze Zigarette geraucht.	25,6 %	23,9 %	27,1 %	36,1 %	21,9 %	20,1 %	36,5 %	22,7 %	26,1 %
gültige Angaben	5.899	2.878	3.020	1.675	2.923	1.299	524	3.287	1.885

Tabelle 4.4:

n3 Haben Sie auch in den letzten 12 Monaten mindestens einen Monat lang täglich geraucht (unabhängig davon, ob Sie aktuell täglich rauchen)?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	17,9 %	18,2 %	17,7 %	17,6 %	20,6 %	12,4 %	18,7 %	19,6 %	14,7 %
Nein, aber ich habe in den letzten 12 Monaten gelegentlich geraucht.	3,4 %	3,9 %	3,0 %	3,6 %	4,1 %	1,8 %	2,3 %	3,0 %	4,9 %
Nein, ich habe in den letzten 12 Monaten gar nicht geraucht.	22,2 %	24,5 %	20,0 %	7,3 %	24,6 %	36,1 %	16,4 %	25,0 %	19,5 %
Ich habe nie täglich geraucht.	30,9 %	29,5 %	32,2 %	35,4 %	28,9 %	29,6 %	26,3 %	29,7 %	34,9 %
Ich habe nie im Leben eine ganze Zigarette geraucht.	25,5 %	23,9 %	27,0 %	36,0 %	21,9 %	20,0 %	36,4 %	22,7 %	26,0 %
gültige Angaben	5.914	2.887	3.028	1.679	2.932	1.302	525	3.295	1.890

Tabelle 4.5:

n4 Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, mit dem Rauchen aufzuhören (unabhängig davon, ob dieser Aufhörversuch erfolgreich war oder nicht)?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	6,3 %	6,3 %	6,3 %	7,0 %	6,7 %	4,5 %	5,5 %	7,2 %	5,0 %
nein	11,6 %	11,8 %	11,3 %	10,6 %	13,8 %	7,8 %	13,1 %	12,3 %	9,7 %
in den letzten 12 Monaten überhaupt nicht geraucht, davor täglich geraucht	22,2 %	24,5 %	20,0 %	7,3 %	24,6 %	36,1 %	16,4 %	25,0 %	19,5 %
in den letzten 12 Monaten nicht täglich geraucht	3,5 %	3,9 %	3,0 %	3,6 %	4,1 %	1,8 %	2,3 %	3,0 %	4,9 %
nie täglich geraucht	30,9 %	29,5 %	32,3 %	35,5 %	28,9 %	29,6 %	26,3 %	29,8 %	34,9 %
nie im Leben eine ganze Zigarette geraucht	25,5 %	23,9 %	27,0 %	36,1 %	21,9 %	20,0 %	36,4 %	22,7 %	26,0 %
gültige Angaben	5.910	2.884	3.026	1.678	2.928	1.302	525	3.291	1.890

Tabelle 4.6:

n5 Haben Sie bei Ihrem letzten Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, externe Hilfsmittel zum Rauchstopp verwendet, z. B. Apps, Nikotinersatzprodukte, Beratungsangebote oder Ähnliches?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja (siehe nächste Frage)	34,0 %	39,8 %	28,9 %	23,9 %	35,9 %	48,3 %	14,3 %	36,2 %	33,0 %
Nein, ich habe keine Hilfsmittel verwendet.	66,0 %	60,2 %	71,1 %	76,1 %	64,1 %	51,7 %	85,7 %	63,8 %	67,0 %
gültige Angaben	371	181	190	117	195	58	28	235	94

Tabelle 4.7:

n6 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Zigaretten geraucht?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja, täglich	14,6 %	14,6 %	14,6 %	13,7 %	16,9 %	10,5 %	18,3 %	15,9 %	11,1 %
ja, fast täglich	2,6 %	2,7 %	2,4 %	3,6 %	2,5 %	1,6 %	2,5 %	2,4 %	2,9 %
ja, gelegentlich	3,6 %	4,0 %	3,1 %	6,7 %	2,6 %	1,6 %	4,2 %	3,8 %	3,1 %
ja, sehr selten	2,9 %	3,1 %	2,8 %	6,0 %	1,9 %	1,2 %	3,1 %	2,8 %	3,1 %
nein	28,6 %	27,2 %	30,0 %	26,7 %	29,5 %	29,1 %	19,1 %	27,4 %	34,3 %
in den letzten 12 Monaten überhaupt nicht geraucht, davor täglich geraucht	22,2 %	24,5 %	20,0 %	7,3 %	24,6 %	35,9 %	16,4 %	25,0 %	19,5 %
nie im Leben eine ganze Zigarette geraucht	25,5 %	23,9 %	27,1 %	36,1 %	21,9 %	20,0 %	36,5 %	22,7 %	26,1 %
gültige Angaben	5.906	2.882	3.023	1.676	2.925	1.303	524	3.291	1.886

Tabelle 4.8:

n8_rec An Tagen, an denen Sie geraucht haben: Wie viel Stück Zigaretten waren das im Durchschnitt pro Tag? (kategorisiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
nie im Leben eine ganze Zigaretten geraucht	25,7 %	24,1 %	27,3 %	36,7 %	22,0 %	20,1 %	37,2 %	22,9 %	26,2 %
keine Zigarette in den letzten 12 Monaten geraucht	22,4 %	24,8 %	20,2 %	7,4 %	24,8 %	36,3 %	16,7 %	25,3 %	19,6 %
keine Zigarette in den letzten 30 Tagen geraucht	28,8 %	27,4 %	30,2 %	27,1 %	29,7 %	29,1 %	19,5 %	27,6 %	34,4 %
keine	,1 %	,0 %	,1 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,0 %	,1 %
1 bis 5 Zigaretten	8,2 %	8,6 %	7,9 %	14,3 %	6,8 %	3,7 %	9,7 %	7,8 %	8,4 %
6 bis 10 Zigaretten	5,1 %	4,9 %	5,3 %	5,8 %	5,1 %	4,2 %	5,4 %	5,3 %	4,7 %
11 bis 20 Zigaretten	7,7 %	8,1 %	7,4 %	7,5 %	9,0 %	5,0 %	8,4 %	9,0 %	5,3 %
mehr als 20 Zigaretten	1,9 %	2,2 %	1,7 %	1,0 %	2,6 %	1,6 %	2,7 %	2,1 %	1,2 %
gültige Angaben	5.857	2.855	3.001	1.648	2.910	1.296	514	3.262	1.878

Tabelle 4.9:

n9a Haben Sie in den 30 Tagen vor Ausbruch der Corona-Krise, also zwischen Mitte Februar und Mitte März, täglich Zigaretten geraucht?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	17,9 %	18,5 %	17,3 %	19,7 %	19,2 %	12,7 %	22,7 %	19,6 %	13,1 %
nein	34,3 %	33,0 %	35,5 %	36,8 %	34,3 %	31,1 %	24,4 %	32,6 %	41,2 %
in den letzten 12 Monaten überhaupt nicht geraucht, davor täglich geraucht	22,3 %	24,6 %	20,1 %	7,3 %	24,6 %	36,2 %	16,4 %	25,1 %	19,6 %
nie im Leben eine ganze Zigarette geraucht	25,6 %	23,9 %	27,1 %	36,2 %	21,9 %	20,1 %	36,5 %	22,7 %	26,1 %
gültige Angaben	5.901	2.879	3.021	1.672	2.928	1.300	524	3.286	1.887

Tabelle 4.10:

n9b Wie (falls überhaupt) hat sich Ihr Rauchverhalten seit dem Ausbruch der Corona-Krise (Mitte März) verändert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
An meinem Rauchverhalten hat sich seit Ausbruch der Corona-Krise nichts geändert.	39,5 %	39,6 %	39,5 %	39,4 %	41,8 %	34,4 %	32,9 %	39,2 %	43,2 %
Ich rauche seit Ausbruch der Corona-Krise weniger Zigaretten als davor.	4,1 %	4,8 %	3,4 %	7,5 %	3,1 %	1,7 %	5,3 %	4,3 %	3,3 %
Ich habe seit Ausbruch der Corona-Krise komplett aufgehört, Zigaretten zu rauchen.	1,8 %	1,7 %	2,0 %	3,0 %	1,1 %	2,0 %	2,4 %	1,9 %	1,4 %
Ich rauche seit Ausbruch der Corona-Krise mehr Zigaretten als davor.	3,9 %	3,2 %	4,7 %	4,5 %	4,7 %	1,4 %	3,0 %	3,9 %	4,0 %
Ich habe seit Ausbruch der Corona-Krise wieder zu rauchen begonnen.	,3 %	,3 %	,3 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	,2 %	,3 %	,4 %
In den letzten 12 Monaten habe ich überhaupt nicht geraucht, davor täglich geraucht.	23,4 %	25,6 %	21,3 %	7,6 %	25,9 %	38,8 %	17,4 %	26,4 %	20,5 %
Ich habe nie im Leben eine ganze Zigarette geraucht.	26,9 %	24,9 %	28,8 %	37,6 %	23,0 %	21,6 %	38,7 %	24,0 %	27,3 %
gültige Angaben	5.607	2.765	2.841	1.610	2.787	1.211	493	3.116	1.803

Tabelle 4.11:

n9c_1 bis n9c_7 Ich rauche jetzt weniger, weil ich ...(Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
... nur eingeschränkten Zugang zu Zigaretten habe.	,7 %	,8 %	,6 %	1,5 %	,2 %	,5 %	3,0 %	,5 %	,2 %
... derzeit weniger Geld zur Verfügung habe.	,7 %	1,0 %	,4 %	2,2 %	,2 %	0,0 %	1,0 %	,9 %	,3 %
... Angst habe, durch das Rauchen eine größere Anfälligkeit dafür zu haben, an einer Corona-Infektion zu erkranken.	1,5 %	2,0 %	1,1 %	3,1 %	1,2 %	,4 %	1,8 %	1,6 %	1,3 %
... weniger oft von Personen außer Haus in „Versuchung gebracht“ werde.	1,9 %	2,1 %	1,7 %	3,7 %	1,5 %	,6 %	2,8 %	1,7 %	1,9 %
... zu Hause nicht rauche.	2,0 %	2,4 %	1,6 %	3,6 %	1,4 %	1,0 %	2,4 %	2,2 %	1,6 %
Ich rauche jetzt weniger, weil ich keine günstigen Zigaretten aus dem Ausland mehr kaufen kann.	,2 %	,3 %	,2 %	,5 %	,2 %	0,0 %	,2 %	,3 %	,2 %
Ich rauche aus einem anderen Grund jetzt weniger.	1,2 %	,9 %	1,5 %	1,4 %	1,1 %	1,4 %	1,2 %	1,1 %	1,2 %
Konsumanstieg seit Corona-Krise	4,2 %	3,5 %	5,0 %	5,0 %	5,1 %	1,5 %	3,2 %	4,2 %	4,4 %
keine Veränderung im Rauchverhalten seit Corona-Krise	39,5 %	39,4 %	39,5 %	38,2 %	41,7 %	34,3 %	32,3 %	39,2 %	43,2 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten überhaupt nicht geraucht, davor täglich geraucht.	23,4 %	25,6 %	21,3 %	7,3 %	25,9 %	38,6 %	17,4 %	26,4 %	20,5 %
Ich habe nie im Leben eine ganze Zigarette geraucht.	26,9 %	24,9 %	28,8 %	38,7 %	23,0 %	21,8 %	38,7 %	24,0 %	27,3 %
gültige Angaben	5.607	2.766	2.840	1.610	2.787	1.211	493	3.116	1.803

Tabelle 4.12:

n9c_8 bis n9c_11 Ich rauche mehr, weil ich ... (Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
... derzeit viel Stress habe bzw. stark belastet bin.	2,0 %	1,6 %	2,3 %	2,1 %	2,6 %	,4 %	1,0 %	2,0 %	2,2 %
... jetzt mehr Freizeit bzw. weniger zu tun habe.	2,2 %	2,0 %	2,5 %	3,2 %	2,5 %	,6 %	2,0 %	2,1 %	2,4 %
Ich rauche jetzt mehr, weil ich zu Hause oft von anderen Personen „in Versuchung gebracht“ werde.	,4 %	,4 %	,5 %	,7 %	,4 %	,1 %	,2 %	,4 %	,7 %
Ich rauche aus einem anderen Grund jetzt mehr.	,5 %	,4 %	,6 %	,4 %	,6 %	,4 %	,2 %	,6 %	,4 %
gültige Angaben	5.606	2.766	2.841	1.610	2.787	1.211	492	3.116	1.804

Tabelle 4.13:

n10 In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal eine ganze Zigarette geraucht? Mit ... Jahren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
mit 12 Jahren oder jünger	5,7 %	7,7 %	3,8 %	5,0 %	6,5 %	4,8 %	4,7 %	5,9 %	5,7 %
mit 13 Jahren	4,1 %	4,0 %	4,3 %	5,9 %	4,1 %	1,8 %	4,1 %	4,4 %	3,7 %
mit 14 Jahren	10,7 %	11,3 %	10,2 %	10,7 %	11,1 %	10,2 %	10,3 %	11,0 %	10,2 %
mit 15 Jahren	12,0 %	13,2 %	10,7 %	11,7 %	13,4 %	8,9 %	9,7 %	13,2 %	10,6 %
mit 16 Jahren	15,6 %	15,7 %	15,5 %	13,5 %	16,4 %	15,0 %	14,6 %	17,5 %	13,4 %
mit 17 Jahren	7,9 %	7,9 %	8,0 %	4,8 %	8,6 %	10,2 %	5,5 %	8,2 %	8,3 %
mit 18 Jahren oder älter	17,9 %	15,8 %	20,0 %	10,3 %	17,5 %	28,4 %	13,8 %	16,5 %	21,7 %
noch nie im Leben eine Zigarette geraucht	26,1 %	24,4 %	27,6 %	38,1 %	22,4 %	20,7 %	37,2 %	23,2 %	26,5 %
gültige Angaben	5784	2819	2964	1.634	2.866	1.280	513	3216	1858

Tabelle 4.14:

n11 In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal regelmäßig geraucht? Mit ... Jahren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
mit 12 Jahren oder jünger	,7 %	1,0 %	,5 %	,9 %	,7 %	,3 %	1,2 %	,8 %	,6 %
mit 13 Jahren	1,1 %	1,0 %	1,1 %	1,9 %	1,0 %	,2 %	2,1 %	1,0 %	1,0 %
mit 14 Jahren	3,4 %	3,2 %	3,5 %	4,1 %	3,4 %	2,4 %	2,9 %	3,6 %	3,1 %
mit 15 Jahren	6,8 %	8,0 %	5,6 %	7,6 %	7,7 %	3,6 %	7,2 %	8,4 %	4,1 %
mit 16 Jahren	12,5 %	13,2 %	11,8 %	11,1 %	14,2 %	10,1 %	10,7 %	13,9 %	10,8 %
mit 17 Jahren	6,9 %	7,3 %	6,6 %	5,4 %	7,5 %	7,7 %	4,3 %	7,6 %	6,5 %
mit 18 Jahren oder älter	27,4 %	27,3 %	27,6 %	15,3 %	27,7 %	41,6 %	20,7 %	28,3 %	28,5 %
nie regelmäßig geraucht	15,2 %	14,7 %	15,7 %	15,6 %	15,6 %	13,4 %	13,6 %	13,5 %	19,0 %
noch nie im Leben eine Zigarette geraucht	26,0 %	24,3 %	27,6 %	38,1 %	22,2 %	20,7 %	37,2 %	23,1 %	26,4 %
gültige Angaben	5.800	2.833	2.965	1.377	2.432	1.111	513	3.230	1.864

Tabelle 4.15:

n12 Wie viele Stunden pro Tag sind Sie bei sich zu Hause dem Tabakrauch durch andere ausgesetzt?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
nie oder fast nie	85,6 %	84,5 %	86,8 %	74,5 %	89,6 %	90,9 %	76,9 %	85,4 %	89,3 %
weniger als eine Stunde am Tag	6,9 %	8,1 %	5,7 %	12,7 %	4,7 %	4,3 %	9,1 %	7,1 %	5,9 %
1 bis 5 Stunden am Tag	4,7 %	4,9 %	4,6 %	8,6 %	3,6 %	2,5 %	8,3 %	4,9 %	3,1 %
mehr als 5 Stunden am Tag	2,7 %	2,5 %	2,9 %	4,2 %	2,1 %	2,3 %	5,7 %	2,6 %	1,7 %
gültige Angaben	5.878	2.861	3.016	1.658	2.912	1.307	528	3.273	1.875

Tabelle 4.16:

n13 Sind Sie seit Ausbruch der Corona-Krise (ca. Mitte März) häufiger oder weniger häufig zu Hause dem Tabakrauch durch andere ausgesetzt?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich bin jetzt weniger häufig zu Hause dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt als zuvor.	25,5 %	25,4 %	25,6 %	23,5 %	20,7 %	41,8 %	35,9 %	27,9 %	17,5 %
Ich bin jetzt gleich oft zu Hause dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt wie zuvor.	68,9 %	69,4 %	68,5 %	66,6 %	75,4 %	55,3 %	53,3 %	66,9 %	77,8 %
Ich bin jetzt häufiger zu Hause dem Tabakrauch von anderen ausgesetzt als zuvor.	5,6 %	5,2 %	5,9 %	9,9 %	3,9 %	2,9 %	10,8 %	5,2 %	4,7 %
gültige Angaben	4.988	2.496	2.492	1.526	2.524	936	435	2.801	1.600

Tabelle 4.17:

prävalenz_ezig Übersichtsvariable E-Zigarettenkonsum (berechnet aus n14 bis n16)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten 30 Tagen: täglich oder fast täglich konsumiert	1,1 %	1,6 %	,7 %	2,4 %	0,1 %	0,0 %	2,1 %	1,1 %	,8 %
in den letzten 30 Tagen: gelegentlich bis sehr selten konsumiert	2,2 %	2,9 %	1,5 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	3,1 %	2,6 %	1,4 %
kein Konsum in den letzten 30 Tagen, aber im letzten Jahr	2,6 %	3,2 %	2,0 %	4,6 %	1,6 %	0,5 %	4,4 %	2,5 %	2,5 %
kein Konsum im letzten Jahr, aber zuvor	8,5 %	9,7 %	7,5 %	5,1 %	2,1 %	0,4 %	11,1 %	8,8 %	7,7 %
nie im Leben E-Zigarette konsumiert	85,5 %	82,6 %	88,3 %	13,8 %	6,9 %	5,1 %	79,4 %	85,1 %	87,7 %
gültige Angaben	5.919	2.886	3.033	72,4 %	88,3 %	93,5 %	524	3.299	1.890

Tabelle 4.18:

n14 Haben Sie jemals in Ihrem Leben E-Zigaretten konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	14,6 %	17,5 %	11,9 %	25,9 %	11,5 %	6,5 %	21,5 %	14,9 %	12,4 %
nein	85,4 %	82,5 %	88,1 %	74,1 %	88,5 %	93,5 %	78,5 %	85,1 %	87,6 %
gültige Angaben	5.928	2.888	3.040	1.712	2.939	1.312	530	3.300	1.892

Tabelle 4.19:

n15 Haben Sie in den letzten 12 Monaten E-Zigaretten konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	5,9 %	7,7 %	4,2 %	11,7 %	4,6 %	1,5 %	9,5 %	6,1 %	4,7 %
nein	8,5 %	9,7 %	7,5 %	13,9 %	6,9 %	5,0 %	11,1 %	8,8 %	7,7 %
nie im Leben E-Zigarette konsumiert	85,5 %	82,6 %	88,3 %	74,4 %	88,5 %	93,6 %	79,4 %	85,2 %	87,6 %
gültige Angaben	5.919	2.886	3.033	1.712	2.940	1.312	524	3.298	1.891

Tabelle 4.20:

n16 Haben Sie in den letzten 30 Tagen E-Zigaretten konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja, täglich	,9 %	1,3 %	,5 %	1,5 %	,9 %	,4 %	1,0 %	,9 %	,6 %
ja, fast täglich	,3 %	,3 %	,2 %	,4 %	,2 %	,3 %	1,1 %	,2 %	,3 %
ja, gelegentlich	1,1 %	1,4 %	,7 %	2,2 %	,8 %	,1 %	1,3 %	1,2 %	,7 %
ja, sehr selten	1,1 %	1,5 %	,8 %	2,5 %	,7 %	,4 %	1,5 %	1,3 %	,6 %
nein	2,6 %	3,2 %	2,0 %	5,1 %	2,0 %	,4 %	4,4 %	2,5 %	2,5 %
in den letzten 12 Monaten keine E-Zigarette konsumiert	8,5 %	9,7 %	7,5 %	13,9 %	6,9 %	5,0 %	11,1 %	8,8 %	7,7 %
nie im Leben E-Zigarette konsumiert	85,5 %	82,6 %	88,3 %	74,5 %	88,5 %	93,5 %	79,5 %	85,1 %	87,6 %
gültige Angaben	5.919	2.886	3.034	1.712	2.940	1.312	523	3.299	1.891

Tabelle 4.21:

n17 Wie (falls überhaupt) hat sich seit Ausbruch der Corona-Krise Ihr Konsum von E-Zigaretten verändert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
An meinem E-Zigaretten-Konsum hat sich nichts geändert.	3,6 %	4,6 %	2,6 %	6,8 %	2,9 %	1,0 %	5,0 %	4,0 %	2,4 %
Ich konsumiere seit dem Ausbruch der Corona-Krise weniger E-Zigaretten.	,6 %	,9 %	,4 %	1,6 %	0,3 %	0,0 %	,8 %	,5 %	,6 %
Ich konsumiere seit dem Ausbruch der Corona-Krise gar keine E-Zigaretten mehr.	,9 %	1,3 %	,7 %	1,7 %	0,9 %	0,2 %	2,7 %	,7 %	1,1 %
Ich konsumiere jetzt mehr E-Zigaretten als zuvor.	,4 %	,5 %	,3 %	0,5 %	0,4 %	0,1 %	,2 %	,4 %	,4 %
Ich habe erst seit dem Ausbruch der Corona-Krise mit dem Konsum von E-Zigaretten begonnen.	,1 %	,1 %	,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,0 %	0,0 %
In den letzten 12 Monaten habe ich keine E-Zigarette konsumiert.	8,6 %	9,7 %	7,5 %	14,3 %	6,9 %	5,1 %	11,1 %	8,8 %	7,7 %
Ich habe nie im Leben E-Zigarette konsumiert.	85,8 %	83,0 %	88,5 %	74,8 %	88,6 %	93,6 %	79,8 %	85,5 %	87,9 %
gültige Angaben	5.898	2.872	3.026	1.657	2.930	1.311	521	3.284	1.886

Tabelle 4.22:

n18 Spielen gesundheitliche Überlegungen eine Rolle für Ihren Konsum von E-Zigaretten (z. B. um das Konsumieren „normaler“ Rauchwaren zu reduzieren oder ganz aufzugeben)?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	3,4 %	4,4 %	2,3 %	5,4 %	3,2 %	1,0 %	2,9 %	3,5 %	3,0 %
nein	2,4 %	3,0 %	1,8 %	5,6 %	1,4 %	0,4 %	5,4 %	2,5 %	1,5 %
in den letzten 12 Monaten keine E-Zigarette geraucht	8,6 %	9,7 %	7,5 %	14,3 %	6,9 %	5,1 %	11,2 %	8,8 %	7,7 %
nie im Leben E-Zigarette geraucht	85,7 %	82,9 %	88,4 %	74,7 %	88,4 %	93,5 %	80,5 %	85,2 %	87,9 %
gültige Angaben	5.906	2.877	3.029	1.660	2.934	1.312	517	3.296	1.886

Tabelle 4.23:

prävalenz_shisha Übersichtvariable Shishakonsum (berechnet aus n19 bis n21)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten 30 Tagen: täglich oder fast täglich konsumiert	1,0 %	1,6 %	,5 %	3,2 %	0,2 %	0,2 %	3,3 %	,9 %	,4 %
in den letzten 30 Tagen: gelegentlich bis sehr selten konsumiert	2,1 %	2,5 %	1,6 %	6,3 %	0,6 %	0,0 %	3,4 %	2,3 %	1,3 %
kein Konsum in den letzten 30 Tagen, aber im letzten Jahr	4,0 %	4,9 %	3,1 %	10,4 %	2,0 %	0,2 %	5,4 %	3,9 %	3,9 %
kein Konsum im letzten Jahr, aber zuvor	25,7 %	27,2 %	24,3 %	39,4 %	25,0 %	9,7 %	18,2 %	24,1 %	31,6 %
nie im Leben Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht	67,2 %	63,8 %	70,5 %	40,8 %	72,2 %	90,0 %	69,8 %	68,7 %	62,9 %
gültige Angaben	5.918	2.882	3.034	1.677	2.933	1.308	523	3.293	1.893

Tabelle 4.24:

n19 Haben Sie jemals in Ihrem Leben Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	33,0 %	36,4 %	29,7 %	59,5 %	27,8 %	10,1 %	31,4 %	31,5 %	37,1 %
nein	67,0 %	63,6 %	70,3 %	40,5 %	72,2 %	89,9 %	68,6 %	68,5 %	62,9 %
gültige Angaben	5.933	2.890	3.043	1.690	2.934	1.309	532	3.300	1.894

Tabelle 4.25:

n20 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	7,1 %	9,1 %	5,2 %	19,9 %	2,8 %	0,3 %	12,0 %	7,2 %	5,5 %
nein	25,7 %	27,2 %	24,3 %	39,4 %	25,0 %	9,7 %	18,2 %	24,2 %	31,6 %
nie im Leben Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht	67,2 %	63,8 %	70,5 %	40,8 %	72,2 %	90,0 %	69,8 %	68,7 %	62,9 %
gültige Angaben	5.917	2.883	3.034	1.677	2.932	1.308	523	3.294	1.893

Tabelle 4.26:

n21 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja, täglich	,5 %	,8 %	,2 %	1,7 %	0,1 %	0,0 %	2,1 %	,4 %	,1 %
ja, fast täglich	,5 %	,8 %	,3 %	1,6 %	0,1 %	0,2 %	1,1 %	,5 %	,3 %
ja, gelegentlich	1,1 %	1,5 %	,9 %	3,5 %	0,3 %	0,0 %	2,1 %	1,3 %	,7 %
ja, sehr selten	,9 %	1,1 %	,7 %	2,7 %	0,3 %	0,0 %	1,3 %	1,1 %	,5 %
nein	4,0 %	4,9 %	3,1 %	10,4 %	2,0 %	0,2 %	5,4 %	3,9 %	3,9 %
in den letzten 12 Monaten keine Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht	25,7 %	27,1 %	24,3 %	39,3 %	25,0 %	9,7 %	18,2 %	24,1 %	31,6 %
nie im Leben Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht	67,2 %	63,8 %	70,5 %	40,8 %	72,2 %	90,0 %	69,8 %	68,7 %	62,9 %
gültige Angaben	5.918	2.884	3.034	1.678	2.933	1.308	523	3.294	1.892

Tabelle 4.27:

n22 Wie häufig haben Sie zwischen November 2019 und dem Ausbruch der Corona-Krise (März 2020) Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich	,2 %	,4 %	,1 %	0,7 %	0,1 %	0,0 %	,6 %	,2 %	,1 %
fast täglich	,5 %	,8 %	,3 %	1,7 %	0,1 %	0,1 %	1,1 %	,6 %	,2 %
gelegentlich	1,6 %	2,2 %	1,1 %	5,0 %	0,4 %	0,1 %	3,8 %	1,7 %	1,1 %
sehr selten	2,5 %	3,1 %	1,8 %	7,3 %	0,8 %	0,2 %	3,8 %	2,6 %	1,8 %
gar nicht	2,2 %	2,5 %	1,8 %	5,2 %	1,4 %	0,0 %	2,5 %	2,0 %	2,3 %
in den letzten 12 Monaten keine Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht	25,7 %	27,2 %	24,3 %	39,4 %	25,0 %	9,7 %	18,2 %	24,2 %	31,6 %
nie im Leben Shisha bzw. Wasserpfeife geraucht	67,3 %	63,8 %	70,5 %	40,8 %	72,2 %	90,0 %	69,9 %	68,7 %	62,9 %
gültige Angaben	5.915	2.882	3.033	1.675	2.932	1.308	522	3.292	1.893

Tabelle 4.28:
n23a Konsumprävalenz Zigarre

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	60,3 %	41,9 %	77,7 %	57,6 %	57,5 %	70,0 %	67,5 %	59,2 %	59,0 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	30,1 %	44,4 %	16,5 %	23,8 %	35,3 %	26,8 %	17,5 %	31,7 %	32,1 %
in den letzten 12 Mo- naten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	4,7 %	7,4 %	2,2 %	8,7 %	3,9 %	1,4 %	5,4 %	4,7 %	5,0 %
in den letzten 30 Ta- gen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	2,4 %	3,4 %	1,5 %	4,8 %	1,6 %	1,1 %	3,0 %	2,2 %	2,4 %
in den letzten 30 Ta- gen täglich bzw. fast täglich konsumiert	2,4 %	2,8 %	2,1 %	5,1 %	1,6 %	0,7 %	6,6 %	2,2 %	1,4 %
gültige Angaben	5.962	2.909	3.053	1.711	2.937	1.313	542	3.312	1.898

Tabelle 4.29:
n23b Konsumprävalenz Pfeife

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	79,6 %	65,6 %	93,1 %	81,1 %	81,4 %	73,6 %	76,8 %	78,9 %	81,2 %
früher konsumiert, aber nicht in den letz- ten 12 Monaten	16,3 %	28,3 %	4,9 %	9,3 %	16,7 %	24,6 %	14,2 %	17,5 %	15,6 %
in den letzten 12 Mo- naten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	2,2 %	3,1 %	1,3 %	5,1 %	1,0 %	0,8 %	5,9 %	1,9 %	1,6 %
in den letzten 30 Ta- gen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	1,2 %	1,9 %	,6 %	2,9 %	0,6 %	0,5 %	2,0 %	1,2 %	1,1 %
in den letzten 30 Ta- gen täglich bzw. fast täglich konsumiert	,7 %	1,2 %	,2 %	1,6 %	0,2 %	0,5 %	1,1 %	,6 %	,5 %
gültige Angaben	5.962	2.910	3.052	1.712	2.938	1.313	543	3.311	1.897

Tabelle 4.30:
Konsumprävalenz E-Shisha

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	89,1 %	87,3 %	90,9 %	73,7 %	94,5 %	97,4 %	76,2 %	88,8 %	93,6 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	6,5 %	7,3 %	5,8 %	13,4 %	4,5 %	2,1 %	10,1 %	7,4 %	4,1 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	2,8 %	3,3 %	2,2 %	8,5 %	0,6 %	0,2 %	10,5 %	2,4 %	1,2 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	1,0 %	1,3 %	,7 %	2,7 %	0,2 %	0,3 %	2,0 %	,8 %	,9 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	,6 %	,8 %	,4 %	1,6 %	0,2 %	0,0 %	1,1 %	,6 %	,2 %
gültige Angaben	5.963	2.910	3.052	1.711	2.939	1.313	543	3.311	1.896

Tabelle 4.31:
n23d Konsumprävalenz E-Pfeife

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	94,5 %	92,5 %	96,4 %	85,2 %	97,9 %	99,2 %	85,1 %	95,0 %	96,6 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	2,8 %	3,9 %	1,8 %	6,5 %	1,6 %	0,7 %	5,7 %	2,9 %	1,8 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	1,6 %	2,0 %	1,3 %	4,9 %	0,4 %	0,1 %	5,9 %	1,4 %	,9 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	,6 %	1,0 %	,3 %	1,9 %	0,1 %	0,0 %	1,7 %	,5 %	,5 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	,4 %	,7 %	,2 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	1,7 %	,3 %	,2 %
gültige Angaben	5.964	2.911	3.053	1.713	2.937	1.312	543	3.311	1.898

Tabelle 4.32:

n23e Konsumprävalenz Heated-Tobacco-Produkte (z. B. Iqos, Glows)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	95,6 %	93,9 %	97,1 %	88,4 %	98,0 %	99,4 %	91,0 %	95,9 %	96,4 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	1,9 %	2,5 %	1,4 %	4,5 %	1,2 %	0,2 %	2,8 %	2,0 %	1,7 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	1,5 %	2,0 %	,9 %	4,0 %	0,4 %	0,4 %	3,7 %	1,2 %	1,2 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	,6 %	,9 %	,4 %	1,9 %	0,2 %	0,0 %	1,7 %	,4 %	,6 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	,4 %	,6 %	,2 %	1,1 %	0,2 %	0,0 %	,9 %	,5 %	,1 %
gültige Angaben	5.962	2.911	3.054	1.712	2.938	1.313	542	3.311	1.897

Tabelle 4.33:

n23f Konsumprävalenz Kautabak

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	94,0 %	91,3 %	96,6 %	88,1 %	95,5 %	98,5 %	88,6 %	94,7 %	94,2 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	3,8 %	5,9 %	1,9 %	5,6 %	3,8 %	1,4 %	4,8 %	3,5 %	4,4 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	1,1 %	1,2 %	1,0 %	3,2 %	0,4 %	0,1 %	3,9 %	,8 %	,8 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	,7 %	1,1 %	,4 %	2,2 %	0,2 %	0,1 %	2,2 %	,6 %	,4 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	,3 %	,4 %	,2 %	1,0 %	0,1 %	0,0 %	,6 %	,4 %	,2 %
gültige Angaben	5.963	2.910	3.054	1.711	2.939	1.312	543	3.311	1.897

Tabelle 4.34:
n23g Konsumprävalenz Schnupftabak

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	80,9 %	70,6 %	90,8 %	78,1 %	79,9 %	87,0 %	78,8 %	80,3 %	81,8 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	15,2 %	24,1 %	6,8 %	12,9 %	17,9 %	12,3 %	12,2 %	16,3 %	15,2 %
in den letzten 12 Mo- naten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	2,3 %	3,1 %	1,5 %	5,5 %	1,2 %	0,5 %	5,9 %	2,0 %	1,8 %
in den letzten 30 Ta- gen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	1,0 %	1,3 %	,6 %	2,2 %	0,6 %	0,2 %	1,5 %	1,0 %	,7 %
in den letzten 30 Ta- gen täglich bzw. fast täglich konsumiert	,6 %	,9 %	,2 %	1,3 %	0,3 %	0,2 %	1,7 %	,4 %	,5 %
gültige Angaben	5.963	2.910	3.053	1.712	2.939	1.313	543	3.311	1.896

Tabelle 4.35:
n23h Konsumprävalenz Snus (werden über den Mund konsumiert und enthalten Tabak)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	90,8 %	87,1 %	94,3 %	78,0 %	94,6 %	99,0 %	86,0 %	91,8 %	90,5 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	5,3 %	7,8 %	2,9 %	10,7 %	4,3 %	0,5 %	3,0 %	4,6 %	7,3 %
in den letzten 12 Mo- naten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	2,2 %	2,6 %	1,9 %	6,6 %	0,5 %	0,5 %	7,7 %	1,9 %	1,5 %
in den letzten 30 Ta- gen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	,9 %	1,2 %	,5 %	2,5 %	0,3 %	0,1 %	2,2 %	,8 %	,5 %
in den letzten 30 Ta- gen täglich bzw. fast täglich konsumiert	,8 %	1,2 %	,3 %	2,2 %	0,3 %	0,0 %	1,1 %	,9 %	,3 %
gültige Angaben	5.964	2.910	3.052	1.712	2.938	1.313	542	3.312	1.898

Tabelle 4.36:

n23i Konsumprävalenz Nikotinsäckchen (sind ähnlich wie Snus, enthalten aber keinen Tabak, sondern den Wirkstoff Nikotin)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	95,2 %	93,7 %	96,7 %	87,6 %	97,9 %	99,1 %	90,6 %	95,4 %	96,1 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	1,9 %	2,3 %	1,5 %	4,3 %	1,0 %	0,8 %	3,1 %	1,9 %	1,7 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	1,2 %	1,5 %	,9 %	3,4 %	0,4 %	0,0 %	2,8 %	,9 %	1,3 %
In den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	1,0 %	1,4 %	,6 %	2,7 %	0,4 %	0,1 %	2,4 %	1,1 %	,5 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	,7 %	1,1 %	,4 %	1,9 %	0,3 %	0,1 %	1,1 %	,8 %	,4 %
gültige Angaben	5.964	2.911	3.053	1.713	2.938	1.313	543	3.312	1.897

Tabelle 4.37:

prävalenz_nik_rauchfrei Übersichtvariable rauchfreie Produkte (berechnet aus n23c bis n23i)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten 30 Tagen: täglich oder fast täglich konsumiert	1,5 %	2,4 %	,6 %	3,9 %	0,7 %	0,2 %	2,2 %	1,5 %	1,0 %
in den letzten 30 Tagen: gelegentlich bis sehr selten konsumiert	1,9 %	2,7 %	1,1 %	4,7 %	1,0 %	0,3 %	4,2 %	1,9 %	1,1 %
kein Konsum in den letzten 30 Tagen, aber im letzten Jahr	3,0 %	3,8 %	2,3 %	7,2 %	1,7 %	0,5 %	7,2 %	2,7 %	2,6 %
kein Konsum im letzten Jahr, aber zuvor	17,0 %	25,6 %	8,7 %	15,9 %	19,3 %	13,0 %	11,6 %	17,4 %	18,5 %
nie im Leben konsumiert	76,7 %	65,6 %	87,2 %	68,2 %	77,4 %	85,9 %	74,7 %	76,5 %	76,8 %
gültige Angaben	5.964	2.910	3.054	1.713	2.939	1.313	542	3.312	1.896

Tabelle 4.38:

n23j Konsumprävalenz pflanzliche Raucherzeugnisse (z. B. Kräuterzigaretten; nicht gemeint ist Cannabis)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	92,6 %	91,0 %	94,1 %	87,1 %	93,2 %	98,5 %	90,6 %	93,1 %	91,9 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	5,0 %	5,9 %	4,2 %	6,4 %	6,0 %	1,1 %	4,0 %	4,7 %	6,2 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	1,3 %	1,6 %	1,0 %	3,5 %	0,6 %	0,2 %	3,1 %	1,1 %	1,3 %
In den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	,6 %	,8 %	,4 %	1,8 %	0,0 %	0,3 %	1,1 %	,6 %	,4 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	,5 %	,7 %	,2 %	1,3 %	0,1 %	0,0 %	1,1 %	,5 %	,2 %
gültige Angaben	5.962	2.910	3.052	1.711	2.938	1.312	544	3.312	1.897

Tabelle 4.39:

n24 Welches dieser Produkte haben Sie als Allererstes probiert? (nur an Personen gerichtet, die mindestens zwei nikotinhaltige Produkte konsumiert haben)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
traditionelle Rauchwaren: Zigaretten, Zigarre, Pfeife	48,8 %	60,9 %	37,2 %	46,9 %	53,2 %	41,2 %	35,9 %	51,2 %	50,2 %
elektronische Nikotinwaren: E-Zigaretten, E-Shisha, E-Pfeife	1,6 %	2,0 %	1,2 %	5,1 %	0,3 %	0,1 %	5,8 %	1,1 %	,8 %
Wasserpfeife bzw. Shisha	3,5 %	3,9 %	3,1 %	10,5 %	0,9 %	0,4 %	4,6 %	3,2 %	3,7 %
Heated-Tobacco-Produkte	,5 %	,6 %	,4 %	1,2 %	0,1 %	0,2 %	,9 %	,4 %	,4 %
rauchfreie Tabakprodukte Kautabak, Schnupftabak, Snus, Nikotinsäckchen	1,3 %	2,0 %	,7 %	2,4 %	1,2 %	0,3 %	2,6 %	1,0 %	1,6 %
pflanzliche Raucherzeugnisse, z. B. Kräuterzigaretten	,4 %	,6 %	,2 %	0,8 %	0,4 %	0,1 %	,9 %	,2 %	,6 %
nicht zutreffend, weil maximal ein nikotinhaltiges Produkt konsumiert wurde	43,9 %	30,0 %	57,2 %	33,1 %	44,0 %	57,7 %	49,3 %	42,8 %	42,6 %
gültige Angaben	5.926	2.893	3.033	1.687	2.932	1.308	538	3.293	1.890

Tabelle 4.40:

WELLE 2: zig_phase1 Zigarettenkonsum in Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich geraucht	13,9 %	14,1 %	13,7 %	12,5 %	16,2 %	10,4 %	22,8 %	15,2 %	9,5 %
fast täglich geraucht: 5-6 Tage pro Woche	1,5 %	1,6 %	1,4 %	1,4 %	2,0 %	0,4 %	,5 %	1,3 %	2,0 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) geraucht	2,2 %	2,5 %	2,0 %	3,3 %	2,1 %	1,2 %	1,0 %	2,3 %	2,5 %
1 Tag pro Woche ge- raucht	1,2 %	2,0 %	,5 %	2,6 %	1,0 %	0,1 %	0,0 %	1,4 %	1,1 %
seltener als 1 Tag pro Woche geraucht	2,4 %	2,6 %	2,1 %	3,5 %	2,4 %	1,1 %	2,0 %	2,2 %	2,9 %
gar nicht geraucht	,8 %	1,0 %	,7 %	1,1 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	,7 %	1,2 %
seit Anfang 2020 keine Zigaretten geraucht	78,0 %	76,2 %	79,6 %	75,6 %	75,4 %	86,4 %	73,6 %	77,0 %	80,7 %
gültige Angaben	3.253	1.587	1.668	847	1.663	743	197	1.899	1.070

Tabelle 4.41:

WELLE 2: zig_phase2 Zigarettenkonsum in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März-Juni 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich geraucht	14,0 %	14,2 %	13,9 %	12,6 %	16,6 %	10,1 %	22,3 %	15,0 %	10,4 %
fast täglich geraucht: 5-6 Tage pro Woche	1,6 %	1,8 %	1,4 %	1,5 %	2,0 %	0,8 %	,5 %	1,7 %	1,5 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) geraucht	2,1 %	2,5 %	1,6 %	2,6 %	2,2 %	1,1 %	1,0 %	2,2 %	2,1 %
1 Tag pro Woche geraucht	1,2 %	1,8 %	,7 %	2,7 %	0,8 %	0,5 %	,5 %	1,2 %	1,4 %
seltener als 1 Tag pro Woche geraucht	1,5 %	1,6 %	1,4 %	2,8 %	1,3 %	0,4 %	,5 %	1,6 %	1,7 %
gar nicht geraucht	1,8 %	1,9 %	1,6 %	2,4 %	1,8 %	0,9 %	1,5 %	1,5 %	2,3 %
seit Anfang 2020 keine Zigaretten geraucht	77,9 %	76,2 %	79,4 %	75,4 %	75,3 %	86,2 %	73,6 %	76,8 %	80,6 %
gültige Angaben	3.257	1.588	1.672	849	1.665	745	197	1.903	1.072

Tabelle 4.42:

WELLE 2: zig_phase3 Zigarettenkonsum in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli – Anfang September 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich geraucht	13,6 %	13,9 %	13,2 %	11,7 %	16,3 %	9,7 %	22,2 %	14,6 %	9,7 %
fast täglich geraucht: 5-6 Tage pro Woche	2,0 %	2,1 %	1,7 %	2,1 %	2,3 %	0,9 %	1,0 %	2,0 %	2,1 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) geraucht	2,1 %	2,6 %	1,7 %	3,5 %	1,9 %	0,9 %	1,0 %	2,1 %	2,3 %
1 Tag pro Woche geraucht	,9 %	1,3 %	,7 %	1,7 %	0,7 %	0,8 %	,5 %	1,1 %	,7 %
seltener als 1 Tag pro Woche geraucht	1,9 %	2,1 %	1,6 %	3,5 %	1,6 %	0,5 %	,5 %	1,8 %	2,3 %
gar nicht geraucht	1,7 %	1,7 %	1,7 %	2,0 %	1,9 %	0,9 %	1,5 %	1,5 %	2,2 %
seit Anfang 2020 keine Zigaretten geraucht	77,8 %	76,2 %	79,4 %	75,5 %	75,4 %	86,2 %	73,2 %	76,8 %	80,5 %
gültige Angaben	3.258	1.588	1.671	848	1.664	745	198	1.903	1.073

Tabelle 4.43:

WELLE 2: zig_phase4 Zigarettenkonsum in Phase 4: Aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich geraucht	13,7 %	14,0 %	13,4 %	11,8 %	16,6 %	9,5 %	21,8 %	14,8 %	9,9 %
fast täglich geraucht: 5-6 Tage pro Woche	1,5 %	1,8 %	1,2 %	1,5 %	1,9 %	0,8 %	1,0 %	1,4 %	1,6 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) geraucht	2,0 %	2,1 %	2,0 %	2,7 %	1,9 %	1,6 %	1,0 %	2,4 %	1,7 %
1 Tag pro Woche ge- raucht	1,0 %	1,5 %	,5 %	2,1 %	0,7 %	0,4 %	,5 %	1,1 %	,9 %
seltener als 1 Tag pro Woche geraucht	2,0 %	2,6 %	1,4 %	3,8 %	1,8 %	0,4 %	1,0 %	1,7 %	2,9 %
gar nicht geraucht	1,9 %	1,8 %	2,1 %	2,7 %	1,9 %	1,1 %	1,0 %	1,9 %	2,3 %
seit Anfang 2020 keine Zigaretten geraucht	77,9 %	76,1 %	79,3 %	75,4 %	75,3 %	86,2 %	73,6 %	76,8 %	80,7 %
gültige Angaben	3.257	1.589	1.673	849	1.666	745	197	1.904	1.071

Tabelle 4.44:

WELLE 2: zig_anzahl_phase1_rec Anzahl der Zigaretten an einem üblichen Tag, an dem ich Zigaretten geraucht habe (Phase 4, in den letzten 4 Wochen, rekodiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
seit Anfang 2020 keine Zigaretten konsumiert	77,9 %	76,3 %	79,5 %	75,3 %	75,5 %	86,6 %	71,8 %	77,1 %	80,8 %
keine Zigaretten in dem Zeitraum konsumiert	,8 %	1,0 %	,7 %	1,1 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	,7 %	1,2 %
1 Zigarette oder weniger pro Konsumtag	2,6 %	3,2 %	2,0 %	4,9 %	2,2 %	0,7 %	3,5 %	2,3 %	3,0 %
2 bis 5 Zigaretten pro Konsumtag	4,3 %	4,3 %	4,4 %	5,4 %	4,9 %	1,9 %	1,5 %	4,6 %	4,6 %
6 bis 10 Zigaretten pro Konsumtag	4,4 %	3,7 %	5,0 %	5,5 %	4,3 %	3,2 %	5,0 %	4,4 %	4,1 %
11 bis 20 Zigaretten pro Konsumtag	8,0 %	9,1 %	6,9 %	7,2 %	9,7 %	5,0 %	15,3 %	8,8 %	5,1 %
mehr als 20 Zigaretten pro Konsumtag	2,0 %	2,3 %	1,6 %	0,6 %	2,6 %	2,2 %	3,0 %	2,2 %	1,2 %
gültige Angaben	3.254	1.585	1.670	850	1.662	741	202	1.897	1.069

Tabelle 4.45:

WELLE 2: zig_anzahl_phase4_rec Anzahl der Zigaretten an einem üblichem Tag, an dem ich Zigaretten geraucht habe (Phase 1, vor Corona, rekodiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
seit Anfang 2020 keine Zigaretten konsumiert	77,8 %	76,2 %	79,4 %	75,5 %	75,2 %	86,4 %	71,8 %	76,9 %	80,8 %
keine Zigaretten in dem Zeitraum konsumiert	1,9 %	1,8 %	2,1 %	2,7 %	1,9 %	1,1 %	1,0 %	1,9 %	2,3 %
1 Zigarette oder weniger pro Konsumtag	2,3 %	3,1 %	1,7 %	4,7 %	1,9 %	0,7 %	2,5 %	2,2 %	2,6 %
2 bis 5 Zigaretten pro Konsumtag	3,8 %	4,3 %	3,4 %	5,3 %	4,0 %	1,7 %	2,0 %	3,8 %	4,3 %
6 bis 10 Zigaretten pro Konsumtag	4,0 %	3,6 %	4,4 %	4,2 %	4,2 %	3,4 %	4,5 %	4,2 %	3,4 %
11 bis 20 Zigaretten pro Konsumtag	7,6 %	8,1 %	7,1 %	6,0 %	9,6 %	5,1 %	14,4 %	8,5 %	4,5 %
mehr als 20 Zigaretten pro Konsumtag	2,5 %	2,9 %	2,0 %	1,5 %	3,2 %	1,6 %	4,0 %	2,4 %	2,1 %
gültige Angaben	3.258	1.587	1.672	848	1.667	743	202	1.900	1.069

Tabelle 4.46:

WELLE 2: ezig_phase1 E-Zigaretten-Konsum in Phase 1: Vor Corona (Jänner – Februar 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich E-Zigaretten konsumiert	,6 %	,7 %	,4 %	0,4 %	0,8 %	0,3 %	0,0 %	,7 %	,6 %
fast täglich E-Zigaretten konsumiert: 5-6 Tage pro Woche	,3 %	,6 %	,1 %	0,8 %	0,1 %	0,3 %	,5 %	,4 %	,1 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) E-Zigaretten konsumiert	,4 %	,7 %	,1 %	1,1 %	0,3 %	0,0 %	,5 %	,5 %	,3 %
1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert	,4 %	,5 %	,3 %	0,9 %	0,3 %	0,0 %	1,0 %	,2 %	,6 %
seltener als 1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert	,5 %	,6 %	,4 %	0,9 %	0,5 %	0,0 %	,5 %	,6 %	,4 %
gar nicht E-Zigaretten konsumiert	1,1 %	1,6 %	,7 %	2,7 %	0,6 %	0,4 %	,5 %	1,4 %	,8 %
seit Anfang 2020 keine E-Zigaretten konsumiert	96,7 %	95,3 %	98,0 %	93,2 %	97,4 %	99,1 %	97,0 %	96,3 %	97,3 %
gültige Angaben	3.255	1.586	1.669	853	1.664	739	199	1.896	1.073

Tabelle 4.47:

WELLE 2: ezig_phase2 E-Zigaretten-Konsum in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März-Juni 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich E-Zigaretten konsumiert	,6 %	,7 %	,4 %	0,6 %	0,7 %	0,3 %	0,0 %	,7 %	,5 %
fast täglich E-Zigaretten konsumiert: 5-6 Tage pro Woche	,3 %	,5 %	,1 %	0,7 %	0,1 %	0,3 %	,5 %	,3 %	,2 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) E-Zigaretten konsumiert	,6 %	,9 %	,4 %	1,6 %	0,3 %	0,3 %	,5 %	,9 %	,3 %
1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert	,3 %	,4 %	,2 %	0,8 %	0,2 %	0,0 %	1,0 %	,2 %	,5 %
seltener als 1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert	,5 %	,8 %	,3 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	,5 %	,6 %	,4 %
gar nicht E-Zigaretten konsumiert	,9 %	1,3 %	,5 %	1,9 %	0,7 %	0,1 %	,5 %	1,1 %	,7 %
seit Anfang 2020 keine E-Zigaretten konsumiert	96,7 %	95,4 %	98,1 %	93,3 %	97,5 %	99,1 %	97,0 %	96,3 %	97,5 %
gültige Angaben	3.253	1.585	1.667	852	1.661	739	199	1.896	1.071

Tabelle 4.48:

WELLE 2: E-Zigaretten-Konsum in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli – Anfang September 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich E-Zigaretten konsumiert	,6 %	,8 %	,4 %	0,6 %	0,7 %	0,3 %	0,0 %	,6 %	,6 %
fast täglich E-Zigaretten konsumiert: 5-6 Tage pro Woche	,4 %	,6 %	,2 %	0,8 %	0,2 %	0,3 %	,5 %	,5 %	,1 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) E-Zigaretten konsumiert	,4 %	,8 %	,1 %	1,2 %	0,2 %	0,0 %	,5 %	,4 %	,5 %
1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert	,5 %	,6 %	,4 %	1,6 %	0,1 %	0,0 %	1,5 %	,5 %	,2 %
seltener als 1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert	,6 %	,9 %	,3 %	1,3 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	,6 %	,7 %
gar nicht E-Zigaretten konsumiert	,9 %	1,1 %	,7 %	1,3 %	0,8 %	0,4 %	1,0 %	1,1 %	,6 %
seit Anfang 2020 keine E-Zigaretten konsumiert	96,7 %	95,4 %	98,0 %	93,2 %	97,4 %	99,1 %	96,5 %	96,3 %	97,4 %
gültige Angaben	3.253	1.585	1.669	853	1.663	739	200	1.895	1.072

Tabelle 4.49:

WELLE 2: ezig_phase4 E-Zigaretten-Konsum in Phase 4: Aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich E-Zigaretten konsumiert	,8 %	1,1 %	,5 %	0,7 %	1,0 %	0,4 %	0,0 %	,8 %	,8 %
fast täglich E-Zigaretten konsumiert: 5-6 Tage pro Woche	,2 %	,3 %	,1 %	0,6 %	0,1 %	0,1 %	,5 %	,2 %	,1 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) E-Zigaretten konsumiert	,6 %	1,1 %	,2 %	1,8 %	0,3 %	0,0 %	,5 %	,9 %	,3 %
1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert	,3 %	,4 %	,2 %	1,1 %	0,1 %	0,0 %	1,0 %	,2 %	,4 %
seltener als 1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert	,5 %	,7 %	,2 %	1,2 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	,7 %	,3 %
gar nicht E-Zigaretten konsumiert	,6 %	,7 %	,5 %	0,8 %	0,7 %	0,3 %	,5 %	,6 %	,7 %
seit Anfang 2020 keine E-Zigaretten konsumiert	97,0 %	95,7 %	98,2 %	93,9 %	97,5 %	99,2 %	97,5 %	96,5 %	97,5 %
gültige Angaben	3.246	1.580	1.665	847	1.661	738	198	1.891	1.071

Tabelle 4.50:

WELLE 2: ezig_reaktion1 Reaktion auf geschlossene Vape-Shops (Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich habe mir die notwendigen Utensilien (z. B. Liquids) woanders gekauft (z. B. im Internet oder in der Trafik).	,7 %	1,0 %	,4 %	1,8 %	0,4 %	0,1 %	1,0 %	,7 %	,7 %
Ich habe Vorräte aufgebraucht.	,8 %	1,1 %	,5 %	1,4 %	,8 %	,4 %	1,5 %	1,0 %	,6 %
Ich habe meinen Konsum reduziert.	,5 %	,8 %	,2 %	1,2 %	,4 %	0,0 %	,5 %	,6 %	,4 %
Ich habe ersatzlos aufgehört.	,3 %	,5 %	,1 %	,3 %	,3 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,2 %
Ich bin auf herkömmliche Zigaretten umgestiegen.	,3 %	,4 %	,3 %	,5 %	,5 %	0,0 %	,5 %	,4 %	,3 %
Ich konsumiere zwar E-Zigaretten, kaufe die Utensilien aber nie selbst ein.	,2 %	,3 %	,1 %	,3 %	,2 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	0,0 %
Sonstiges	,2 %	,3 %	,1 %	0,0 %	,2 %	,1 %	0,0 %	,3 %	0,0 %
keine E-Zigaretten im Zeitraum von Mitte März. bis Ende April konsumiert	,9 %	1,3 %	,5 %	1,8 %	,7 %	,1 %	,5 %	1,1 %	,7 %
seit Anfang 2020 keine E-Zigaretten konsumiert	97,1 %	95,8 %	98,2 %	94,1 %	97,6 %	99,2 %	97,0 %	96,7 %	97,6 %
gültige Angaben	3.242	1.578	1.665	844	1.659	737	199	1.887	1.070

5 Alkoholkonsum

Tabelle 5.1:

a1 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	85,6 %	87,3 %	84,0 %	76,8 %	90,3 %	86,4 %	70,2 %	86,2 %	90,6 %
Nein, ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol konsumiert, aber früher.	9,2 %	8,7 %	9,7 %	13,3 %	7,4 %	7,9 %	16,8 %	9,3 %	6,4 %
Ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken, ausgenommen ein paar Schlucke zum Probieren.	5,2 %	4,1 %	6,4 %	9,9 %	2,3 %	5,7 %	13,1 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.962	2.910	3.053	1.712	2.938	1.313	543	3.311	1.897

Tabelle 5.2:

a1_u Haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol konsumiert (undersamplingadjustiert*)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	86,1 %	88,1 %	84,1 %	76,2 %	91,4 %	86,5 %	69,9 %	86,2 %	90,5 %
Nein, ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol konsumiert, aber früher.	8,8 %	8,1 %	9,6 %	13,2 %	6,5 %	7,7 %	16,9 %	9,3 %	6,4 %
Ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken, ausgenommen ein paar Schlucke zum Probieren.	5,1 %	3,8 %	6,3 %	10,6 %	2,1 %	5,8 %	13,2 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	6.192	3.108	3.086	1.712	2.938	1.313	538	3.308	1.894

*Undersamplingadjustiert bedeutet, dass zu dem empirischen Sample fiktive Personen mit der höchsten Konsumstufe ergänzt wurden, da diese in Befragungen normalerweise unterrepräsentiert sind.

Tabelle 5.3:

bsqf1a Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Bier getrunken (inklusive Bier-Mixgetränken)?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	4,1 %	5,9 %	2,3 %	1,9 %	4,1 %	7,0 %	3,1 %	4,5 %	3,6 %
5-6 Tage pro Woche	5,1 %	8,1 %	2,4 %	3,9 %	5,3 %	6,6 %	3,9 %	5,5 %	5,1 %
3-4 Tage pro Woche	9,0 %	12,7 %	5,4 %	7,7 %	10,3 %	7,7 %	6,1 %	9,1 %	9,8 %
1-2 Tage pro Woche	16,2 %	20,6 %	12,1 %	15,3 %	16,6 %	16,7 %	11,9 %	17,0 %	17,3 %
2-3 Tage pro Monat	16,4 %	17,7 %	15,1 %	14,0 %	17,6 %	16,7 %	13,5 %	16,7 %	16,8 %
1 Tag pro Monat	11,4 %	8,8 %	13,9 %	12,0 %	11,5 %	10,4 %	8,9 %	11,0 %	12,1 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen kein Bier getrunken, aber früher.	14,8 %	10,2 %	19,2 %	15,1 %	14,7 %	14,4 %	15,2 %	14,0 %	16,4 %
Ich habe noch nie in meinem Leben Bier getrunken, ausgenommen ein paar Schlucke zum Probieren.	8,5 %	3,3 %	13,6 %	6,7 %	10,3 %	7,0 %	7,4 %	8,4 %	9,5 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten kein Bier getrunken, aber früher.	9,2 %	8,7 %	9,7 %	13,3 %	7,4 %	7,9 %	16,9 %	9,3 %	6,5 %
noch nie im Leben Bier getrunken	5,3 %	4,1 %	6,4 %	10,0 %	2,4 %	5,7 %	13,1 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.943	2.902	3.043	1.704	2.931	1.309	540	3.304	1.891

Tabelle 5.4:

bsqf2a Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Wein oder Sekt getrunken?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	2,4 %	2,3 %	2,6 %	1,1 %	2,1 %	4,9 %	1,9 %	2,3 %	2,7 %
5-6 Tage pro Woche	2,7 %	2,7 %	2,6 %	,7 %	3,2 %	4,3 %	1,3 %	2,7 %	3,1 %
3-4 Tage pro Woche	6,5 %	5,6 %	7,4 %	4,4 %	6,4 %	9,1 %	3,6 %	6,0 %	8,9 %
1-2 Tage pro Woche	14,7 %	14,2 %	15,1 %	11,4 %	15,6 %	15,8 %	10,0 %	13,2 %	19,2 %
2-3 Tage pro Monat	17,0 %	16,9 %	17,2 %	14,9 %	18,0 %	17,3 %	10,4 %	16,5 %	20,1 %
1 Tag pro Monat	16,3 %	16,1 %	16,4 %	16,9 %	17,7 %	12,3 %	13,8 %	17,3 %	15,3 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen keinen Wein oder Sekt getrunken, aber früher.	24,2 %	27,4 %	21,1 %	22,8 %	26,0 %	21,2 %	24,9 %	26,5 %	20,4 %
Ich habe noch nie in meinem Leben Wein oder Sekt getrunken, ausgenommen ein paar Schlucke zum Probieren.	1,6 %	1,8 %	1,4 %	2,7 %	1,2 %	1,3 %	3,6 %	1,6 %	,8 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Wein oder Sekt getrunken (aber früher).	9,3 %	8,8 %	9,8 %	13,9 %	7,4 %	7,9 %	17,2 %	9,3 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Wein oder Sekt getrunken	5,3 %	4,1 %	6,4 %	11,1 %	2,4 %	6,0 %	13,4 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.910	2.877	3.035	1.711	2.937	1.313	530	3.290	1.886

Tabelle 5.5:

bsqf3a Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Spirituosen (z. B. Schnaps, Gin, Wodka, Whisky) getrunken (inklusive Spirituosen-Mixgetränken wie z. B. Cocktails oder Alkopops)?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	,7 %	1,3 %	,2 %	,8 %	,4 %	1,4 %	,6 %	,8 %	,6 %
5-6 Tage pro Woche	,9 %	1,3 %	,6 %	,9 %	,9 %	1,3 %	1,1 %	,9 %	,8 %
3-4 Tage pro Woche	2,1 %	2,6 %	1,7 %	2,1 %	1,9 %	2,6 %	3,0 %	2,0 %	2,4 %
1-2 Tage pro Woche	6,0 %	6,2 %	5,8 %	4,9 %	5,7 %	7,3 %	5,1 %	6,1 %	6,4 %
2-3 Tage pro Monat	10,7 %	12,4 %	9,1 %	9,4 %	11,0 %	11,6 %	6,2 %	10,3 %	12,7 %
1 Tag pro Monat	17,5 %	18,6 %	16,5 %	17,9 %	18,4 %	14,7 %	15,3 %	16,3 %	20,6 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen keine Spirituosen getrunken, aber früher.	42,2 %	41,2 %	43,1 %	35,9 %	46,6 %	38,8 %	30,1 %	44,2 %	43,0 %
Ich habe noch nie in meinem Leben Spirituosen getrunken, ausgenommen ein paar Schlucke zum Probieren.	5,3 %	3,5 %	6,9 %	2,9 %	5,3 %	8,2 %	8,1 %	5,6 %	4,1 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keine Spirituosen getrunken, aber früher.	9,3 %	8,8 %	9,8 %	14,0 %	7,4 %	8,0 %	17,1 %	9,4 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Spirituosen getrunken.	5,3 %	4,1 %	6,4 %	11,2 %	2,4 %	6,0 %	13,4 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.887	2.874	3.015	1.714	2.937	1.313	531	3.272	1.889

Tabelle 5.6:

bsqf4a Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen alkoholhaltigen Most (Apfel- und Birnenwein), Sturm (gärenden Traubensaft) und andere Obstweine (z. B. Ribiselwein, Pflaumenwein) getrunken?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	,3 %	,5 %	,1 %	,8 %	,1 %	,3 %	1,0 %	,2 %	,3 %
5-6 Tage pro Woche	,3 %	,5 %	,2 %	,5 %	,3 %	,1 %	1,0 %	,2 %	,4 %
3-4 Tage pro Woche	,6 %	,6 %	,5 %	,9 %	,3 %	,8 %	,6 %	,6 %	,5 %
1-2 Tage pro Woche	1,3 %	1,6 %	1,1 %	1,9 %	1,1 %	1,2 %	1,0 %	1,5 %	1,1 %
2-3 Tage pro Monat	2,2 %	2,9 %	1,6 %	1,9 %	2,3 %	2,4 %	2,1 %	2,3 %	2,3 %
1 Tag pro Monat	5,0 %	5,0 %	5,1 %	6,0 %	4,5 %	5,0 %	4,6 %	4,3 %	6,5 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen keinen Most, Sturm oder anderen Obstwein getrunken.	66,8 %	69,2 %	64,4 %	52,7 %	73,8 %	66,7 %	45,8 %	67,6 %	73,1 %
Ich habe noch nie in meinem Leben Most, Sturm oder andere Obstweine getrunken außer ein paar Schlucke zum Probieren.	8,7 %	6,6 %	10,6 %	9,8 %	7,8 %	9,6 %	13,0 %	9,2 %	6,3 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Most, Sturm oder keine anderen Obstweine getrunken, aber früher.	9,3 %	8,8 %	9,8 %	14,2 %	7,5 %	8,0 %	17,4 %	9,4 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Most, Sturm oder andere Obstweine getrunken.	5,3 %	4,2 %	6,5 %	11,3 %	2,4 %	6,0 %	13,6 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.860	2.852	3.007	1.644	2.913	1.303	522	3.264	1.876

Tabelle 5.7:

Alkoholkonsumgruppe (Rohwerte, berechnet auf Basis von a1 bis bsqf4a)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
primär abstinent (nie Alkohol getrunken, mit Ausnahme von ein paar Schlucken)	5,4 %	4,2 %	6,5 %	11,4 %	2,4 %	6,0 %	14,0 %	4,6 %	3,0 %
sekundär abstinent (kein Konsum in den letzten 12 Monaten)	9,4 %	8,9 %	9,9 %	14,2 %	7,5 %	8,0 %	17,9 %	9,4 %	6,5 %
kein Konsum in den letzten 30 Tagen	7,9 %	5,9 %	9,8 %	9,4 %	7,3 %	7,9 %	9,9 %	8,2 %	6,5 %
geringer Konsum (weniger als 16 bzw. 24 Gramm pro Tag)	62,6 %	63,9 %	61,3 %	53,1 %	67,2 %	62,0 %	47,1 %	62,9 %	67,8 %
mittlerer Konsum (zwischen 16 und 40 bzw. 24 und 60 Gramm)	11,5 %	13,8 %	9,4 %	9,9 %	11,7 %	12,4 %	7,1 %	11,9 %	12,6 %
problematischer Konsum (mehr als 40 bzw. 60 Gramm)	3,3 %	3,4 %	3,2 %	2,0 %	3,9 %	3,7 %	3,9 %	3,1 %	3,5 %
gültige Angaben	5.840	2.836	3.004	1.715	2.977	1.350	507	3.260	1.870

Tabelle 5.8:

Alkoholkonsumgruppe_uu (undersampling- und underreportingadjustiert*, berechnet auf Basis von a1 bis bsqf4a)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
primär abstinent (nie Alkohol getrunken, mit Ausnahme von ein paar Schlucken)	5,1 %	3,9 %	6,4 %	11,0 %	2,1 %	5,9 %	14,0 %	4,6 %	3,0 %
sekundär abstinent (kein Konsum in den letzten 12 Monaten)	9,0 %	8,3 %	9,7 %	13,8 %	6,6 %	7,8 %	17,9 %	9,4 %	6,5 %
kein Konsum in den letzten 30 Tagen	7,6 %	5,5 %	9,7 %	9,1 %	6,5 %	7,7 %	9,8 %	8,2 %	6,5 %
geringer Konsum (weniger als 16 bzw. 24 Gramm pro Tag)	49,0 %	47,8 %	50,1 %	42,8 %	48,8 %	47,9 %	40,6 %	50,9 %	54,8 %
mittlerer Konsum (zwischen 16 und 40 bzw. 24 und 60 Gramm)	14,7 %	16,1 %	13,2 %	12,4 %	13,9 %	16,0 %	9,3 %	15,3 %	17,5 %
problematischer Kon- sum (mehr als 40 bzw. 60 Gramm)	9,6 %	10,7 %	8,4 %	7,0 %	9,0 %	11,7 %	6,5 %	10,4 %	10,6 %
Alkoholabhängigkeit	5,1 %	7,6 %	2,5 %	3,8 %	13,1 %	3,1 %	2,0 %	1,1 %	1,0 %
gültige Angaben	6.080	3.036	3.044	1.766	3.373	1.383	508	3.261	1.871

*Undersampling- und underreportingadjustiert bedeutet, dass (1) zu dem empirischen Sample fiktive Personen mit der höchsten Konsumstufe ergänzt wurden, da diese in Befragungen normalerweise unterrepräsentiert sind, und dass (2) die empirische Angaben zum durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum linear so hochgewichtet wurden, dass sie dem Durchschnittskonsum laut Verkaufs- bzw. Produktionsstatistik entsprechen.

Tabelle 5.9:

a2 Zusammenfassend: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken, unabhängig von Getränkeart und Menge?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	6,6 %	8,7 %	4,6 %	3,5 %	6,4 %	11,1 %	5,2 %	6,7 %	7,0 %
5-6 Tage pro Woche	8,4 %	11,0 %	6,0 %	5,7 %	8,9 %	10,9 %	4,1 %	8,9 %	9,4 %
3-4 Tage pro Woche	13,5 %	14,8 %	12,2 %	10,1 %	15,4 %	13,5 %	8,7 %	12,6 %	16,6 %
1-2 Tage pro Woche	19,8 %	21,6 %	18,1 %	17,6 %	21,8 %	18,1 %	12,1 %	19,7 %	23,6 %
2-3 Tage pro Monat	19,2 %	17,9 %	20,5 %	19,7 %	20,0 %	16,8 %	18,6 %	19,5 %	18,9 %
1 Tag pro Monat	10,0 %	7,1 %	12,8 %	10,7 %	10,2 %	8,7 %	11,9 %	10,6 %	8,6 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken.	7,8 %	5,9 %	9,7 %	9,1 %	7,5 %	7,1 %	9,3 %	8,2 %	6,5 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,2 %	8,7 %	9,8 %	13,5 %	7,4 %	8,0 %	16,9 %	9,3 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,3 %	4,1 %	6,4 %	10,1 %	2,4 %	5,7 %	13,2 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.918	2.885	3.034	1.687	2.925	1.307	538	3.287	1.891

Tabelle 5.10:

a2_u Zusammenfassend: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken, unabhängig von Getränkeart und Menge (undersamplingadjustiert*)?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	10,2 %	14,6 %	5,7 %	6,1 %	17,4 %	12,8 %	4,5 %	6,6 %	6,9 %
5-6 Tage pro Woche	8,1 %	10,3 %	5,9 %	5,2 %	7,8 %	10,5 %	3,9 %	8,9 %	9,4 %
3-4 Tage pro Woche	12,9 %	13,9 %	12,0 %	9,6 %	13,6 %	13,1 %	8,8 %	12,6 %	16,6 %
1-2 Tage pro Woche	19,1 %	20,2 %	17,9 %	16,6 %	19,1 %	17,3 %	12,2 %	19,7 %	23,6 %
2-3 Tage pro Monat	18,5 %	16,8 %	20,2 %	19,0 %	17,8 %	16,5 %	18,8 %	19,5 %	18,9 %
1 Tag pro Monat	9,7 %	6,7 %	12,7 %	10,3 %	9,1 %	8,5 %	12,0 %	10,6 %	8,6 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken.	7,5 %	5,5 %	9,6 %	8,9 %	6,5 %	7,6 %	9,4 %	8,2 %	6,5 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	8,9 %	8,2 %	9,7 %	13,5 %	6,6 %	7,8 %	17,1 %	9,3 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,1 %	3,9 %	6,3 %	10,7 %	2,1 %	5,8 %	13,3 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	6.148	3.083	3.067	1.814	3.389	1.390	533	3.285	1.889

*Undersamplingadjustiert bedeutet, dass zu dem empirischen Sample fiktive Personen mit der höchsten Konsumstufe ergänzt wurden, da diese in Befragungen normalerweise unterrepräsentiert sind.

Tabelle 5.11:

a3a Haben Sie vor Ausbruch der Corona-Krise (Mitte März) täglich oder fast täglich Alkohol (mindestens 5 Tage pro Woche) getrunken?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	14,2 %	18,8 %	10,0 %	8,3 %	13,8 %	22,9 %	11,7 %	14,5 %	15,0 %
nein	71,2 %	68,4 %	73,9 %	68,2 %	76,4 %	63,5 %	57,7 %	71,6 %	75,5 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,3 %	8,8 %	9,8 %	13,4 %	7,4 %	8,0 %	17,2 %	9,3 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,3 %	4,1 %	6,4 %	10,1 %	2,4 %	5,7 %	13,4 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.913	2.880	3.034	1.689	2.916	1.308	529	3.292	1.888

Tabelle 5.12:

a3b Wie (falls überhaupt) hat sich Ihr Alkoholkonsum seit Ausbruch der Corona-Krise (Mitte März) verändert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
An meinem Alkoholkonsum hat sich seit Ausbruch der Corona-Krise nichts geändert.	60,5 %	58,9 %	62,1 %	42,8 %	64,5 %	74,7 %	47,3 %	62,2 %	62,4 %
Ich trinke seit Ausbruch der Corona-Krise weniger Alkohol als davor.	11,5 %	14,4 %	8,7 %	16,3 %	10,7 %	7,1 %	12,4 %	10,9 %	12,3 %
Ich trinke seit Ausbruch der Corona-Krise keinen Alkohol mehr.	2,1 %	2,3 %	1,9 %	4,2 %	1,2 %	1,2 %	4,1 %	2,0 %	1,5 %
Ich trinke seit Ausbruch der Corona-Krise mehr Alkohol als davor.	11,0 %	11,2 %	10,8 %	12,7 %	13,5 %	3,2 %	5,1 %	10,6 %	14,1 %
Ich habe seit Ausbruch der Corona-Krise wieder Alkohol zu trinken begonnen.	,3 %	,3 %	,3 %	0,5 %	0,3 %	0,2 %	,8 %	,3 %	,2 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,3 %	8,7 %	9,8 %	13,5 %	7,4 %	8,0 %	17,1 %	9,4 %	6,4 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,3 %	4,1 %	6,4 %	10,1 %	2,4 %	5,8 %	13,3 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.907	2.886	3.019	1.686	2.917	1.302	533	3.278	1.893

Tabelle 5.13:

a4_1 Ich trinke jetzt keinen Alkohol oder weniger, weil ich ...

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
... nur eingeschränkten Zugang zu Alkohol habe.	,7 %	,6 %	,7 %	1,6 %	,3 %	,4 %	1,7 %	,6 %	,5 %
... derzeit weniger Geld zur Verfügung habe.	,7 %	,9 %	,6 %	1,8 %	,3 %	,1 %	,9 %	,8 %	,7 %
... Angst habe, durch meinen Alkoholkonsum eine höhere Anfälligkeit für eine Corona-Infektion zu haben.	,6 %	1,0 %	,3 %	1,1 %	,4 %	,4 %	1,3 %	,5 %	,8 %
... seltener von Personen außer Haus „in Versuchung gebracht“ werde.	3,6 %	4,6 %	2,5 %	7,1 %	2,5 %	1,3 %	5,1 %	3,3 %	3,5 %
... in erster Linie in Gesellschaft beim Weggehen trinke.	8,8 %	10,6 %	7,1 %	12,8 %	8,4 %	4,1 %	7,1 %	8,9 %	9,2 %
... prinzipiell zu Hause nicht oder weniger trinke.	5,5 %	7,0 %	4,0 %	8,7 %	5,0 %	2,0 %	5,5 %	5,5 %	5,7 %
... keinen günstigen Alkohol aus dem Ausland kaufen kann.	,3 %	,5 %	,2 %	1,0 %	,1 %	0,0 %	1,5 %	,2 %	,2 %
Ich trinke aus einem anderen Grund jetzt keinen Alkohol oder weniger.	1,2 %	1,3 %	1,2 %	1,4 %	1,1 %	1,2 %	1,5 %	1,1 %	1,4 %
keine Konsumreduktion	11,3 %	11,5 %	11,2 %	12,8 %	13,7 %	3,3 %	5,8 %	10,9 %	14,3 %
keine Veränderung des Konsumverhaltens seit Ausbruch der Corona-Krise	60,5 %	58,9 %	62,1 %	41,8 %	64,6 %	74,5 %	47,3 %	62,2 %	62,5 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,3 %	8,7 %	9,8 %	13,8 %	7,4 %	8,0 %	17,1 %	9,4 %	6,4 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,3 %	4,1 %	6,4 %	11,0 %	2,4 %	6,0 %	13,3 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.906	2.886	3.020	1.686	2.917	1.303	533	3.278	1.892

Tabelle 5.14:

a4_9 Ich trinke jetzt mehr, weil ich ...

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
... derzeit viel Stress habe bzw. stark belastet bin.	3,0 %	2,7 %	3,2 %	2,6 %	3,8 %	1,1 %	1,9 %	2,8 %	3,9 %
... jetzt mehr Freizeit bzw. weniger zu tun habe.	4,9 %	5,0 %	4,7 %	6,6 %	5,5 %	1,0 %	2,3 %	4,7 %	6,0 %
... es zu Hause oft einen Anlass gibt, Alkohol zu konsumieren.	2,7 %	2,8 %	2,6 %	3,5 %	3,2 %	,2 %	1,5 %	2,2 %	4,2 %
... ich häufiger am nächsten Tag nicht früh aufstehen muss.	2,4 %	2,3 %	2,5 %	3,6 %	2,6 %	,4 %	,6 %	2,5 %	3,0 %
Ich trinke aus einem anderen Grund jetzt mehr.	2,4 %	2,2 %	2,6 %	1,9 %	3,2 %	1,1 %	,8 %	2,3 %	3,0 %
keine Konsumsteigerung	13,5 %	16,7 %	10,5 %	20,6 %	11,8 %	8,2 %	16,4 %	12,9 %	13,8 %
keine Veränderung des Konsumverhaltens seit Ausbruch der Corona-Krise	60,5 %	58,9 %	62,1 %	41,8 %	64,6 %	74,6 %	47,4 %	62,2 %	62,4 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,3 %	8,7 %	9,8 %	13,8 %	7,4 %	8,0 %	17,1 %	9,4 %	6,4 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,3 %	4,1 %	6,4 %	11,0 %	2,4 %	6,0 %	13,3 %	4,6 %	3,0 %
	5906	2886	3020	1.686	2.917	1.302	532	3278	1893

Tabelle 5.15:

rsod1m Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 3 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Männer, Rohwerte)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	2,1%	2,1%	-	1,9%	2,0%	2,8%	1,6%	1,8%	2,6%
5-6 Tage pro Woche	2,6%	2,6%	-	1,6%	3,4%	2,1%	1,6%	3,2%	1,9%
3-4 Tage pro Woche	4,8%	4,8%	-	4,5%	5,3%	3,8%	4,4%	5,2%	4,4%
1-2 Tage pro Woche	10,1%	10,1%	-	10,4%	10,6%	8,1%	9,7%	10,0%	10,9%
2-3 Tage pro Monat	10,1%	10,1%	-	10,9%	10,0%	8,5%	5,6%	11,3%	9,3%
1 Tag pro Monat	13,8%	13,8%	-	14,6%	13,8%	11,3%	13,3%	14,0%	14,1%
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 3 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	37,5%	37,5%	-	26,5%	41,0%	44,7%	27,0%	36,7%	43,1%
Ich habe noch nie in meinem Leben 3 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	6,0%	6,0%	-	3,7%	5,9%	10,6%	6,9%	5,4%	6,2%
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	8,8%	8,8%	-	14,5%	6,8%	6,2%	16,1%	9,3%	5,0%
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	4,2%	4,2%	-	11,5%	1,2%	1,9%	13,7%	3,0%	2,6%
gültige Angaben	2.863	2.863	-	896	1.463	577	248	1.643	893

Tabelle 5.16:

rsod1m_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 3 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Männer, undersamplingadjustiert*)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	8,5%	8,5%	-	7,3%	19,7%	6,8%	1,6%	1,8%	2,6%
5-6 Tage pro Woche	2,5%	2,5%	-	1,4%	2,8%	2,0%	1,6%	3,2%	1,9%
3-4 Tage pro Woche	4,5%	4,5%	-	4,2%	4,4%	3,7%	4,5%	5,2%	4,4%
1-2 Tage pro Woche	9,4%	9,4%	-	9,7%	8,7%	7,8%	8,9%	10,0%	10,9%
2-3 Tage pro Monat	9,4%	9,4%	-	10,4%	8,2%	8,1%	5,7%	11,3%	9,3%
1 Tag pro Monat	12,9%	12,9%	-	13,8%	11,3%	10,8%	13,4%	14,0%	14,1%
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 3 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	35,1%	35,1%	-	25,1%	33,6%	42,9%	27,2%	36,7%	43,1%
Ich habe noch nie in meinem Leben 3 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	5,6%	5,6%	-	3,5%	4,8%	10,1%	6,9%	5,4%	6,2%
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	8,2%	8,2%	-	13,7%	5,5%	6,0%	16,3%	9,3%	5,0%
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	3,9%	3,9%	-	10,9%	1,0%	1,8%	13,8%	3,0%	2,6%
gültige Angaben	3.060	3.060	-	946	1.786	602	246	1.643	893

*Undersamplingadjustiert bedeutet, dass zu dem empirischen Sample fiktive Personen mit der höchsten Konsumstufe ergänzt wurden, da diese in Befragungen normalerweise unterrepräsentiert sind.

Tabelle 5.17:

rsod1w Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 2 alkoholische Getränkeeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Frauen, Rohwerte)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	1,3%	-	1,3%	1,1%	,9%	2,5%	3,2%	1,1%	1,2%
5-6 Tage pro Woche	1,9%	-	1,9%	1,4%	2,0%	2,3%	1,1%	1,9%	2,2%
3-4 Tage pro Woche	4,8%	-	4,8%	2,8%	5,3%	5,2%	5,4%	5,2%	4,2%
1-2 Tage pro Woche	10,0%	-	10,0%	11,6%	10,6%	6,9%	5,4%	10,4%	10,9%
2-3 Tage pro Monat	11,8%	-	11,8%	14,2%	12,1%	8,9%	9,0%	11,7%	12,5%
1 Tag pro Monat	14,8%	-	14,8%	15,9%	15,3%	12,6%	16,5%	14,0%	15,8%
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 2 alkoholische Getränkeeinheiten oder mehr getrunken.	32,3%	-	32,3%	27,3%	34,9%	31,7%	21,9%	32,8%	35,1%
Ich habe noch nie in meinem Leben 2 alkoholische Getränkeeinheiten oder mehr getrunken.	6,8%	-	6,8%	1,4%	7,1%	11,7%	5,7%	7,1%	6,7%
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,9%	-	9,9%	13,4%	8,2%	9,2%	18,3%	9,6%	7,8%
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	6,5%	-	6,5%	10,8%	3,6%	9,1%	13,6%	6,2%	3,5%
gültige Angaben	3.004	-	3.004	850	1.500	772	279	1.623	981

Tabelle 5.18:

rsod1w_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 2 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Frauen, undersamplingadjustiert*)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	2,6%	-	2,6%	1,1%	5,5%	3,4%	2,5%	1,0%	1,2%
5-6 Tage pro Woche	1,8%	-	1,8%	1,2%	1,9%	2,3%	,7%	1,9%	2,2%
3-4 Tage pro Woche	4,6%	-	4,6%	2,7%	5,1%	5,2%	5,1%	5,2%	4,1%
1-2 Tage pro Woche	9,9%	-	9,9%	11,7%	10,1%	6,8%	5,5%	10,4%	10,9%
2-3 Tage pro Monat	11,6%	-	11,6%	14,3%	11,5%	8,5%	9,1%	11,7%	12,4%
1 Tag pro Monat	14,7%	-	14,7%	15,9%	14,6%	12,5%	16,7%	14,0%	15,8%
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 2 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	31,9%	-	31,9%	27,4%	33,2%	31,6%	22,2%	32,9%	35,2%
Ich habe noch nie in meinem Leben 2 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	6,7%	-	6,7%	1,4%	6,8%	11,6%	5,8%	7,1%	6,7%
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,7%	-	9,7%	13,5%	7,8%	9,1%	18,5%	9,6%	7,9%
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	6,4%	-	6,4%	10,9%	3,4%	9,0%	13,8%	6,2%	3,5%
gültige Angaben	3.037	-	3.037	847	1.573	776	275	1.620	978

*Undersamplingadjustiert bedeutet, dass zu dem empirischen Sample fiktive Personen mit der höchsten Konsumstufe ergänzt wurden, da diese in Befragungen normalerweise unterrepräsentiert sind.

Tabelle 5.19:

rsod1g Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 2 bzw. 3 Getränkeeinheiten bei einer Gelegenheit konsumiert? (Männer und Frauen, Rohwerte)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	1,7 %	2,1 %	1,3 %	1,5 %	1,5 %	2,6 %	2,5 %	1,5 %	1,8 %
5-6 Tage pro Woche	2,3 %	2,6 %	1,9 %	1,4 %	2,7 %	2,2 %	1,3 %	2,6 %	2,1 %
3-4 Tage pro Woche	4,8 %	4,8 %	4,8 %	3,7 %	5,3 %	4,6 %	4,9 %	5,2 %	4,2 %
1-2 Tage pro Woche	10,1 %	10,1 %	10,0 %	11,0 %	10,6 %	7,4 %	7,4 %	10,2 %	10,9 %
2-3 Tage pro Monat	11,0 %	10,1 %	11,8 %	12,6 %	11,1 %	8,7 %	7,4 %	11,5 %	11,1 %
1 Tag pro Monat	14,3 %	13,8 %	14,8 %	15,2 %	14,5 %	12,1 %	15,0 %	14,0 %	15,0 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 2 bzw. 3 Getränkeeinheiten bei einer Gelegenheit getrunken.	34,9 %	37,5 %	32,3 %	26,9 %	37,9 %	37,2 %	24,3 %	34,8 %	38,9 %
Ich habe noch nie im Leben 2 bzw. 3 Getränkeeinheiten bei einer Gelegenheit getrunken.	6,4 %	6,0 %	6,8 %	2,5 %	6,5 %	11,2 %	6,3 %	6,2 %	6,5 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,3 %	8,8 %	9,9 %	14,0 %	7,5 %	8,0 %	17,3 %	9,4 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,3 %	4,2 %	6,5 %	11,2 %	2,4 %	6,0 %	13,5 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.866	2.863	3.004	1.668	2.898	1.299	526	3.267	1.873

Tabelle 5.20:

rsod1g_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 2 bzw. 3 Getränkeeinheiten bei einer Gelegenheit konsumiert? (Männer und Frauen, undersamplingadjustiert*)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	5,5 %	8,5 %	2,6 %	4,4 %	13,1 %	4,8 %	2,1 %	1,5 %	1,8 %
5-6 Tage pro Woche	2,1 %	2,5 %	1,8 %	1,3 %	2,4 %	2,2 %	1,2 %	2,5 %	2,1 %
3-4 Tage pro Woche	4,6 %	4,5 %	4,6 %	3,5 %	4,7 %	4,5 %	4,8 %	5,2 %	4,2 %
1-2 Tage pro Woche	9,7 %	9,4 %	9,9 %	10,6 %	9,3 %	7,2 %	7,3 %	10,2 %	10,9 %
2-3 Tage pro Monat	10,5 %	9,4 %	11,6 %	12,2 %	9,8 %	8,4 %	7,5 %	11,5 %	10,9 %
1 Tag pro Monat	13,8 %	12,9 %	14,7 %	14,8 %	12,8 %	11,8 %	15,2 %	14,0 %	15,0 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 2 bzw. 3 Getränkeeinheiten bei einer Gelegenheit getrunken.	33,6 %	35,1 %	31,9 %	26,2 %	33,4 %	36,4 %	24,6 %	34,8 %	39,0 %
Ich habe noch nie im Leben 2 bzw. 3 Getränkeeinheiten bei einer Gelegenheit getrunken.	6,1 %	5,6 %	6,7 %	2,5 %	5,7 %	10,9 %	6,3 %	6,3 %	6,5 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,0 %	8,2 %	9,7 %	13,6 %	6,6 %	7,8 %	17,5 %	9,4 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,1 %	3,9 %	6,4 %	10,9 %	2,1 %	5,9 %	13,6 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	6.095	3.060	3.037	1.792	3.360	1.380	521	3.264	1.870

*Undersamplingadjustiert bedeutet, dass zu dem empirischen Sample fiktive Personen mit der höchsten Konsumstufe ergänzt wurden, da diese in Befragungen normalerweise unterrepräsentiert sind.

Tabelle 5.21:

rsod3m Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 6 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Männer, Rohwerte)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	,4%	,4%	-	,8%	,3%	,3%	,8%	,1%	,6%
5-6 Tage pro Woche	,6%	,6%	-	,8%	,5%	,5%	,8%	,5%	,8%
3-4 Tage pro Woche	1,2%	1,2%	-	1,6%	1,4%	,3%	1,2%	1,3%	1,1%
1-2 Tage pro Woche	3,2%	3,2%	-	4,8%	2,5%	2,2%	4,1%	3,1%	2,9%
2-3 Tage pro Monat	5,3%	5,3%	-	7,0%	5,3%	2,2%	,8%	6,6%	4,5%
1 Tag pro Monat	8,9%	8,9%	-	11,0%	9,0%	4,7%	7,7%	9,5%	8,3%
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 6 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	19,4%	19,4%	-	15,4%	21,6%	19,2%	12,2%	20,3%	20,6%
Ich habe noch nie in meinem Leben 6 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	4,5%	4,5%	-	2,2%	4,7%	7,3%	8,1%	4,3%	4,3%
Ich habe in den letzten 30 Tagen oder noch nie mehr als 3 Getränkeinheiten konsumiert.	43,5%	43,5%	-	30,2%	46,7%	55,1%	34,1%	42,0%	49,3%
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	8,8%	8,8%	-	14,6%	6,8%	6,2%	16,3%	9,2%	5,1%
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	4,2%	4,2%	-	11,6%	1,2%	1,9%	13,8%	3,0%	2,6%
gültige Angaben	2.856	2.856	-	890	1.461	579	246	1.644	890

Tabelle 5.22:

rsod3m_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 6 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Männer, undersamplingadjustiert*)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	6,9%	6,9%	-	6,3%	18,4%	4,3%	,8%	,1%	,6%
5-6 Tage pro Woche	,6%	,6%	-	,7%	,4%	,5%	,8%	,5%	,8%
3-4 Tage pro Woche	1,1%	1,1%	-	1,5%	1,1%	,3%	1,2%	1,3%	1,1%
1-2 Tage pro Woche	2,9%	2,9%	-	4,6%	2,1%	2,2%	3,7%	3,1%	2,9%
2-3 Tage pro Monat	4,9%	4,9%	-	6,6%	4,3%	2,2%	,8%	6,6%	4,5%
1 Tag pro Monat	8,3%	8,3%	-	10,3%	7,4%	4,5%	7,0%	9,5%	8,3%
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 6 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	18,2%	18,2%	-	14,6%	17,7%	18,4%	12,3%	20,3%	20,6%
Ich habe noch nie in meinem Leben 6 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	4,2%	4,2%	-	2,1%	3,8%	7,0%	8,2%	4,3%	4,3%
Ich habe in den letzten 30 Tagen oder noch nie mehr als 3 Getränkeinheiten konsumiert.	40,7%	40,7%	-	28,6%	38,2%	52,9%	34,6%	42,0%	49,3%
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	8,3%	8,3%	-	13,8%	5,5%	6,0%	16,5%	9,2%	5,1%
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	3,9%	3,9%	-	10,9%	1,0%	1,8%	14,0%	3,0%	2,6%
gültige Angaben	3.054	3.054	-	941	1.784	603	243	1.644	890

*Undersamplingadjustiert bedeutet, dass zu dem empirischen Sample fiktive Personen mit der höchsten Konsumstufe ergänzt wurden, da diese in Befragungen normalerweise unterrepräsentiert sind.

Tabelle 5.23:

rsod3w Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 4 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Frauen, Rohwerte)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	,3%	-	,3%	,4%	,2%	,5%	,7%	,4%	,2%
5-6 Tage pro Woche	,3%	-	,3%	,1%	,3%	,1%	,7%	,2%	,1%
3-4 Tage pro Woche	,8%	-	,8%	1,1%	,7%	,7%	1,4%	,9%	,5%
1-2 Tage pro Woche	3,0%	-	3,0%	4,5%	2,8%	1,8%	3,2%	3,1%	2,8%
2-3 Tage pro Monat	3,8%	-	3,8%	6,4%	3,2%	2,2%	2,2%	3,6%	4,6%
1 Tag pro Monat	8,8%	-	8,8%	13,1%	8,9%	3,8%	9,7%	9,1%	8,2%
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 4 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	20,8%	-	20,8%	19,7%	22,9%	17,1%	14,7%	20,8%	23,2%
Ich habe noch nie in meinem Leben 4 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	6,6%	-	6,6%	1,8%	6,9%	11,7%	7,9%	6,0%	6,8%
Ich habe in den letzten 30 Tagen oder noch nie mehr als 3 Getränkeinheiten konsumiert.	39,2%	-	39,2%	28,8%	42,3%	43,7%	27,6%	40,1%	42,1%
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,9%	-	9,9%	13,4%	8,2%	9,3%	18,3%	9,6%	7,9%
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	6,5%	-	6,5%	10,8%	3,6%	9,1%	13,6%	6,2%	3,5%
gültige Angaben	2.989	-	2.989	848	1.491	767	279	1.617	973

Tabelle 5.24:

rsod3w_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 4 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr bei einer Gelegenheit getrunken? (nur Frauen, undersamplingadjustiert*)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	1,7%	-	1,7%	,4%	4,9%	1,7%	,7%	,3%	,2%
5-6 Tage pro Woche	,3%	-	,3%	,1%	,3%	,1%	,7%	,2%	,1%
3-4 Tage pro Woche	,8%	-	,8%	1,1%	,6%	,6%	1,4%	,9%	,5%
1-2 Tage pro Woche	2,9%	-	2,9%	4,4%	2,7%	1,8%	3,3%	3,0%	2,8%
2-3 Tage pro Monat	3,7%	-	3,7%	6,3%	3,1%	1,8%	2,2%	3,5%	4,4%
1 Tag pro Monat	8,7%	-	8,7%	13,1%	8,4%	3,8%	9,4%	9,1%	8,2%
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 4 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	20,4%	-	20,4%	19,7%	21,8%	16,7%	14,1%	20,8%	23,3%
Ich habe noch nie in meinem Leben 4 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	6,5%	-	6,5%	1,8%	6,6%	11,7%	8,0%	6,0%	6,8%
Ich habe in den letzten 30 Tagen oder noch nie mehr als 3 Getränkeinheiten konsumiert.	38,8%	-	38,8%	28,8%	40,3%	43,5%	27,9%	40,1%	42,2%
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,8%	-	9,8%	13,5%	7,9%	9,2%	18,5%	9,6%	7,9%
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	6,4%	-	6,4%	10,9%	3,5%	9,1%	13,8%	6,3%	3,5%
gültige Angaben	3.023	-	3.023	846	1.564	771	276	1.614	971

*Undersamplingadjustiert bedeutet, dass zu dem empirischen Sample fiktive Personen mit der höchsten Konsumstufe ergänzt wurden, da diese in Befragungen normalerweise unterrepräsentiert sind.

Tabelle 5.25:

rsod3g Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 4 bzw. 6 Getränkeeinheiten bei einer Gelegenheit konsumiert? (Männer und Frauen, Rohwerte)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	,4 %	,4 %	,3 %	0,5 %	0,2 %	0,4 %	1,0 %	,2 %	,3 %
5-6 Tage pro Woche	,4 %	,6 %	,3 %	0,5 %	0,5 %	0,2 %	,8 %	,4 %	,4 %
3-4 Tage pro Woche	1,0 %	1,2 %	,8 %	1,4 %	1,0 %	0,5 %	1,3 %	1,1 %	,8 %
1-2 Tage pro Woche	3,1 %	3,2 %	3,0 %	4,8 %	2,6 %	2,0 %	3,6 %	3,1 %	2,8 %
2-3 Tage pro Monat	4,5 %	5,3 %	3,8 %	6,7 %	4,3 %	2,2 %	1,5 %	5,1 %	4,6 %
1 Tag pro Monat	8,8 %	8,9 %	8,8 %	12,3 %	8,9 %	4,3 %	8,7 %	9,3 %	8,3 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 4 bzw. 6 alkoholische Getränkeeinheiten oder mehr getrunken.	20,1 %	19,4 %	20,8 %	17,9 %	22,4 %	18,0 %	13,5 %	20,5 %	22,0 %
Ich habe noch nie in meinem Leben 4 bzw. 6 alkoholische Getränkeeinheiten oder mehr getrunken.	5,6 %	4,5 %	6,6 %	2,1 %	5,5 %	10,1 %	8,0 %	5,2 %	5,6 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen oder noch nie mehr als 3 Getränkeeinheiten konsumiert.	41,3 %	43,5 %	39,2 %	30,0 %	44,7 %	48,3 %	30,8 %	41,0 %	45,6 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,4 %	8,8 %	9,9 %	13,7 %	7,5 %	8,0 %	17,3 %	9,4 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,4 %	4,2 %	6,5 %	10,2 %	2,4 %	5,8 %	13,5 %	4,6 %	3,1 %
gültige Angaben	5.844	2.856	2.989	1.662	2.888	1.293	526	3.261	1.863

Tabelle 5.26:

rsod3g_u Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen 4 bzw. 6 Getränkeinheiten bei einer Gelegenheit konsumiert? (Männer und Frauen, undersamplingadjustiert*)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	4,3 %	6,9 %	1,7 %	3,5 %	12,1 %	2,8 %	1,0 %	,2 %	,3 %
5-6 Tage pro Woche	,4 %	,6 %	,3 %	,4 %	,4 %	,2 %	,8 %	,4 %	,4 %
3-4 Tage pro Woche	1,0 %	1,1 %	,8 %	1,3 %	,9 %	,5 %	1,3 %	1,1 %	,8 %
1-2 Tage pro Woche	2,9 %	2,9 %	2,9 %	4,5 %	2,4 %	2,0 %	3,5 %	3,1 %	2,8 %
2-3 Tage pro Monat	4,3 %	4,9 %	3,7 %	6,5 %	3,7 %	2,0 %	1,5 %	5,0 %	4,5 %
1 Tag pro Monat	8,5 %	8,3 %	8,7 %	11,6 %	7,9 %	4,1 %	8,4 %	9,3 %	8,3 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen nie 4 bzw. 6 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	19,3 %	18,2 %	20,4 %	17,0 %	19,6 %	17,5 %	13,2 %	20,5 %	22,0 %
Ich habe noch nie in meinem Leben 4 bzw. 6 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken.	5,4 %	4,2 %	6,5 %	2,0 %	5,1 %	9,6 %	8,1 %	5,2 %	5,6 %
Ich habe in den letzten 30 Tagen oder noch nie mehr als 3 Getränkeinheiten konsumiert.	39,7 %	40,7 %	38,8 %	28,7 %	39,2 %	47,6 %	31,1 %	41,1 %	45,6 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,0 %	8,3 %	9,8 %	13,7 %	6,6 %	7,9 %	17,5 %	9,4 %	6,6 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,2 %	3,9 %	6,4 %	10,9 %	2,1 %	5,9 %	13,6 %	4,6 %	3,1 %
	6.073	3.054	3.023	1.787	3.349	1.375	521	3.257	1.860

*Undersamplingadjustiert bedeutet, dass zu dem empirischen Sample fiktive Personen mit der höchsten Konsumstufe ergänzt wurden, da diese in Befragungen normalerweise unterrepräsentiert sind.

Tabelle 5.27:

dr1 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen so viel getrunken, dass Sie sich unsicher auf den Beinen gefühlt haben oder Ihre Aussprache undeutlich wurde?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
jeden Tag	,1 %	,1 %	,1 %	0,2 %	0,0 %	0,1 %	,4 %	,1 %	0,0 %
5-6 Tage pro Woche	,2 %	,2 %	,2 %	0,5 %	0,1 %	0,0 %	,2 %	,2 %	,3 %
3-4 Tage pro Woche	,4 %	,6 %	,2 %	0,8 %	0,2 %	0,2 %	,8 %	,4 %	,3 %
1-2 Tage pro Woche	1,1 %	1,4 %	,7 %	2,1 %	0,7 %	0,6 %	2,1 %	1,0 %	,9 %
2-3 Tage pro Monat	2,1 %	2,7 %	1,5 %	4,3 %	1,7 %	0,2 %	1,7 %	2,2 %	2,2 %
1 Tag pro Monat	6,6 %	7,5 %	5,8 %	11,1 %	6,3 %	1,4 %	7,6 %	6,5 %	6,6 %
Ich war in den letzten 30 Tagen nie stark betrunken, aber früher.	49,1 %	56,7 %	41,9 %	45,7 %	56,1 %	38,0 %	29,8 %	49,4 %	55,8 %
Ich war noch nie in meinem Leben stark betrunken.	25,7 %	17,8 %	33,3 %	11,7 %	24,9 %	45,7 %	26,4 %	26,2 %	24,4 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,4 %	8,8 %	9,9 %	13,5 %	7,5 %	8,1 %	17,4 %	9,4 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,4 %	4,2 %	6,5 %	10,1 %	2,4 %	5,8 %	13,6 %	4,6 %	3,1 %
gültige Angaben	5.844	2.856	2.988	1.680	2.878	1.285	523	3.257	1.868

Tabelle 5.28:

h1 Hat sich jemals eine Person (z. B. Freund/-in, Verwandte[r] oder Ärztin/Arzt) besorgt über Ihr Trinken gezeigt?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja, während des letzten Jahres	3,6 %	5,3 %	2,1 %	4,5 %	3,7 %	2,5 %	5,5 %	3,5 %	3,4 %
ja, aber nicht im letzten Jahr	6,6 %	9,3 %	4,0 %	7,1 %	6,7 %	5,9 %	6,5 %	6,4 %	7,4 %
nein, nie	75,2 %	72,5 %	77,7 %	64,8 %	79,9 %	77,8 %	57,0 %	76,1 %	79,8 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,3 %	8,8 %	9,8 %	13,5 %	7,4 %	8,0 %	17,4 %	9,3 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,3 %	4,1 %	6,4 %	10,1 %	2,4 %	5,8 %	13,6 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.902	2.876	3.027	1.683	2.921	1.300	523	3.288	1.890

Tabelle 5.29:

h2 Haben Sie jemals selbst daran gedacht, wegen Ihres Alkoholkonsums Rat und Hilfe zu suchen?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja, während des letzten Jahres	1,2 %	1,5 %	1,0 %	1,6 %	1,1 %	1,0 %	1,3 %	1,5 %	,8 %
ja, aber nicht im letzten Jahr	2,5 %	3,3 %	1,7 %	3,2 %	2,3 %	2,0 %	2,7 %	2,7 %	2,1 %
nein, nie	81,7 %	82,2 %	81,1 %	71,5 %	86,9 %	83,1 %	65,0 %	81,9 %	87,6 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,3 %	8,8 %	9,8 %	13,5 %	7,4 %	8,0 %	17,4 %	9,4 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,3 %	4,1 %	6,4 %	10,1 %	2,4 %	5,8 %	13,6 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.888	2.872	3.018	1.676	2.919	1.293	523	3.280	1.884

Tabelle 5.30:

h3 Hat Ihre Entscheidung, Hilfe zu suchen, mit der aktuellen Corona-Krise zu tun?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	,2 %	,3 %	,1 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	,8 %	,1 %	,1 %
nein	1,0 %	1,2 %	,9 %	0,9 %	1,1 %	1,0 %	,6 %	1,3 %	,7 %
Ich habe im letzten Jahr nicht daran gedacht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.	2,5 %	3,3 %	1,7 %	3,2 %	2,3 %	2,0 %	2,7 %	2,7 %	2,1 %
Ich habe noch nie daran gedacht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.	81,7 %	82,3 %	81,1 %	71,5 %	86,9 %	83,1 %	65,0 %	81,9 %	87,6 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,3 %	8,8 %	9,8 %	13,6 %	7,4 %	8,0 %	17,4 %	9,4 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,3 %	4,1 %	6,4 %	10,1 %	2,4 %	5,8 %	13,6 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.887	2.871	3.018	1.675	2.919	1.293	523	3.280	1.884

Tabelle 5.31:

h4 Haben Sie jemals wegen Ihres Alkoholkonsums auch tatsächlich Rat und Hilfe in Anspruch genommen?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja, während des letzten Jahres	,6 %	,7 %	,4 %	1,0 %	0,5 %	0,2 %	1,3 %	,5 %	,5 %
ja, aber nicht im letzten Jahr	,9 %	1,1 %	,7 %	1,1 %	0,9 %	0,6 %	1,5 %	,9 %	,8 %
nein, nie	2,2 %	2,9 %	1,5 %	2,6 %	2,0 %	2,2 %	1,1 %	2,6 %	1,6 %
Ich habe noch nie daran gedacht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.	81,7 %	82,4 %	81,1 %	71,6 %	86,9 %	83,1 %	65,0 %	82,0 %	87,6 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keinen Alkohol getrunken, aber früher.	9,3 %	8,8 %	9,8 %	13,6 %	7,4 %	8,0 %	17,4 %	9,4 %	6,5 %
Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken.	5,3 %	4,1 %	6,4 %	10,2 %	2,4 %	5,8 %	13,6 %	4,6 %	3,0 %
gültige Angaben	5.885	2.868	3.018	1.674	2.919	1.294	523	3.277	1.884

Tabelle 5.32:
 mnd Motive für Abstinenz (Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich habe kein Interesse an Alkoholkonsum.	11,7 %	9,8 %	13,5 %	16,4 %	8,8 %	12,2 %	22,7 %	11,8 %	7,6 %
Ich habe bei anderen Menschen abschreckende Beispiele erlebt, was Alkohol anrichten kann.	9,2 %	8,0 %	10,4 %	12,5 %	7,1 %	9,8 %	16,5 %	9,5 %	6,2 %
Ich trinke aus religiösen Gründen keinen Alkohol.	2,1 %	2,7 %	1,6 %	6,1 %	0,5 %	0,5 %	6,1 %	1,9 %	1,2 %
Alkoholabstinenz war Teil meiner Erziehung als Kind.	3,3 %	2,9 %	3,7 %	6,2 %	1,6 %	3,3 %	7,1 %	3,1 %	2,1 %
Alkoholkonsum ist mir zu teuer.	3,9 %	3,8 %	4,0 %	7,0 %	2,3 %	3,3 %	10,8 %	3,7 %	2,0 %
Alkoholkonsum ist Geldverschwendung.	7,9 %	6,8 %	9,0 %	13,5 %	5,0 %	7,3 %	17,6 %	8,0 %	4,2 %
Alkoholkonsum ist schlecht für meine Gesundheit.	10,9 %	9,5 %	12,3 %	16,1 %	8,0 %	10,8 %	20,5 %	10,9 %	7,2 %
Ich trinke wegen einer bestehenden Erkrankung keinen Alkohol.	2,8 %	3,1 %	2,4 %	3,7 %	1,9 %	3,5 %	5,2 %	3,0 %	1,6 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken.	86,6 %	88,6 %	84,7 %	78,7 %	90,5 %	87,0 %	73,6 %	86,9 %	90,9 %
gültige Angaben	5.893	2.867	3.025	1.682	2.934	1.309	518	3.282	1.890

Tabelle 5.33:
mnd Motive für Abstinenz (Fortsetzung; Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich trinke keinen Alkohol, weil ich Medikamente nehme.	2,9 %	2,7 %	3,1 %	3,6 %	2,1 %	4,0 %	6,5 %	3,1 %	1,5 %
Ich mag den Geschmack von Alkohol nicht.	7,6 %	5,7 %	9,4 %	11,0 %	5,8 %	7,2 %	14,0 %	7,4 %	5,1 %
Ich mag die Auswirkungen nicht, die Alkohol auf mich hat.	8,5 %	7,5 %	9,5 %	12,1 %	6,5 %	8,5 %	14,5 %	8,9 %	5,3 %
Mir wurde durch den Alkoholkonsum einer anderen Person Schaden zugefügt.	3,0 %	2,5 %	3,4 %	5,0 %	1,9 %	2,8 %	6,3 %	2,7 %	2,0 %
Alkoholkonsum wirkt sich negativ auf meine Freizeitaktivitäten aus.	5,3 %	5,6 %	5,1 %	8,3 %	3,9 %	4,7 %	10,2 %	5,5 %	3,3 %
Ich habe Angst davor, Probleme mit Alkohol zu bekommen bzw. Alkoholiker/-in zu werden.	3,8 %	4,1 %	3,4 %	7,3 %	2,4 %	2,4 %	8,6 %	3,6 %	2,0 %
In der Vergangenheit hat mir mein Alkoholkonsum geschadet.	2,6 %	3,1 %	2,2 %	4,1 %	2,0 %	2,3 %	5,4 %	2,8 %	1,6 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken.	86,6 %	88,6 %	84,7 %	78,7 %	90,5 %	87,0 %	73,6 %	86,9 %	90,9 %
gültige Angaben	5.893	2.867	3.025	1.682	2.934	1.309	518	3.282	1.890

Tabelle 5.34:
hd1 Gibt es Personen in Ihrem Haushalt, die viel Alkohol trinken und Ihnen dadurch Probleme verursachen?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	5,7 %	4,3 %	7,1 %	9,7 %	4,4 %	3,8 %	9,7 %	5,2 %	5,4 %
nein	94,3 %	95,7 %	92,9 %	90,3 %	95,6 %	96,2 %	90,3 %	94,8 %	94,6 %
gültige Angaben	5.887	2.884	3.003	1.712	2.938	1.313	525	3.277	1.883

Tabelle 5.35:

hd2a bis hd2f: Personen, die durch ihren Alkoholkonsum Probleme verursachen
(Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Partner/-in	2,7 %	1,3 %	4,0 %	1,6 %	3,3 %	2,7 %	2,9 %	2,2 %	3,5 %
mein Vater	1,5 %	1,2 %	1,7 %	4,2 %	0,5 %	0,3 %	3,1 %	1,5 %	1,0 %
meine Mutter	,7 %	,9 %	,5 %	2,2 %	0,1 %	0,0 %	2,9 %	,5 %	,3 %
mein Kind	,5 %	,4 %	,6 %	0,6 %	0,3 %	0,9 %	1,9 %	,4 %	,3 %
andere im Haushalt lebende Verwandte	,7 %	,6 %	,9 %	1,7 %	,4 %	,3 %	1,5 %	,6 %	,7 %
andere im Haushalt lebende nichtverwandte Personen	,4 %	,3 %	,4 %	0,8 %	0,2 %	0,0 %	,2 %	,4 %	,3 %
keine Person genannt, die viel Alkohol trinkt und dadurch Probleme verursacht	94,4 %	95,9 %	93,0 %	90,9 %	95,6 %	96,3 %	90,5 %	95,0 %	94,7 %
gültige Angaben	5.876	2.877	3.000	1.661	2.919	1.296	524	3.271	1.881

Tabelle 5.36:

hd3a Um welche Art von Problemen handelt es sich dabei? (Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich mache mir um die betreffende Person aufgrund ihres Alkoholkonsums Sorgen.	3,3 %	2,3 %	4,3 %	4,6 %	2,9 %	2,5 %	3,8 %	2,9 %	3,7 %
Die betreffende Person ist aufgrund ihres Alkoholkonsums mir (oder anderen Personen im Haushalt) gegenüber verbal aggressiv.	2,0 %	1,5 %	2,4 %	4,0 %	1,4 %	0,6 %	3,4 %	1,6 %	2,0 %
Die betreffende Person ist aufgrund ihres Alkoholkonsums mir (oder anderen Personen im Haushalt) gegenüber körperlich aggressiv.	,9 %	1,1 %	,7 %	2,1 %	0,4 %	0,3 %	2,3 %	,6 %	,7 %
Die betreffende Person vernachlässigt aufgrund ihres Alkoholkonsums berufliche oder private Aufgaben, die sie erledigen sollte.	1,4 %	1,2 %	1,7 %	2,3 %	1,2 %	0,7 %	1,9 %	1,3 %	1,4 %
Die betreffende Person benötigt aufgrund ihres Alkoholkonsums meine Hilfe bzw. Unterstützung.	,8 %	,5 %	1,1 %	1,6 %	0,5 %	0,4 %	,8 %	,6 %	,7 %
Die betreffende Person hält sich aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht an die vorgeschriebenen Anti-Corona-Maßnahmen.	,5 %	,4 %	,6 %	1,3 %	0,2 %	0,1 %	1,3 %	,5 %	,3 %
keine Person genannt, die viel Alkohol trinkt und dadurch Probleme verursacht	94,3 %	95,7 %	92,9 %	90,5 %	95,5 %	96,3 %	90,3 %	94,8 %	94,6 %
gültige Angaben	5.887	2.884	3.003	1.668	2.923	1.296	525	3.278	1.883

Tabelle 5.37:

hd4 Würden es Ihrer Meinung nach zu den genannten Problemen auch kommen, wenn die betreffende Person keinen Alkohol trinken würde?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ohne Alkohol würde es ganz sicher auch zu diesen Problemen kommen.	,4 %	,4 %	,3 %	0,7 %	0,3 %	0,2 %	1,0 %	,2 %	,5 %
Ohne Alkohol würde es wahrscheinlich auch zu diesen Problemen kommen.	1,1 %	1,2 %	1,0 %	2,5 %	0,6 %	0,5 %	2,7 %	,9 %	1,0 %
Ohne Alkohol würde es wahrscheinlich nicht zu diesen Problemen kommen.	2,2 %	1,4 %	2,9 %	3,1 %	1,9 %	1,5 %	2,5 %	2,1 %	2,2 %
Ohne Alkohol würde es ganz sicher nicht zu diesen Problemen kommen.	1,4 %	,9 %	2,0 %	2,2 %	1,4 %	0,7 %	2,1 %	1,4 %	1,1 %
weiß ich nicht	,6 %	,4 %	,8 %	1,0 %	0,3 %	0,8 %	1,5 %	,6 %	,4 %
keine Person genannt, die viel Alkohol trinkt und dadurch Probleme verursacht	94,3 %	95,7 %	92,9 %	90,6 %	95,6 %	96,2 %	90,3 %	94,8 %	94,7 %
gültige Angaben	5.884	2.883	3.001	1.666	2.922	1.297	525	3.277	1.881

Tabelle 5.38:

hd5 Wie (falls überhaupt) haben sich diese Probleme seit Ausbruch der Corona-Krise verändert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
An den Problemen hat sich insgesamt nichts geändert.	3,0 %	1,9 %	4,0 %	3,3 %	2,7 %	3,0 %	3,8 %	2,9 %	2,9 %
Seit dem Ausbruch der Corona-Krise sind die Probleme insgesamt weniger geworden.	,9 %	,7 %	1,0 %	1,9 %	0,5 %	0,4 %	2,7 %	,6 %	,9 %
Seit dem Ausbruch der Corona-Krise gibt es keine Probleme mehr.	,6 %	,6 %	,6 %	1,6 %	0,2 %	0,2 %	1,9 %	,4 %	,5 %
Seit dem Ausbruch der Corona-Krise sind die Probleme insgesamt mehr geworden.	,9 %	,8 %	1,1 %	1,7 %	0,9 %	0,0 %	,8 %	,9 %	,9 %
Seit dem Ausbruch der Corona-Krise haben die Probleme wieder begonnen.	,3 %	,2 %	,3 %	0,6 %	0,2 %	0,1 %	,6 %	,2 %	,3 %
keine Person genannt, die viel Alkohol trinkt und dadurch Probleme verursacht	94,4 %	95,8 %	93,0 %	90,8 %	95,5 %	96,3 %	90,3 %	94,9 %	94,5 %
gültige Angaben	5.879	2.880	2.999	1.661	2.923	1.296	525	3.274	1.884

Tabelle 5.39:

WELLE 2: alk_phase1 Alkoholkonsum in Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich getrunken	2,4 %	3,6 %	1,4 %	0,2 %	2,5 %	4,8 %	2,0 %	2,6 %	2,2 %
fast täglich getrunken (5-6 Tage pro Woche)	4,7 %	6,7 %	2,9 %	2,7 %	4,0 %	8,7 %	5,5 %	4,4 %	5,4 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) getrunken	20,3 %	25,3 %	15,5 %	14,2 %	21,9 %	23,7 %	11,1 %	19,5 %	24,0 %
1 Tag pro Woche getrunken	20,5 %	22,7 %	18,5 %	24,2 %	20,8 %	15,6 %	13,1 %	20,0 %	22,7 %
seltener als 1 Tag pro Woche getrunken	28,4 %	24,1 %	32,5 %	31,8 %	28,9 %	23,3 %	28,1 %	28,9 %	27,5 %
gar nicht getrunken	3,7 %	2,8 %	4,6 %	4,7 %	3,2 %	3,6 %	5,0 %	3,7 %	2,7 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol getrunken	19,9 %	14,8 %	24,7 %	22,1 %	18,7 %	20,2 %	35,2 %	20,7 %	15,5 %
gültige Angaben	3.259	1.587	1.673	850	1.665	743	199	1.900	1.073

Tabelle 5.40:

WELLE 2: alk_phase2 Alkoholkonsum in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März–Juni 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15–34 J.	35–64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich getrunken	6,7 %	8,6 %	4,9 %	2,2 %	7,3 %	10,7 %	5,1 %	7,1 %	6,3 %
fast täglich getrunken (5–6 Tage pro Woche)	8,6 %	11,9 %	5,4 %	7,7 %	8,7 %	9,2 %	8,6 %	7,9 %	10,1 %
mehrmals pro Woche (1–4 Tage) getrunken	20,8 %	23,0 %	18,7 %	18,0 %	21,6 %	22,2 %	10,6 %	20,4 %	23,3 %
1 Tag pro Woche getrunken	17,7 %	18,7 %	16,7 %	17,4 %	18,8 %	15,4 %	12,1 %	17,3 %	19,6 %
seltener als 1 Tag pro Woche getrunken	23,3 %	20,6 %	25,9 %	26,8 %	22,7 %	20,5 %	26,8 %	23,2 %	22,4 %
gar nicht getrunken	3,0 %	2,4 %	3,7 %	5,9 %	2,2 %	1,8 %	1,5 %	3,2 %	2,8 %
seit Anfang 2020 kei- nen Alkohol getrunken	19,9 %	14,8 %	24,8 %	22,1 %	18,7 %	20,3 %	35,4 %	20,8 %	15,5 %
gültige Angaben	3.252	1.586	1.666	852	1.663	740	198	1.898	1.072

Tabelle 5.41:

WELLE 2: alk_phase3 Alkoholkonsum in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli – Anfang September 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15–34 J.	35–64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich getrunken	2,9 %	4,0 %	1,9 %	0,9 %	2,7 %	5,7 %	4,0 %	3,1 %	2,4 %
fast täglich getrunken (5–6 Tage pro Woche)	6,1 %	8,1 %	4,1 %	4,0 %	6,0 %	8,5 %	5,0 %	5,2 %	8,0 %
mehrmals pro Woche (1–4 Tage) getrunken	23,1 %	27,3 %	19,2 %	18,2 %	24,5 %	25,9 %	13,0 %	22,4 %	27,0 %
1 Tag pro Woche getrunken	19,2 %	20,1 %	18,4 %	20,5 %	20,3 %	15,3 %	12,5 %	19,3 %	19,9 %
seltener als 1 Tag pro Woche getrunken	26,6 %	24,0 %	29,1 %	30,0 %	26,5 %	22,8 %	28,0 %	27,1 %	25,4 %
gar nicht getrunken	2,1 %	1,6 %	2,5 %	4,2 %	1,3 %	1,5 %	2,5 %	2,1 %	1,9 %
seit Anfang 2020 kei- nen Alkohol getrunken	19,9 %	14,8 %	24,8 %	22,1 %	18,7 %	20,3 %	35,0 %	20,8 %	15,5 %
gültige Angaben	3.253	1.586	1.665	852	1.663	740	200	1.898	1.072

Tabelle 5.42:

WELLE 2: alk_phase4 Alkoholkonsum in Phase 4: Aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)*

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich getrunken	2,8 %	3,8 %	1,8 %	0,9 %	2,7 %	5,1 %	3,5 %	3,1 %	2,2 %
fast täglich getrunken (5-6 Tage pro Woche)	5,7 %	7,6 %	3,8 %	3,1 %	5,3 %	9,4 %	5,0 %	4,8 %	7,5 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) getrunken	21,3 %	26,3 %	16,5 %	15,7 %	23,1 %	23,6 %	10,5 %	20,7 %	24,8 %
1 Tag pro Woche getrunken	19,3 %	21,1 %	17,7 %	21,0 %	19,9 %	16,2 %	17,0 %	19,2 %	19,7 %
seltener als 1 Tag pro Woche getrunken	25,5 %	22,1 %	28,6 %	29,6 %	25,3 %	21,0 %	22,0 %	26,1 %	24,9 %
gar nicht getrunken	5,6 %	4,2 %	6,9 %	7,5 %	5,1 %	4,4 %	7,0 %	5,4 %	5,4 %
seit Anfang 2020 kei- nen Alkohol getrunken	19,9 %	14,8 %	24,7 %	22,1 %	18,7 %	20,2 %	35,0 %	20,8 %	15,5 %
gültige Angaben	3.256	1.588	1.669	851	1.665	742	200	1.897	1.073

Tabelle 5.43:

WELLE 2: alk_anzahl_phase1_rec Durchschnittliche Anzahl der Alkoholstandardgläser an einem üblichen Konsumtag (Phase 1, vor Corona, rekodiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
seit Anfang 2020 keinen Alkohol konsumiert	20,8 %	15,5 %	25,9 %	22,6 %	19,5 %	21,9 %	37,6 %	21,8 %	16,1 %
keinen Alkohol in dem Zeitraum konsumiert	3,9 %	3,0 %	4,8 %	4,8 %	3,4 %	3,9 %	5,4 %	3,9 %	2,8 %
bis max. eine Einheit pro Konsumtag	42,6 %	42,4 %	42,7 %	34,5 %	44,8 %	47,4 %	34,9 %	40,9 %	47,3 %
mehr als 1 und bis max. 2 Einheiten pro Konsumtag	21,6 %	24,1 %	19,1 %	20,9 %	22,3 %	20,6 %	16,1 %	22,4 %	21,1 %
mehr als 2 und bis max. 3 Einheiten pro Konsumtag	6,3 %	7,6 %	5,0 %	8,6 %	5,9 %	4,2 %	2,7 %	5,7 %	8,1 %
mehr als 3 und bis max. 5 Einheiten pro Konsumtag	4,0 %	6,1 %	2,1 %	7,2 %	3,3 %	1,7 %	2,7 %	4,5 %	3,6 %
mehr als 5 Einheiten pro Konsumtag	,8 %	1,3 %	,3 %	1,4 %	0,7 %	0,3 %	,5 %	,8 %	,9 %
gültige Angaben	3.112	1.520	1.594	833	1.593	686	186	1.811	1.031

Tabelle 5.44:

WELLE 2: alk_anzahl_phase4_rec Durchschnittliche Anzahl der Alkoholstandardgläser an einem üblichen Konsumtag (Phase 4, in den letzten 4 Wochen, rekodiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
seit Anfang 2020 keinen Alkohol konsumiert	20,7 %	15,4 %	25,8 %	22,6 %	19,4 %	21,8 %	37,2 %	21,6 %	16,0 %
keinen Alkohol in dem Zeitraum konsumiert	5,8 %	4,4 %	7,2 %	7,7 %	5,3 %	4,8 %	7,4 %	5,6 %	5,6 %
bis max. eine Einheit pro Konsumtag	41,5 %	40,9 %	42,0 %	33,5 %	43,6 %	46,2 %	35,1 %	39,6 %	45,5 %
mehr als 1 und bis max. 2 Einheiten pro Konsumtag	20,8 %	23,9 %	17,9 %	21,4 %	20,6 %	20,5 %	13,3 %	21,9 %	20,6 %
mehr als 2 und bis max. 3 Einheiten pro Konsumtag	6,1 %	7,9 %	4,4 %	6,5 %	6,6 %	4,5 %	2,7 %	5,7 %	7,6 %
mehr als 3 und bis max. 5 Einheiten pro Konsumtag	4,1 %	6,0 %	2,2 %	6,4 %	3,7 %	2,2 %	3,2 %	4,3 %	4,0 %
mehr als 5 Einheiten pro Konsumtag	1,0 %	1,4 %	,6 %	2,0 %	0,8 %	0,1 %	1,1 %	1,2 %	,7 %
gültige Angaben	3.123	1.525	1.600	833	1.604	689	188	1.820	1.035

Tabelle 5.45:

WELLE 2: alk_ort_phase1 Trinken Sie Alkohol tendenziell eher zu Hause oder außer Haus (in der Gastronomie, im Freien)? (Phase 1, vor Corona)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ausschließlich zu Hause	6,1 %	6,2 %	5,9 %	3,8 %	5,5 %	10,1 %	7,6 %	6,0 %	5,8 %
überwiegend zu Hause	24,4 %	26,3 %	22,5 %	14,2 %	25,2 %	34,1 %	22,2 %	25,2 %	24,0 %
etwa gleich oft zu Hause bzw. außer Haus	21,8 %	22,2 %	21,5 %	22,8 %	22,4 %	19,4 %	15,2 %	21,1 %	24,4 %
überwiegend außer Haus	17,8 %	20,0 %	15,8 %	23,7 %	18,7 %	9,1 %	10,6 %	16,3 %	22,1 %
ausschließlich außer Haus	6,5 %	7,9 %	5,1 %	9,2 %	6,5 %	3,5 %	4,0 %	7,2 %	5,6 %
kein Konsum innerhalb dieses Zeitraums	3,5 %	2,6 %	4,4 %	4,2 %	3,1 %	3,5 %	5,1 %	3,5 %	2,7 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol getrunken	19,9 %	14,8 %	24,7 %	22,1 %	18,7 %	20,3 %	35,4 %	20,7 %	15,4 %
gültige Angaben	3.258	1.588	1.671	851	1.666	739	198	1.899	1.077

Tabelle 5.46:

WELLE 2: alk_ort_phase4 Trinken Sie Alkohol tendenziell eher zu Hause oder außer Haus (in der Gastronomie, im Freien)? (Phase 4, in den letzten 4 Wochen)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ausschließlich zu Hause	9,3 %	9,1 %	9,5 %	6,0 %	8,9 %	14,2 %	9,0 %	10,0 %	8,4 %
überwiegend zu Hause	30,1 %	32,7 %	27,6 %	25,3 %	30,9 %	33,6 %	26,6 %	28,4 %	33,8 %
etwa gleich oft zu Hause bzw. außer Haus	18,5 %	19,8 %	17,2 %	18,8 %	19,1 %	16,9 %	11,6 %	18,7 %	19,8 %
überwiegend außer Haus	11,2 %	12,5 %	9,9 %	13,8 %	11,5 %	7,3 %	8,0 %	10,5 %	12,8 %
ausschließlich außer Haus	5,7 %	7,1 %	4,3 %	6,6 %	6,1 %	3,6 %	3,0 %	6,4 %	4,5 %
kein Konsum innerhalb dieses Zeitraums	5,4 %	4,0 %	6,8 %	7,5 %	4,9 %	4,2 %	6,5 %	5,2 %	5,3 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol getrunken	19,9 %	14,8 %	24,7 %	22,0 %	18,6 %	20,2 %	35,2 %	20,7 %	15,4 %
gültige Angaben	3.261	1.590	1.672	853	1.668	741	199	1.900	1.076

Tabelle 5.47:

WELLE 2: alk_alleine_phase1 Trinken Sie Alkohol tendenziell eher allein (also ohne dass andere Menschen dabei sind) oder in Gesellschaft mit anderen Menschen? (Phase 1, vor Corona)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ausschließlich allein	1,2 %	1,7 %	,7 %	0,9 %	1,0 %	2,2 %	1,5 %	1,5 %	,7 %
überwiegend allein	6,6 %	8,0 %	5,4 %	3,2 %	6,0 %	11,9 %	3,1 %	7,1 %	6,9 %
etwa gleich oft allein bzw. gemeinsam mit anderen Menschen	13,6 %	17,0 %	10,3 %	8,7 %	14,1 %	17,9 %	14,8 %	14,0 %	12,5 %
überwiegend gemeinsam mit anderen Menschen	25,5 %	28,2 %	22,9 %	23,8 %	27,2 %	23,8 %	20,9 %	25,2 %	27,0 %
ausschließlich gemeinsam mit anderen Menschen	29,7 %	27,6 %	31,7 %	36,9 %	30,0 %	20,9 %	19,4 %	28,1 %	34,9 %
kein Konsum innerhalb dieses Zeitraums	3,4 %	2,6 %	4,2 %	4,4 %	3,1 %	3,1 %	4,6 %	3,4 %	2,6 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol getrunken	19,9 %	14,8 %	24,8 %	22,1 %	18,7 %	20,2 %	35,7 %	20,8 %	15,4 %
gültige Angaben	3.252	1.586	1.667	849	1.664	741	196	1.896	1.076

Tabelle 5.48:

WELLE 2: alk_alleine_phase4 Trinken Sie Alkohol tendenziell eher allein (also ohne dass andere Menschen dabei sind) oder in Gesellschaft mit anderen Menschen? (Phase 4, in den letzten 4 Wochen)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ausschließlich allein	1,7 %	2,3 %	1,1 %	1,1 %	1,5 %	2,7 %	1,5 %	2,1 %	1,1 %
überwiegend allein	9,0 %	10,8 %	7,4 %	5,8 %	8,8 %	13,4 %	5,6 %	9,5 %	9,4 %
etwa gleich oft allein bzw. gemeinsam mit anderen Menschen	14,0 %	16,7 %	11,5 %	10,1 %	14,5 %	17,6 %	13,7 %	14,2 %	13,6 %
überwiegend gemeinsam mit anderen Menschen	22,2 %	25,5 %	19,1 %	19,3 %	23,8 %	21,8 %	19,3 %	21,9 %	23,2 %
ausschließlich gemeinsam mit anderen Menschen	27,8 %	25,8 %	29,7 %	34,2 %	27,7 %	20,6 %	17,8 %	26,4 %	32,0 %
kein Konsum innerhalb dieses Zeitraums	5,3 %	4,2 %	6,4 %	7,4 %	5,0 %	3,7 %	6,6 %	5,2 %	5,3 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol getrunken	19,9 %	14,8 %	24,8 %	22,1 %	18,7 %	20,3 %	35,5 %	20,8 %	15,4 %
gültige Angaben	3.253	1.587	1.668	850	1.665	739	197	1.898	1.076

Tabelle 5.49:

WELLE 2: alk_wirkung1 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Mir fällt es leichter, auf andere Menschen zuzugehen.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
trifft meistens zu	14,8 %	14,5 %	15,1 %	31,9 %	10,8 %	4,3 %	9,0 %	14,7 %	16,7 %
trifft gelegentlich zu	36,2 %	40,8 %	31,8 %	38,4 %	38,8 %	27,9 %	29,8 %	34,2 %	40,7 %
trifft nie zu	36,1 %	34,7 %	37,4 %	15,3 %	37,7 %	56,5 %	38,3 %	38,0 %	31,7 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol konsumiert	12,9 %	10,0 %	15,7 %	14,5 %	12,8 %	11,4 %	22,9 %	13,2 %	10,9 %
gültige Angaben	3.138	1.538	1.600	813	1.622	703	188	1.835	1.039

Tabelle 5.50:

WELLE 2: alk_wirkung2 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich kann offener mit anderen Personen über meine Gefühle und Probleme sprechen.*

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
trifft meistens zu	10,5 %	9,8 %	11,2 %	21,5 %	8,0 %	3,4 %	6,9 %	9,8 %	12,7 %
trifft gelegentlich zu	32,2 %	34,7 %	29,9 %	39,9 %	31,6 %	25,0 %	24,5 %	31,9 %	34,6 %
trifft nie zu	44,3 %	45,5 %	43,1 %	24,1 %	47,6 %	60,2 %	45,7 %	45,0 %	41,9 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol konsumiert	12,9 %	10,0 %	15,7 %	14,5 %	12,8 %	11,4 %	22,9 %	13,2 %	10,9 %
gültige Angaben	3.132	1.537	1.595	814	1.617	701	188	1.830	1.039

Tabelle 5.51:

WELLE 2: alk_wirkung3 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich habe das Gefühl, anziehender und attraktiver zu sein.*

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
trifft meistens zu	4,2 %	3,7 %	4,6 %	10,4 %	2,5 %	0,7 %	2,1 %	4,0 %	4,9 %
trifft gelegentlich zu	18,0 %	17,9 %	18,2 %	31,7 %	16,8 %	5,1 %	13,3 %	16,1 %	22,3 %
trifft nie zu	64,9 %	68,3 %	61,5 %	43,3 %	67,9 %	82,7 %	61,7 %	66,5 %	61,9 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol konsumiert	13,0 %	10,1 %	15,8 %	14,6 %	12,8 %	11,4 %	22,9 %	13,3 %	10,9 %
gültige Angaben	3.121	1.528	1.592	808	1.611	700	188	1.816	1.038

Tabelle 5.52:

WELLE 2: alk_wirkung4 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich werde anderen gegenüber aggressiv.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
trifft meistens zu	1,0 %	1,2 %	,9 %	2,3 %	0,6 %	0,8 %	,5 %	1,3 %	,8 %
trifft gelegentlich zu	7,9 %	10,3 %	5,7 %	12,9 %	7,3 %	3,8 %	7,5 %	7,5 %	8,9 %
trifft nie zu	78,1 %	78,5 %	77,8 %	70,3 %	79,4 %	84,1 %	69,0 %	78,0 %	79,4 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol konsumiert	12,9 %	10,0 %	15,6 %	14,5 %	12,8 %	11,3 %	23,0 %	13,2 %	10,9 %
gültige Angaben	3.143	1.538	1.606	814	1.621	710	187	1.836	1.041

Tabelle 5.53:

WELLE 2: alk_wirkung5 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich werde traurig und niedergeschlagen.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
trifft meistens zu	1,5 %	1,6 %	1,4 %	3,5 %	1,0 %	0,3 %	,5 %	1,5 %	1,7 %
trifft gelegentlich zu	15,0 %	13,7 %	16,3 %	24,8 %	13,7 %	6,7 %	9,5 %	15,2 %	16,0 %
trifft nie zu	70,6 %	74,7 %	66,6 %	57,2 %	72,5 %	81,7 %	67,2 %	70,1 %	71,4 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol konsumiert	12,9 %	10,0 %	15,7 %	14,4 %	12,7 %	11,3 %	22,8 %	13,2 %	10,9 %
gültige Angaben	3.146	1.543	1.603	817	1.624	705	189	1.838	1.041

Tabelle 5.54:

WELLE 2: alk_wirkung6 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich werde entspannter bzw. bin weniger gestresst.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
trifft meistens zu	14,9 %	14,3 %	15,4 %	20,5 %	15,4 %	7,0 %	8,1 %	13,1 %	19,6 %
trifft gelegentlich zu	46,3 %	51,0 %	41,8 %	47,2 %	48,1 %	41,1 %	32,8 %	45,5 %	50,3 %
trifft nie zu	26,0 %	24,7 %	27,2 %	17,8 %	23,7 %	40,5 %	36,0 %	28,2 %	19,3 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol konsumiert	12,9 %	10,0 %	15,6 %	14,4 %	12,7 %	11,4 %	23,1 %	13,1 %	10,8 %
gültige Angaben	3.148	1.540	1.609	818	1.626	703	186	1.841	1.042

Tabelle 5.55:

WELLE 2: alk_wirkung7 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich bin weniger niedergeschlagen oder kann Probleme besser vergessen.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
trifft meistens zu	6,5 %	6,1 %	6,8 %	12,9 %	5,1 %	2,1 %	5,9 %	5,8 %	7,7 %
trifft gelegentlich zu	28,9 %	29,8 %	28,1 %	36,3 %	27,8 %	23,2 %	16,1 %	28,3 %	33,0 %
trifft nie zu	51,6 %	54,0 %	49,3 %	36,3 %	54,2 %	63,3 %	54,8 %	52,6 %	48,4 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol konsumiert	13,0 %	10,1 %	15,7 %	14,6 %	12,8 %	11,4 %	23,1 %	13,3 %	10,9 %
gültige Angaben	3.124	1.528	1.595	808	1.613	703	186	1.822	1.037

Tabelle 5.56:

WELLE 2: alk_wirkung8 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich fühle mich in Gruppen wohler und weniger unsicher.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
trifft meistens zu	8,1 %	6,7 %	9,5 %	18,6 %	5,4 %	2,3 %	6,5 %	7,1 %	10,3 %
trifft gelegentlich zu	28,1 %	32,6 %	23,8 %	37,5 %	27,9 %	17,7 %	23,1 %	27,7 %	29,7 %
trifft nie zu	50,8 %	50,7 %	51,0 %	29,3 %	53,9 %	68,6 %	47,3 %	51,9 %	49,2 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol konsumiert	12,9 %	10,1 %	15,7 %	14,6 %	12,8 %	11,4 %	23,1 %	13,3 %	10,9 %
gültige Angaben	3.129	1.531	1.598	808	1.619	701	186	1.824	1.041

Tabelle 5.57:

WELLE 2: alk_wirkung9 Welche Wirkung haben alkoholische Getränke auf Sie? Ich habe mehr Spaß bei dem, was ich gerade tue.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
trifft meistens zu	11,4 %	11,9 %	10,9 %	20,5 %	9,1 %	6,3 %	11,8 %	10,6 %	13,0 %
trifft gelegentlich zu	37,1 %	41,2 %	33,1 %	43,0 %	37,2 %	30,0 %	28,0 %	35,5 %	41,7 %
trifft nie zu	38,5 %	36,8 %	40,1 %	21,9 %	40,9 %	52,1 %	37,1 %	40,6 %	34,4 %
seit Anfang 2020 keinen Alkohol konsumiert	13,0 %	10,1 %	15,8 %	14,7 %	12,8 %	11,5 %	23,1 %	13,4 %	10,9 %
gültige Angaben	3.110	1.525	1.585	805	1.612	693	186	1.810	1.037

Tabelle 5.58:

alk_einstellung1 Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? Es spricht nichts dagegen, dass Eltern ihren kleinen Kindern einmal erlauben, Bier oder Wein zu kosten. Das schmeckt den Kindern ohnehin nicht, und ein Schluck kann nicht schaden.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	4,8 %	5,5 %	4,0 %	7,7 %	4,0 %	3,2 %	7,9 %	4,9 %	3,9 %
stimme eher zu	12,9 %	15,4 %	10,5 %	17,9 %	12,1 %	9,0 %	7,9 %	11,8 %	15,7 %
unentschieden	13,0 %	15,3 %	10,9 %	20,8 %	11,0 %	8,7 %	17,3 %	13,0 %	12,3 %
stimme eher nicht zu	25,6 %	26,0 %	25,1 %	25,7 %	24,5 %	27,7 %	31,2 %	24,7 %	25,4 %
stimme überhaupt nicht zu	43,8 %	37,8 %	49,5 %	28,0 %	48,5 %	51,4 %	35,6 %	45,6 %	42,6 %
gültige Angaben	3.273	1.595	1.678	857	1.668	747	202	1.904	1.077

Tabelle 5.59:

WELLE 2: alk_einstellung2 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich finde es äußerst verantwortungslos, wenn Eltern ihren kleinen Kindern erlauben, an alkoholischen Getränken zu nippen.*

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	45,5 %	40,7 %	50,1 %	31,9 %	48,7 %	54,1 %	45,3 %	46,3 %	43,6 %
stimme eher zu	16,7 %	16,7 %	16,7 %	19,1 %	16,8 %	13,7 %	18,2 %	16,1 %	17,8 %
unentschieden	14,4 %	18,1 %	10,9 %	24,4 %	12,4 %	7,5 %	14,3 %	15,2 %	13,0 %
stimme eher nicht zu	14,7 %	16,2 %	13,3 %	18,2 %	14,0 %	12,5 %	12,8 %	13,7 %	17,0 %
stimme überhaupt nicht zu	8,6 %	8,2 %	9,0 %	6,4 %	8,1 %	12,2 %	9,4 %	8,7 %	8,5 %
gültige Angaben	3.276	1.596	1.680	858	1.671	745	203	1.909	1.077

Tabelle 5.60:

WELLE 2: alk_einstellung3 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Es gibt keinen Grund, warum eine gesunde Frau in Gesellschaft keinen Alkohol trinken sollte.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	55,7 %	54,7 %	56,6 %	47,5 %	60,0 %	55,4 %	47,7 %	55,4 %	57,5 %
stimme eher zu	25,0 %	24,9 %	25,1 %	25,4 %	23,3 %	28,3 %	28,1 %	24,5 %	25,3 %
unentschieden	10,9 %	11,2 %	10,7 %	16,1 %	9,1 %	9,0 %	15,1 %	11,5 %	9,3 %
stimme eher nicht zu	4,4 %	5,1 %	3,8 %	5,1 %	4,3 %	4,0 %	3,5 %	4,8 %	4,2 %
stimme überhaupt nicht zu	3,9 %	4,1 %	3,8 %	5,8 %	3,3 %	3,2 %	5,5 %	3,9 %	3,6 %
gültige Angaben	3.267	1.593	1.676	855	1.668	745	199	1.906	1.074

Tabelle 5.61:

WELLE 2: alk_einstellung4 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Es gibt keinen Grund, warum ein gesunder Mann in Gesellschaft keinen Alkohol trinken sollte.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	56,3 %	55,9 %	56,6 %	48,1 %	60,3 %	56,5 %	46,3 %	55,8 %	58,7 %
stimme eher zu	25,0 %	24,1 %	25,9 %	25,8 %	23,3 %	28,0 %	27,1 %	25,0 %	24,6 %
unentschieden	10,7 %	11,1 %	10,4 %	15,6 %	9,1 %	8,9 %	16,7 %	11,0 %	9,2 %
stimme eher nicht zu	4,6 %	5,5 %	3,7 %	6,2 %	4,3 %	3,4 %	5,9 %	4,7 %	4,5 %
stimme überhaupt nicht zu	3,4 %	3,3 %	3,5 %	4,3 %	3,0 %	3,2 %	3,9 %	3,5 %	3,0 %
gültige Angaben	3.267	1.589	1.678	854	1.667	743	203	1.902	1.073

Tabelle 5.62:

WELLE 2: alk_einstellung5 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich halte ein Werbeverbot für alkoholische Getränke für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	20,7 %	16,9 %	24,3 %	20,7 %	20,6 %	20,8 %	22,3 %	19,6 %	22,8 %
stimme eher zu	23,1 %	20,5 %	25,5 %	20,6 %	23,4 %	25,2 %	18,3 %	22,3 %	25,1 %
unentschieden	27,8 %	28,8 %	26,9 %	30,2 %	26,8 %	27,4 %	32,7 %	28,1 %	25,7 %
stimme eher nicht zu	18,7 %	21,3 %	16,3 %	19,1 %	19,0 %	17,7 %	16,8 %	19,0 %	19,0 %
stimme überhaupt nicht zu	9,7 %	12,5 %	7,0 %	9,4 %	10,2 %	8,9 %	9,9 %	11,0 %	7,5 %
gültige Angaben	3.273	1.595	1.678	859	1.669	745	202	1.907	1.076

Tabelle 5.63:

WELLE 2: alk_einstellung6 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich halte Warnhinweise auf alkoholischen Getränken für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	24,2 %	21,2 %	27,1 %	23,7 %	23,3 %	26,8 %	26,2 %	23,3 %	26,5 %
stimme eher zu	27,5 %	25,6 %	29,3 %	27,9 %	26,0 %	30,4 %	26,7 %	26,2 %	28,7 %
unentschieden	21,5 %	23,2 %	20,0 %	23,3 %	21,4 %	19,8 %	24,8 %	22,4 %	19,2 %
stimme eher nicht zu	17,0 %	16,9 %	17,1 %	16,0 %	17,9 %	16,2 %	13,4 %	17,4 %	17,3 %
stimme überhaupt nicht zu	9,7 %	13,1 %	6,5 %	9,1 %	11,4 %	6,7 %	8,9 %	10,7 %	8,3 %
gültige Angaben	3.267	1.593	1.674	857	1.665	746	202	1.904	1.072

Tabelle 5.64:

WELLE 2: alk_einstellung7 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich halte Steuererhöhungen für alkoholische Getränke für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	19,5 %	16,0 %	22,9 %	20,4 %	18,3 %	21,3 %	20,8 %	18,6 %	21,2 %
stimme eher zu	22,6 %	20,0 %	25,0 %	20,4 %	21,7 %	27,1 %	15,8 %	22,2 %	24,9 %
unentschieden	21,6 %	22,6 %	20,7 %	25,3 %	20,1 %	20,9 %	29,2 %	20,6 %	21,2 %
stimme eher nicht zu	21,8 %	23,1 %	20,5 %	20,2 %	23,2 %	20,2 %	20,8 %	22,3 %	21,3 %
stimme überhaupt nicht zu	14,5 %	18,3 %	10,9 %	13,8 %	16,7 %	10,5 %	13,4 %	16,3 %	11,3 %
gültige Angaben	3.268	1.592	1.675	855	1.668	742	202	1.900	1.075

Tabelle 5.65:

WELLE 2: alk_einstellung8 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich halte Informations- und Aufklärungskampagnen für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	42,2 %	35,8 %	48,1 %	38,5 %	42,3 %	46,0 %	34,8 %	40,3 %	46,9 %
stimme eher zu	34,9 %	35,7 %	34,1 %	32,0 %	35,3 %	37,1 %	30,3 %	34,5 %	36,5 %
unentschieden	15,1 %	18,3 %	12,2 %	19,0 %	14,8 %	11,5 %	22,9 %	16,7 %	10,6 %
stimme eher nicht zu	5,2 %	6,5 %	4,0 %	7,6 %	4,8 %	3,4 %	6,5 %	5,6 %	4,5 %
stimme überhaupt nicht zu	2,6 %	3,7 %	1,6 %	2,9 %	2,8 %	2,0 %	5,5 %	3,0 %	1,6 %
gültige Angaben	3.269	1.590	1.679	857	1.668	746	201	1.903	1.075

Tabelle 5.66:

WELLE 2: alk_einstellung9 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Ich fühle mich zum Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Schwangerschaft ausreichend informiert.*

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	60,5 %	45,3 %	74,9 %	52,0 %	65,5 %	59,1 %	42,0 %	58,3 %	67,6 %
stimme eher zu	19,6 %	25,2 %	14,2 %	22,8 %	19,0 %	17,3 %	21,0 %	19,8 %	19,3 %
unentschieden	13,0 %	18,5 %	7,8 %	15,3 %	10,8 %	15,4 %	23,0 %	14,4 %	8,5 %
stimme eher nicht zu	4,1 %	6,7 %	1,6 %	7,6 %	2,3 %	3,9 %	7,5 %	4,6 %	2,4 %
stimme überhaupt nicht zu	2,8 %	4,2 %	1,4 %	2,3 %	2,3 %	4,3 %	6,5 %	2,9 %	2,1 %
gültige Angaben	3.273	1.593	1.680	857	1.669	746	200	1.906	1.078

Tabelle 5.67:

WELLE 2: alk_einstellung10 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Während einer Schwangerschaft sollten Frauen absolut keinen Alkohol trinken.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	76,9 %	71,5 %	81,9 %	76,3 %	76,7 %	77,8 %	70,5 %	76,8 %	78,3 %
stimme eher zu	13,1 %	15,5 %	10,8 %	8,4 %	15,2 %	13,7 %	9,5 %	13,4 %	13,2 %
unentschieden	6,3 %	8,5 %	4,2 %	10,1 %	5,5 %	3,8 %	12,0 %	6,3 %	5,1 %
stimme eher nicht zu	2,5 %	3,0 %	2,0 %	3,4 %	2,0 %	2,6 %	4,0 %	2,3 %	2,5 %
stimme überhaupt nicht zu	1,3 %	1,4 %	1,1 %	1,7 %	0,7 %	2,2 %	4,0 %	1,2 %	,9 %
gültige Angaben	3.262	1.587	1.677	858	1.663	744	200	1.902	1.072

Tabelle 5.68:

WELLE 2: alk_einstellung11 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Gelegentlich ein Glas Alkohol kann auch während der Schwangerschaft nicht schaden.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	4,1 %	4,1 %	4,2 %	2,8 %	3,5 %	7,0 %	5,9 %	4,2 %	3,7 %
stimme eher zu	8,8 %	9,6 %	8,0 %	5,4 %	8,9 %	12,6 %	6,4 %	9,0 %	8,9 %
unentschieden	12,4 %	15,3 %	9,7 %	12,8 %	11,5 %	14,1 %	18,8 %	13,4 %	9,0 %
stimme eher nicht zu	24,1 %	25,3 %	23,0 %	23,3 %	24,5 %	24,3 %	29,7 %	24,1 %	23,3 %
stimme überhaupt nicht zu	50,5 %	45,7 %	55,1 %	55,7 %	51,6 %	42,1 %	39,1 %	49,3 %	55,1 %
gültige Angaben	3.270	1.592	1.678	858	1.667	746	202	1.902	1.075

Tabelle 5.69:

WELLE 2: alk_einstellung12 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Am Arbeitsplatz sollte auch während der Essenspause ein völliges Alkoholverbot gelten.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	59,9 %	51,2 %	68,3 %	51,7 %	60,9 %	67,4 %	57,5 %	61,5 %	58,4 %
stimme eher zu	18,5 %	21,4 %	15,8 %	20,7 %	18,1 %	16,7 %	17,0 %	17,6 %	19,8 %
unentschieden	11,3 %	13,9 %	8,8 %	15,9 %	11,0 %	6,6 %	12,5 %	11,4 %	11,0 %
stimme eher nicht zu	6,7 %	8,7 %	4,8 %	7,6 %	6,7 %	5,8 %	8,5 %	5,9 %	7,6 %
stimme überhaupt nicht zu	3,6 %	4,8 %	2,3 %	4,1 %	3,4 %	3,5 %	4,5 %	3,6 %	3,2 %
gültige Angaben	3.267	1.590	1.674	858	1.666	742	200	1.900	1.077

Tabelle 5.70:

WELLE 2: alk_einstellung13 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu? Wenn Alkohol deutlich teurer wäre, würde ich für den Privatgebrauch weniger Alkohol kaufen.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	12,0 %	10,4 %	13,6 %	16,2 %	10,9 %	9,8 %	14,9 %	12,5 %	11,0 %
stimme eher zu	16,5 %	17,8 %	15,3 %	21,8 %	14,3 %	15,3 %	13,4 %	16,7 %	17,2 %
unentschieden	28,2 %	29,4 %	27,0 %	31,4 %	26,9 %	27,2 %	39,6 %	28,6 %	24,7 %
stimme eher nicht zu	22,0 %	22,9 %	21,2 %	17,3 %	24,8 %	21,4 %	14,4 %	20,4 %	26,2 %
stimme überhaupt nicht zu	21,2 %	19,6 %	22,8 %	13,3 %	23,1 %	26,3 %	17,8 %	21,7 %	20,8 %
gültige Angaben	3.271	1.594	1.678	859	1.668	744	202	1.905	1.075

Tabelle 5.71:

WELLE 2: alk_einstellung14 Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? Alkohol verursacht für die Gesellschaft mehr Probleme als illegale Drogen.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme vollkommen zu	25,0 %	24,3 %	25,7 %	24,2 %	27,8 %	19,7 %	23,2 %	24,7 %	26,6 %
stimme eher zu	26,0 %	23,3 %	28,6 %	23,5 %	26,8 %	27,4 %	21,2 %	24,2 %	30,2 %
unentschieden	32,0 %	32,7 %	31,3 %	34,5 %	30,5 %	32,2 %	34,5 %	33,2 %	29,3 %
stimme eher nicht zu	10,0 %	10,5 %	9,5 %	10,5 %	8,4 %	12,9 %	13,8 %	10,4 %	8,1 %
stimme überhaupt nicht zu	7,0 %	9,2 %	4,9 %	7,3 %	6,5 %	7,8 %	7,4 %	7,5 %	5,9 %
gültige Angaben	3.273	1.594	1.679	859	1.670	745	203	1.907	1.076

Tabelle 5.72:

WELLE 2: onl1 Haben Sie schon einmal alkoholhaltige Getränke über das Internet gekauft?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	14,1 %	18,3 %	10,1 %	17,5 %	15,2 %	7,7 %	5,5 %	12,5 %	18,7 %
nein	85,9 %	81,7 %	89,9 %	82,5 %	84,8 %	92,3 %	94,5 %	87,5 %	81,3 %
gültige Angaben	3.268	1.592	1.675	858	1.668	742	201	1.903	1.074

6 Schlaf- und Beruhigungsmittel

Tabelle 6.1:

m1 Haben Sie selbst jemals rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	18,0 %	14,5 %	21,4 %	13,7 %	18,5 %	22,7 %	17,9 %	19,0 %	16,6 %
nein	79,5 %	82,7 %	76,5 %	81,8 %	80,1 %	75,2 %	76,4 %	78,8 %	81,7 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	2,4 %	2,8 %	2,1 %	4,5 %	1,4 %	2,1 %	5,7 %	2,2 %	1,7 %
gültige Angaben	5.922	2.887	3.034	1.685	2.932	1.305	530	3.295	1.893

Tabelle 6.2:

m2 In welchem Alter haben zum ersten Mal Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?

	gesamt	männlich	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
mit 10 Jahren oder jünger	,1 %	,1 %	,1 %	,2 %	,0 %	0,0 %	,2 %	,1 %	0,0 %
im Alter von 11 bis 20 Jahren	2,8 %	2,0 %	3,5 %	6,7 %	1,5 %	,8 %	5,8 %	2,9 %	1,9 %
im Alter von 21 bis 30 Jahren	3,8 %	3,0 %	4,6 %	4,7 %	3,9 %	2,0 %	2,5 %	3,9 %	4,3 %
im Alter von 31 bis 40 Jahren	3,8 %	2,9 %	4,6 %	,8 %	5,6 %	3,0 %	2,3 %	3,5 %	4,8 %
im Alter von 41 bis 50 Jahren	3,5 %	2,7 %	4,2 %	0,0 %	4,9 %	4,7 %	2,5 %	4,1 %	2,7 %
im Alter von 51 bis 60 Jahren	1,9 %	1,6 %	2,3 %	0,0 %	1,7 %	5,1 %	1,5 %	2,0 %	1,7 %
im Alter von 61 Jahren oder älter	1,5 %	1,2 %	1,7 %	0,0 %	,1 %	6,5 %	1,2 %	1,9 %	,9 %
noch nie Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen	82,7 %	86,5 %	79,0 %	87,6 %	82,3 %	77,9 %	84,0 %	81,5 %	83,8 %
gültige Angaben	5.695	2.758	2.938	1.648	2.919	1.314	482	3.185	1.845

Tabelle 6.3:

m3 Haben Sie in den letzten 12 Monaten rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	9,3 %	8,1 %	10,4 %	6,8 %	9,3 %	12,5 %	8,9 %	10,1 %	8,3 %
nein	8,8 %	6,3 %	11,2 %	6,6 %	9,3 %	10,4 %	8,9 %	9,1 %	8,4 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	,2 %	,3 %	,2 %	0,6 %	0,1 %	0,2 %	,6 %	,2 %	,2 %
nie im Leben rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen	81,6 %	85,3 %	78,2 %	86,0 %	81,3 %	76,9 %	81,7 %	80,7 %	83,1 %
gültige Angaben	5.768	2.799	2.969	1.603	2.889	1.276	496	3.219	1.861

Tabelle 6.4:

m4 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten durchschnittlich rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmittel eingenommen?

	gesamt	Männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
4-mal wöchentlich oder öfter	3,9 %	3,5 %	4,3 %	2,3 %	3,9 %	6,0 %	5,1 %	4,5 %	2,8 %
2- bis 3-mal wöchentlich	1,0 %	,9 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	1,3 %	1,6 %	1,0 %	,6 %
2- bis 4-mal monatlich	1,9 %	1,9 %	1,8 %	0,9 %	2,1 %	2,6 %	,8 %	2,1 %	1,7 %
1-mal monatlich oder seltener	2,6 %	1,8 %	3,3 %	2,6 %	2,5 %	2,6 %	1,4 %	2,5 %	3,0 %
in den letzten 12 Monaten keine rezeptpflichtigen Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen	8,8 %	6,3 %	11,2 %	6,7 %	9,3 %	10,4 %	8,9 %	9,1 %	8,5 %
nie im Leben rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen	81,9 %	85,6 %	78,4 %	86,6 %	81,5 %	77,1 %	82,2 %	80,8 %	83,4 %
gültige Angaben	5.749	2.787	2.961	1.593	2.883	1.273	493	3.213	1.853

Tabelle 6.5:

m5 Haben Sie in den letzten 30 Tagen rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	6,8 %	6,1 %	7,4 %	3,6 %	6,9 %	10,4 %	6,9 %	7,6 %	5,4 %
nein	2,5 %	2,0 %	2,9 %	2,8 %	2,4 %	2,1 %	2,0 %	2,4 %	2,8 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	,1 %	,1 %	,1 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	,1 %
in den letzten 12 Monaten keine rezeptpflichtigen Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen	8,8 %	6,3 %	11,2 %	6,7 %	9,3 %	10,4 %	8,9 %	9,1 %	8,5 %
nie im Leben rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen	81,9 %	85,6 %	78,3 %	86,6 %	81,4 %	77,0 %	82,2 %	80,8 %	83,3 %
gültige Angaben	5.753	2.790	2.963	1.593	2.886	1.274	493	3.213	1.857

Tabelle 6.6:

m6 Auf welche Weise erhalten Sie diese rezeptpflichtigen Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente?
(Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich bekomme sie von einer Ärztin / einem Arzt verschrieben.	8,5 %	7,3 %	9,6 %	5,1 %	8,6 %	12,4 %	7,9 %	9,4 %	7,2 %
Ich bekomme sie von einer/einem Bekannten bzw. einer Freundin / einem Freund.	,3 %	,4 %	,3 %	,9 %	,2 %	,2 %	,8 %	,3 %	,3 %
Ich bekomme sie von einem Familienmitglied: Eltern, Partner/-in etc.	,4 %	,3 %	,4 %	1,0 %	,1 %	,1 %	,8 %	,2 %	,5 %
Ich kaufe sie ohne Rezept in einer Apotheke	,4 %	,3 %	,5 %	,5 %	,3 %	,5 %	,2 %	,4 %	,5 %
andere Quelle	,1 %	,2 %	,1 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	,2 %	,2 %	,1 %
in den letzten 12 Monaten keine rezeptpflichtigen Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen	8,8 %	6,3 %	11,2 %	6,7 %	9,3 %	10,4 %	8,9 %	9,1 %	8,5 %
nie im Leben rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen	81,9 %	85,6 %	78,4 %	86,6 %	81,4 %	77,0 %	82,2 %	80,8 %	83,3 %
gültige Angaben	5.752	2.790	2.961	1.593	2.884	1.274	493	3.213	1.856

Tabelle 6.7:

m7 Wie (falls überhaupt) hat sich Ihre Einnahme rezeptpflichtiger Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente seit Ausbruch der Corona-Krise verändert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
An meiner Einnahme rezeptpflichtiger Schlaf oder Beruhigungsmedikamente hat sich nichts geändert.	7,6 %	6,8 %	8,4 %	4,4 %	7,5 %	11,9 %	7,3 %	8,3 %	6,6 %
Ich nehme seit Ausbruch der Corona-Krise weniger rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente oder eine geringere Dosis davon ein.	,5 %	,5 %	,5 %	1,0 %	0,3 %	0,2 %	,8 %	,4 %	,5 %
Ich habe seit Ausbruch der Corona-Krise komplett aufgehört, rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente einzunehmen.	,5 %	,4 %	,5 %	0,6 %	0,6 %	0,1 %	,2 %	,4 %	,5 %
Ich nehme seit Ausbruch der Corona-Krise mehr rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente oder eine größere Dosis davon ein.	,5 %	,4 %	,7 %	0,5 %	0,8 %	0,1 %	,2 %	,7 %	,4 %
Ich habe seit Ausbruch der Corona-Krise wieder begonnen, rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente einzunehmen.	,2 %	,0 %	,3 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,0 %	,2 %	,2 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten keine rezeptpflichtigen Schlaf- oder Beruhigungsmittel eingenommen.	8,8 %	6,3 %	11,2 %	6,7 %	9,3 %	10,4 %	9,0 %	9,1 %	8,5 %
Ich habe nie im Leben rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmittel eingenommen.	82,0 %	85,6 %	78,4 %	86,8 %	81,4 %	77,0 %	82,5 %	80,9 %	83,3 %
gültige Angaben	5.745	2.787	2.959	1.589	2.885	1.274	491	3.211	1.856

Tabelle 6.8:

WELLE 2: med_phase1 Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020).

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich	2,6 %	2,3 %	3,0 %	1,1 %	2,8 %	4,0 %	4,6 %	3,1 %	1,8 %
fast täglich (5-6 Tage pro Woche)	,4 %	,4 %	,4 %	0,5 %	0,2 %	0,4 %	0,0 %	,4 %	,4 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage)	,8 %	,6 %	1,0 %	0,6 %	0,5 %	1,3 %	1,0 %	,5 %	1,0 %
1 Tag pro Woche	,6 %	,8 %	,5 %	0,5 %	0,8 %	0,5 %	,5 %	,5 %	,9 %
seltener als 1 Tag pro Woche	2,1 %	1,7 %	2,4 %	2,4 %	1,4 %	3,1 %	1,5 %	2,2 %	2,1 %
gar nicht	2,5 %	2,2 %	2,7 %	2,6 %	2,8 %	1,9 %	3,6 %	2,6 %	2,1 %
seit Anfang 2020 keine Schlaf- oder Beruhigungsmittel eingenommen	91,1 %	92,1 %	90,0 %	92,5 %	91,4 %	88,7 %	88,8 %	90,8 %	91,6 %
gültige Angaben	3.266	1.590	1.676	851	1.669	745	197	1.906	1.074

Tabelle 6.9:

WELLE 2: med_phase2 Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März-Juni 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich	2,9 %	2,5 %	3,3 %	0,9 %	3,1 %	4,7 %	4,6 %	3,3 %	2,0 %
fast täglich (5-6 Tage pro Woche)	,4 %	,3 %	,4 %	0,5 %	0,2 %	0,7 %	0,0 %	,2 %	,7 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage)	1,2 %	,9 %	1,4 %	1,3 %	1,0 %	1,6 %	1,0 %	1,1 %	1,4 %
1 Tag pro Woche	1,0 %	1,1 %	,8 %	1,4 %	0,9 %	0,7 %	1,5 %	1,1 %	,7 %
seltener als 1 Tag pro Woche	2,1 %	1,6 %	2,5 %	2,0 %	1,7 %	2,9 %	,5 %	2,1 %	2,3 %
gar nicht	1,3 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	0,8 %	2,6 %	1,2 %	1,4 %
seit Anfang 2020 keine Schlaf- oder Beruhigungsmittel eingenommen	91,2 %	92,3 %	90,2 %	92,5 %	91,7 %	88,6 %	89,7 %	91,1 %	91,5 %
gültige Angaben	3.261	1.587	1.673	851	1.664	746	195	1.901	1.075

Tabelle 6.10:

WELLE 2: med_phase3 Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli – Anfang September 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich	3,0 %	2,6 %	3,3 %	1,3 %	3,1 %	4,7 %	4,6 %	3,3 %	2,3 %
fast täglich (5-6 Tage pro Woche)	,4 %	,3 %	,5 %	0,2 %	0,3 %	0,8 %	1,5 %	,3 %	,5 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage)	,8 %	,5 %	1,1 %	0,7 %	0,8 %	1,1 %	1,0 %	,6 %	1,0 %
1 Tag pro Woche	1,0 %	1,3 %	,8 %	0,9 %	1,1 %	0,9 %	1,0 %	1,2 %	,8 %
seltener als 1 Tag pro Woche	2,2 %	1,9 %	2,5 %	2,5 %	1,7 %	3,0 %	,5 %	2,2 %	2,6 %
gar nicht	1,3 %	1,1 %	1,6 %	2,0 %	1,3 %	0,7 %	2,0 %	1,5 %	1,0 %
seit Anfang 2020 keine Schlaf- oder Beruhigungstabletten eingenommen	91,2 %	92,3 %	90,2 %	92,4 %	91,7 %	88,8 %	89,3 %	91,0 %	91,7 %
gültige Angaben	3.260	1.588	1.673	852	1.664	744	196	1.903	1.073

Tabelle 6.11:

WELLE 2: med_phase4 Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in Phase 4: Aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich	2,8 %	2,3 %	3,3 %	0,8 %	3,2 %	4,3 %	4,6 %	3,1 %	2,1 %
fast täglich (5-6 Tage pro Woche)	,5 %	,4 %	,6 %	0,9 %	0,2 %	0,7 %	1,0 %	,4 %	,7 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage)	,8 %	,5 %	1,1 %	0,5 %	0,8 %	1,2 %	1,0 %	,5 %	1,1 %
1 Tag pro Woche	,8 %	,9 %	,7 %	0,6 %	0,8 %	0,9 %	,5 %	,7 %	,9 %
seltener als 1 Tag pro Woche	1,8 %	1,4 %	2,1 %	1,8 %	1,3 %	3,0 %	1,0 %	1,9 %	1,7 %
gar nicht	2,3 %	2,4 %	2,1 %	3,2 %	2,3 %	1,2 %	3,0 %	2,6 %	1,8 %
seit Anfang 2020 keine Schlaf- oder Beruhigungstabletten eingenommen	91,0 %	92,1 %	90,0 %	92,3 %	91,4 %	88,7 %	88,8 %	90,7 %	91,7 %
gültige Angaben	3.269	1.591	1.677	853	1.669	745	197	1.908	1.073

Tabelle 6.12:

WELLE 2: bezug_med1_phase1 bis bezug_med7_phase1: Auf welche Weise erhalten Sie rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente? (Phase 1: vor Corona, Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich bekomme sie von einer Ärztin / einem Arzt verschrieben.	5,8 %	5,0 %	6,6 %	3,7 %	5,3 %	8,9 %	7,5 %	6,0 %	5,2 %
Ich bekomme sie von Bekannten oder Freundinnen/Freunden.	,3 %	,4 %	,1 %	,7 %	,1 %	,3 %	1,0 %	,3 %	,2 %
Ich bekomme sie von einem Familienmitglied.	,2 %	,3 %	,1 %	,6 %	,1 %	0,0 %	0,0 %	,3 %	,2 %
Ich kaufe sie ohne Rezept in einer Apotheke.	,7 %	,6 %	,8 %	,9 %	,6 %	,6 %	1,0 %	,5 %	,9 %
keine Einnahme in diesem Zeitraum	2,5 %	2,2 %	2,7 %	2,5 %	2,7 %	1,9 %	3,5 %	2,6 %	2,1 %
seit Anfang 2020 keine Schlaf- oder Beruhigungstabletten eingenommen	90,9 %	92,0 %	89,9 %	92,1 %	91,4 %	88,5 %	87,5 %	90,8 %	91,4 %
gültige Angaben	3.272	1.593	1.679	855	1.671	746	200	1.906	1.076

Tabelle 6.13:

bezug_med1_phase4 bis bezug_med7_phase7: Auf welche Weise erhalten Sie rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente? (Phase 4, in den letzten 4 Wochen)*

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich bekomme sie von einer Ärztin / einem Arzt verschrieben.	5,9 %	4,8 %	6,9 %	3,2 %	5,7 %	9,3 %	6,5 %	6,2 %	5,4 %
Ich bekomme sie von Bekannten oder Freundinnen/Freunden.	,2 %	,4 %	,1 %	,7 %	,1 %	,1 %	0,0 %	,3 %	,3 %
Ich bekomme sie von einem Familienmitglied.	,1 %	,2 %	,1 %	,2 %	,1 %	,1 %	1,0 %	,1 %	,2 %
Ich kaufe sie ohne Rezept in einer Apotheke.	,9 %	,7 %	1,1 %	1,4 %	,7 %	,9 %	2,5 %	,7 %	,9 %
keine Einnahme in diesem Zeitraum	2,3 %	2,4 %	2,1 %	3,1 %	2,2 %	1,3 %	3,0 %	2,6 %	1,8 %
seit Anfang 2020 keine Schlaf- oder Beruhigungstabletten eingenommen	90,9 %	92,0 %	89,9 %	92,0 %	91,5 %	88,5 %	87,1 %	90,8 %	91,4 %
gültige Angaben	3.273	1.593	1.679	858	1.669	746	201	1.906	1.076

7 Cannabis

Tabelle 7.1:

can0 Ist Ihnen die Diskussion über den unterschiedlichen THC-Gehalt bzw. CBD-Gehalt von Cannabis geläufig?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Nein, ich habe noch nie davon gehört.	25,7 %	25,6 %	25,9 %	24,5 %	23,6 %	32,3 %	35,8 %	26,7 %	20,5 %
Ich habe davon gehört, interessiere mich aber nicht dafür.	31,6 %	34,9 %	28,5 %	28,5 %	30,8 %	37,4 %	29,8 %	32,3 %	31,3 %
Ich habe davon schon einmal gehört, kenne aber nicht den Unterschied in der Wirkung.	19,2 %	17,0 %	21,4 %	18,9 %	20,4 %	17,0 %	16,8 %	19,1 %	20,3 %
Ich kenne die Diskussion und kenne auch den Unterschied in der Wirkung von THC bzw. CBD.	23,4 %	22,5 %	24,2 %	28,2 %	25,2 %	13,3 %	17,6 %	22,0 %	27,9 %
gültige Angaben	5.858	2.857	2.999	1.640	2.918	1.299	517	3.267	1.883

Tabelle 7.2:

can1 Haben Sie selbst jemals in Ihrem Leben folgende Cannabisprodukte konsumiert? Ja, ich habe Cannabisprodukte mit THC konsumiert (Haschisch oder Marihuana; Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ja, ich habe Cannabisprodukte mit THC konsumiert: Haschisch oder Marihuana	18,7 %	20,9 %	16,6 %	27,2 %	20,2 %	4,4 %	11,1 %	16,0 %	26,5 %
Ja, ich habe Cannabisprodukte konsumiert, die überwiegend CBD und nur einen minimalen THC-Gehalt beinhalten haben (z. B. in Form von Ölen, Blüten, Tee etc.) .	11,0 %	10,5 %	11,4 %	16,2 %	10,2 %	6,1 %	10,5 %	11,2 %	11,0 %
Ja, ich habe Cannabisprodukte konsumiert, weiß aber nicht, mit welchen Inhaltsstoffen.	5,4 %	5,6 %	5,2 %	8,2 %	5,3 %	2,2 %	4,6 %	4,9 %	6,5 %
Nein, ich habe noch nie in meinem Leben Cannabisprodukte konsumiert.	69,5 %	67,9 %	71,0 %	57,2 %	68,2 %	88,0 %	76,4 %	72,2 %	61,7 %
gültige Angaben	5.849	2.861	2.988	1.641	2.913	1.295	522	3.261	1.879

Tabelle 7.3:

can_thc3 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis (Haschisch oder Marihuana) mit THC konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	5,1 %	5,7 %	4,5 %	11,1 %	3,6 %	0,7 %	5,0 %	4,5 %	6,3 %
nein	13,4 %	14,9 %	12,0 %	15,8 %	16,4 %	3,7 %	5,2 %	11,4 %	20,0 %
noch nie Cannabis mit THC konsumiert	81,5 %	79,4 %	83,5 %	73,1 %	79,9 %	95,6 %	89,7 %	84,2 %	73,7 %
gültige Angaben	5.836	2.852	2.984	1.634	2.908	1.294	517	3.257	1.876

Tabelle 7.4:

can_thc4 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Cannabis (Haschisch oder Marihuana) mit THC konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	2,8 %	3,4 %	2,3 %	6,7 %	1,8 %	0,2 %	3,7 %	2,5 %	3,2 %
nein	2,2 %	2,3 %	2,1 %	4,2 %	1,9 %	0,5 %	1,5 %	1,9 %	3,0 %
in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit THC konsumiert	13,4 %	14,9 %	12,0 %	15,8 %	16,4 %	3,7 %	5,2 %	11,4 %	20,0 %
noch nie Cannabis mit THC konsumiert	81,5 %	79,4 %	83,5 %	73,3 %	79,9 %	95,6 %	89,6 %	84,2 %	73,7 %
gültige Angaben	5.834	2.851	2.983	1.631	2.908	1.294	518	3.256	1.874

Tabelle 7.5:

can_thc6a Haben Sie Cannabis (mit THC) am Vormittag geraucht?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
nie	1,7 %	1,9 %	1,5 %	3,4 %	1,3 %	0,2 %	1,5 %	1,4 %	2,2 %
selten	,7 %	1,1 %	,4 %	2,0 %	0,3 %	0,1 %	1,2 %	,6 %	,9 %
gelegentlich	,3 %	,3 %	,4 %	1,1 %	0,1 %	0,0 %	,8 %	,4 %	,2 %
oft	,1 %	,1 %	,1 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,1 %	,1 %
in den letzten 30 Tagen kein Cannabis mit THC konsumiert	2,2 %	2,3 %	2,1 %	4,2 %	1,9 %	0,5 %	1,5 %	1,9 %	3,0 %
in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit THC konsumiert	13,4 %	14,9 %	12,0 %	15,8 %	16,4 %	3,7 %	5,2 %	11,4 %	20,0 %
noch nie Cannabis mit THC konsumiert	81,5 %	79,4 %	83,5 %	73,2 %	80,0 %	95,5 %	89,6 %	84,2 %	73,7 %
gültige Angaben	5.833	2.850	2.983	1.632	2.906	1.295	518	3.256	1.875

Tabelle 7.6:

can_thc6b Haben Sie Cannabis (mit THC) geraucht, als Sie allein waren?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
nie	1,1 %	1,2 %	1,0 %	2,8 %	0,6 %	0,2 %	1,0 %	,9 %	1,5 %
selten	,5 %	,6 %	,3 %	1,3 %	0,2 %	0,1 %	1,2 %	,3 %	,6 %
gelegentlich	,7 %	,9 %	,6 %	1,5 %	0,6 %	0,0 %	1,4 %	,6 %	,7 %
oft	,5 %	,6 %	,4 %	1,2 %	0,4 %	0,0 %	,2 %	,7 %	,4 %
in den letzten 30 Tagen kein Cannabis mit THC konsumiert	2,2 %	2,3 %	2,1 %	4,2 %	1,9 %	0,5 %	1,5 %	1,9 %	3,0 %
in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit THC konsumiert	13,4 %	14,9 %	12,0 %	15,8 %	16,4 %	3,7 %	5,2 %	11,4 %	20,0 %
noch nie Cannabis mit THC konsumiert	81,5 %	79,4 %	83,5 %	73,2 %	79,9 %	95,6 %	89,6 %	84,2 %	73,7 %
gültige Angaben	5.834	2.850	2.983	1.632	2.908	1.294	518	3.257	1.874

Tabelle 7.7:

can_thc6c Hatten Sie Gedächtnisprobleme, als Sie Cannabis (mit THC) geraucht haben?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
nie	1,7 %	2,0 %	1,3 %	3,8 %	1,1 %	0,2 %	2,3 %	1,4 %	2,0 %
selten	,7 %	,8 %	,5 %	1,5 %	0,4 %	0,1 %	,6 %	,7 %	,7 %
gelegentlich	,3 %	,4 %	,2 %	0,8 %	0,2 %	0,0 %	,2 %	,4 %	,3 %
oft	,2 %	,1 %	,2 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,1 %	,3 %
in den letzten 30 Tagen kein Cannabis mit THC konsumiert	2,2 %	2,3 %	2,1 %	4,2 %	1,9 %	0,5 %	1,5 %	1,9 %	3,0 %
in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit THC konsumiert	13,4 %	14,9 %	12,0 %	15,8 %	16,4 %	3,7 %	5,2 %	11,4 %	20,0 %
noch nie Cannabis mit THC konsumiert	81,5 %	79,4 %	83,5 %	73,3 %	79,9 %	95,5 %	89,7 %	84,2 %	73,7 %
gültige Angaben	5.834	2.851	2.984	1.631	2.909	1.295	517	3.257	1.874

Tabelle 7.8:

can_thc6d Haben Freundinnen/Freunde oder Mitglieder Ihrer Familie Ihnen geraten, Ihren Cannabiskonsum (mit THC) zu reduzieren oder damit aufzuhören?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
nie	2,1 %	2,3 %	1,9 %	4,9 %	1,4 %	0,2 %	2,9 %	1,8 %	2,5 %
selten	,3 %	,4 %	,2 %	0,7 %	0,1 %	0,0 %	,2 %	,2 %	,2 %
gelegentlich	,2 %	,3 %	,1 %	0,6 %	0,1 %	0,0 %	,2 %	,2 %	,2 %
oft	,1 %	,2 %	,1 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,2 %	,1 %
in den letzten 30 Tagen kein Cannabis mit THC konsumiert	2,2 %	2,3 %	2,1 %	4,2 %	1,9 %	0,5 %	1,5 %	1,9 %	3,0 %
in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit THC konsumiert	13,5 %	15,0 %	12,0 %	15,8 %	16,5 %	3,7 %	5,2 %	11,4 %	20,1 %
noch nie Cannabis mit THC konsumiert	81,6 %	79,6 %	83,5 %	73,3 %	80,0 %	95,7 %	89,7 %	84,2 %	73,9 %
gültige Angaben	5.827	2.845	2.984	1.630	2.904	1.293	517	3.254	1.870

Tabelle 7.9:

can_thc6e Haben Sie erfolglos versucht, Ihren Cannabiskonsum mit THC zu reduzieren oder damit aufzuhören?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
nie	2,3 %	2,7 %	2,0 %	5,4 %	1,5 %	0,2 %	2,7 %	2,0 %	2,7 %
selten	,2 %	,4 %	,1 %	0,5 %	0,2 %	0,0 %	,2 %	,2 %	,3 %
gelegentlich	,2 %	,2 %	,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	,8 %	,2 %	,1 %
oft	,1 %	,0 %	,1 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	,2 %
in den letzten 30 Tagen kein Cannabis mit THC konsumiert	2,2 %	2,3 %	2,1 %	4,2 %	1,9 %	0,5 %	1,5 %	1,9 %	3,0 %
in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit THC konsumiert	13,4 %	15,0 %	12,0 %	15,8 %	16,4 %	3,7 %	5,2 %	11,4 %	20,0 %
noch nie Cannabis mit THC konsumiert	81,5 %	79,5 %	83,5 %	73,3 %	79,9 %	95,6 %	89,6 %	84,2 %	73,7 %
gültige Angaben	5.833	2.849	2.984	1.631	2.907	1.294	518	3.254	1.875

Tabelle 7.10:

can_thc6f Hatten Sie Probleme wegen Ihres Cannabiskonsums (mit THC), wie z. B. Streit, Raufereien, Unfälle, Probleme in der Arbeit bzw. Ausbildung?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
nie	2,6 %	3,0 %	2,2 %	6,1 %	1,7 %	0,2 %	3,3 %	2,2 %	3,1 %
selten	,1 %	,2 %	,1 %	0,4 %	0,1 %	0,0 %	,2 %	,2 %	,1 %
gelegentlich	,1 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %
oft	,0 %	,0 %	,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,0 %	,1 %
in den letzten 30 Tagen kein Cannabis mit THC konsumiert	2,2 %	2,3 %	2,1 %	4,2 %	1,9 %	0,5 %	1,5 %	1,9 %	3,0 %
in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit THC konsumiert	13,4 %	14,9 %	12,0 %	15,8 %	16,4 %	3,7 %	5,2 %	11,4 %	20,0 %
noch nie Cannabis mit THC konsumiert	81,5 %	79,4 %	83,5 %	73,3 %	79,9 %	95,6 %	89,6 %	84,2 %	73,7 %
gültige Angaben	5.834	2.850	2.984	1.630	2.909	1.294	518	3.257	1.875

Tabelle 7.11:

can_thc7 Wie (falls überhaupt) hat sich Ihr Cannabiskonsumverhalten (mit THC) seit Ausbruch der Corona-Krise verändert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
An meinem Konsum von Cannabis mit THC hat sich seit Ausbruch der Corona-Krise nichts geändert.	3,3 %	3,9 %	2,7 %	7,1 %	2,5 %	0,4 %	2,7 %	3,0 %	4,3 %
Ich nehme seit Ausbruch der Corona-Krise weniger Cannabis mit THC oder eine geringere Dosis davon ein.	,5 %	,6 %	,4 %	1,4 %	0,3 %	0,0 %	1,2 %	,6 %	,3 %
Ich habe seit Ausbruch der Corona-Krise komplett aufgehört, Cannabis mit THC zu nehmen.	,5 %	,4 %	,5 %	0,7 %	0,4 %	0,3 %	0,0 %	,3 %	,9 %
Ich nehme seit Ausbruch der Corona-Krise mehr Cannabis mit THC oder eine größere Dosis davon ein.	,5 %	,6 %	,5 %	1,3 %	0,3 %	0,0 %	,4 %	,4 %	,7 %
Ich habe seit Ausbruch der Corona-Krise wieder begonnen, Cannabis mit THC zu nehmen.	,2 %	,1 %	,3 %	0,4 %	0,2 %	0,0 %	,6 %	,2 %	,2 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit THC konsumiert.	13,4 %	14,9 %	12,0 %	15,8 %	16,4 %	3,7 %	5,2 %	11,4 %	20,0 %
Ich habe noch nie Cannabis mit THC konsumiert.	81,5 %	79,4 %	83,5 %	73,2 %	79,9 %	95,6 %	89,9 %	84,2 %	73,7 %
gültige Angaben	5.833	2.850	2.983	1.632	2.907	1.294	516	3.256	1.876

Tabelle 7.12:

can_thc7a Welche Gründe sind Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für die Veränderung Ihres Cannabiskonsums (mit THC)? Ich konsumiere jetzt weniger oder kein Cannabis ...

(Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
... weil ich nur eingeschränkten Zugang zu Cannabis habe.	,5 %	,6 %	,4 %	1,1 %	,3 %	,3 %	,8 %	,4 %	,6 %
... weil ich derzeit weniger Geld zur Verfügung habe.	,2 %	,1 %	,3 %	0,5 %	0,1 %	0,0 %	,4 %	,1 %	,2 %
... aus Angst, dadurch eine größere Anfälligkeit zu haben, an Corona zu erkranken.	,1 %	,1 %	,0 %	,2 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	0,0 %	,1 %
... weil ich weniger oft von Personen außer Haus „in Versuchung gebracht“ werde.	,3 %	,3 %	,4 %	,9 %	,1 %	,1 %	0,0 %	,3 %	,4 %
...weil ich in erster Linie in Gesellschaft beim Weggehen konsumiere.	,4 %	,5 %	,4 %	1,2 %	0,3 %	0,0 %	,4 %	,3 %	,7 %
... weil ich generell zu Hause kein Cannabis konsumiere.	,2 %	,3 %	,2 %	,5 %	,1 %	,1 %	0,0 %	,2 %	,3 %
Ich konsumiere aus einem anderen Grund jetzt weniger Cannabis.	,1 %	,1 %	,1 %	,3 %	,1 %	0,0 %	,2 %	,1 %	,2 %
Steigerung des Konsums	,7 %	,7 %	,7 %	1,8 %	0,5 %	0,0 %	1,0 %	,6 %	,9 %
keine Veränderung des Konsumverhaltens	,0 %	0,0 %	,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,0 %	0,0 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit THC konsumiert.	13,9 %	15,5 %	12,3 %	17,0 %	16,9 %	3,7 %	5,4 %	11,7 %	20,9 %
Ich habe noch nie Cannabis mit THC konsumiert	84,3 %	82,6 %	85,9 %	78,7 %	82,0 %	96,0 %	92,2 %	86,7 %	76,9 %
gültige Angaben	5.643	2.741	2.901	1.519	2.835	1.289	503	3.160	1.798

Tabelle 7.13:

can_thc7b Welche Gründe sind Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für die Veränderung Ihres Cannabiskonsums (mit THC)? Ich konsumiere jetzt mehr Cannabis, ...
(Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
... weil ich derzeit viel Stress habe bzw. stark belastet bin.	,2 %	,2 %	,2 %	,7 %	,1 %	0,0 %	,2 %	,3 %	,2 %
... weil ich jetzt mehr Freizeit bzw. weniger zu tun habe.	,5 %	,4 %	,5 %	1,1 %	,4 %	0,0 %	,6 %	,4 %	,6 %
... weil es zu Hause oft einen Anlass gibt, Cannabis zu konsumieren.	,2 %	,2 %	,1 %	,5 %	,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	,3 %
Ich konsumiere jetzt aus einem anderen Grund mehr Cannabis.	,1 %	,1 %	,2 %	,2 %	,1 %	0,0 %	,4 %	,1 %	,1 %
Reduktion des Konsums	1,0 %	1,0 %	1,0 %	2,2 %	0,6 %	0,3 %	1,2 %	,9 %	1,2 %
keine Veränderung des Konsumverhaltens	,1 %	,1 %	,1 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,1 %	,2 %
Ich habe in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit THC konsumiert.	13,9 %	15,5 %	12,3 %	17,0 %	16,9 %	3,7 %	5,4 %	11,7 %	20,9 %
Ich habe noch nie Cannabis mit THC konsumiert	84,3 %	82,6 %	85,9 %	78,7 %	82,0 %	96,0 %	92,2 %	86,7 %	76,9 %
gültige Angaben	5.642	2.742	2.902	1.519	2.834	1.289	503	3.161	1.798

Tabelle 7.14:

can_cbd2 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabisprodukte konsumiert, die ausschließlich CBD und kein (oder nur sehr geringe Anteile von) THC enthalten?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	7,1 %	6,5 %	7,7 %	8,8 %	7,3 %	4,7 %	4,8 %	7,5 %	7,4 %
nein	3,4 %	3,4 %	3,3 %	6,1 %	2,7 %	1,3 %	4,6 %	3,3 %	3,2 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	,4 %	,5 %	,3 %	1,0 %	0,2 %	0,1 %	,6 %	,3 %	,4 %
noch nie Cannabis mit CBD konsumiert	89,1 %	89,6 %	88,7 %	84,1 %	89,8 %	93,9 %	90,0 %	88,9 %	89,0 %
gültige Angaben	5.843	2.857	2.985	1.634	2.913	1.295	520	3.257	1.878

Tabelle 7.15:

can_cbd3 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Cannabisprodukte konsumiert, die ausschließlich CBD und kein (oder nur sehr geringe Anteile von) THC enthalten?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	4,0 %	3,7 %	4,4 %	4,4 %	4,1 %	3,3 %	2,5 %	4,1 %	4,6 %
nein	3,0 %	2,6 %	3,3 %	4,1 %	3,1 %	1,4 %	2,1 %	3,2 %	2,8 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	,1 %	,2 %	,0 %	0,4 %	0,1 %	0,0 %	,2 %	,2 %	0,0 %
in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit CBD konsumiert	3,4 %	3,4 %	3,3 %	6,2 %	2,7 %	1,3 %	4,6 %	3,3 %	3,2 %
noch nie Cannabis mit CBD konsumiert	89,5 %	90,0 %	89,0 %	85,0 %	90,0 %	94,0 %	90,5 %	89,2 %	89,3 %
gültige Angaben	5.820	2.844	2.976	1.618	2.907	1.294	517	3.245	1.872

Tabelle 7.16:

can_cbd4a bis can_cbd4e In welcher Form haben Sie Cannabisprodukte konsumiert, die ausschließlich CBD und kein (oder nur sehr geringe Anteile von) THC enthalten?

(Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in Form von Hanfblüten	2,6 %	3,4 %	1,9 %	5,8 %	1,9 %	0,4 %	2,5 %	2,6 %	2,7 %
in Form von CBD-Öl	6,3 %	5,2 %	7,4 %	7,1 %	6,7 %	4,4 %	4,1 %	7,2 %	5,6 %
in Form von Hanftee	3,5 %	3,6 %	3,5 %	5,7 %	3,1 %	1,9 %	3,7 %	3,4 %	3,8 %
in Form von CBD-Kristallen	,3 %	,4 %	,2 %	,9 %	,1 %	0,0 %	1,0 %	,2 %	,2 %
andere Verwendungsform	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,9 %	,9 %	,4 %	1,6 %	1,0 %	,9 %
in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit CBD konsumiert	1,5 %	1,6 %	1,4 %	2,9 %	1,3 %	0,2 %	1,0 %	1,7 %	1,4 %
noch nie Cannabis mit CBD konsumiert	92,6 %	92,9 %	92,2 %	89,6 %	93,1 %	95,0 %	92,5 %	92,4 %	92,8 %
gültige Angaben	5.626	2.756	2.871	1.534	2.811	1.280	506	3.134	1.802

Tabelle 7.17:

can_cbd6 Wie (falls überhaupt) hat sich Ihr Konsumverhalten bei Cannabisprodukten, die ausschließlich CBD (oder nur sehr geringe Anteile von) THC enthalten, seit Ausbruch der Corona-Krise verändert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
An meinem Konsum von Cannabis mit CBD hat sich seit Ausbruch der Corona-Krise nichts geändert.	8,0 %	7,3 %	8,8 %	10,7 %	8,0 %	4,7 %	5,4 %	8,1 %	8,7 %
Ich nehme seit Ausbruch der Corona-Krise weniger oder eine geringere Dosis von Cannabis mit CBD ein.	,7 %	,9 %	,5 %	1,9 %	0,2 %	0,2 %	1,9 %	,6 %	,5 %
Ich habe seit Ausbruch der Corona-Krise komplett aufgehört, Cannabis mit CBD einzunehmen.	1,0 %	1,2 %	,9 %	1,4 %	0,9 %	0,8 %	1,6 %	1,2 %	,6 %
Ich nehme seit Ausbruch der Corona-Krise mehr Cannabis mit CBD oder eine größere Dosis davon ein.	,1 %	,1 %	,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %
Ich habe seit Ausbruch der Corona-Krise wieder begonnen, Cannabis mit CBD einzunehmen.	,1 %	,0 %	,1 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,0 %	0,0 %
Ich habe noch nie Cannabis mit CBD konsumiert	90,1 %	90,6 %	89,7 %	85,7 %	90,8 %	94,3 %	90,9 %	89,9 %	90,1 %
gültige Angaben	5.779	2.827	2.952	1.605	2.882	1.289	515	3.221	1.855

Tabelle 7.18:

can_unb3 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Cannabis mit unbekanntem Inhalt konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	,7 %	,6 %	,9 %	1,5 %	0,5 %	0,4 %	,6 %	,6 %	1,2 %
nein	4,5 %	4,8 %	4,2 %	6,3 %	4,8 %	1,7 %	3,8 %	4,2 %	5,3 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	,1 %	,1 %	,1 %	0,2 %	0,0 %	0,1 %	,2 %	,1 %	0,0 %
noch nie im Leben Cannabis mit unbekanntem Inhalt konsumiert	94,7 %	94,5 %	94,8 %	92,0 %	94,7 %	97,8 %	95,4 %	95,1 %	93,5 %
gültige Angaben	5.846	2.857	2.988	1.638	2.914	1.295	522	3.261	1.878

Tabelle 7.19:

can_unb4 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Cannabis mit unbekanntem Inhalt konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	,2 %	,2 %	,2 %	0,5 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	,2 %	,2 %
nein	,5 %	,4 %	,6 %	0,9 %	0,4 %	0,3 %	,6 %	,3 %	1,0 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	,0 %	,0 %	,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,0 %	0,0 %
in den letzten 12 Monaten kein Cannabis mit unbekanntem Inhalt konsumiert	4,5 %	4,8 %	4,2 %	6,4 %	4,8 %	1,7 %	3,8 %	4,2 %	5,3 %
noch nie im Leben Cannabis mit unbekanntem Inhalt konsumiert	94,7 %	94,5 %	94,9 %	92,2 %	94,7 %	97,9 %	95,4 %	95,3 %	93,5 %
gültige Angaben	5.842	2.856	2.986	1.635	2.913	1.294	522	3.256	1.878

Tabelle 7.20:

WELLE 2: canthc_phase1 Konsum von THC-haltigem Cannabis in Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich THC-Cannabis konsumiert	,4 %	,6 %	,2 %	0,6 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,4 %
fast täglich THC-Cannabis konsumiert (5-6 Tage pro Woche)	,5 %	,6 %	,4 %	1,2 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	,5 %	,6 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) THC-Cannabis konsumiert	,3 %	,4 %	,2 %	0,5 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,3 %
1 Tag pro Woche THC-Cannabis konsumiert	,4 %	,6 %	,2 %	0,8 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,5 %	,4 %
seltener als 1 Tag pro Woche THC-Cannabis konsumiert	2,1 %	2,7 %	1,4 %	4,9 %	1,4 %	0,3 %	2,0 %	1,6 %	3,1 %
gar kein THC-Cannabis konsumiert	1,0 %	,9 %	1,2 %	2,0 %	0,8 %	0,5 %	1,0 %	,6 %	1,8 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis konsumiert	95,4 %	94,3 %	96,4 %	90,0 %	96,3 %	99,2 %	97,0 %	96,1 %	93,6 %
gültige Angaben	3.267	1.590	1.677	854	1.666	747	199	1.905	1.075

Tabelle 7.21:

WELLE 2: canthc_phase2 Konsum von THC-haltigem Cannabis in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März–Juni 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich THC-Cannabis konsumiert	,4 %	,6 %	,2 %	0,8 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,6 %
fast täglich THC-Cannabis konsumiert (5-6 Tage pro Woche)	,6 %	,7 %	,4 %	1,3 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,7 %	,5 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) THC-Cannabis konsumiert	,5 %	,7 %	,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,3 %	,9 %
1 Tag pro Woche THC-Cannabis konsumiert	,5 %	,5 %	,4 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,5 %	,5 %
seltener als 1 Tag pro Woche THC-Cannabis konsumiert	1,4 %	1,8 %	1,1 %	2,9 %	1,3 %	0,1 %	1,0 %	1,1 %	2,2 %
gar kein THC-Cannabis konsumiert	1,3 %	1,4 %	1,2 %	3,0 %	0,7 %	0,5 %	2,0 %	,8 %	1,9 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis konsumiert	95,4 %	94,3 %	96,4 %	90,0 %	96,3 %	99,3 %	97,0 %	96,2 %	93,4 %
gültige Angaben	3.267	1.590	1.678	854	1.666	746	199	1.904	1.077

Tabelle 7.22:

WELLE 2: canthc_phase3 Konsum von THC-haltigem Cannabis in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli – Anfang September 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich THC-Cannabis konsumiert	,3 %	,5 %	,1 %	0,5 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,3 %
fast täglich THC-Cannabis konsumiert (5-6 Tage pro Woche)	,2 %	,2 %	,3 %	0,4 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,1 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) THC-Cannabis konsumiert	,6 %	,7 %	,4 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	,3 %	1,0 %
1 Tag pro Woche THC-Cannabis konsumiert	,6 %	1,1 %	,2 %	1,4 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	,8 %	,6 %
seltener als 1 Tag pro Woche THC-Cannabis konsumiert	1,6 %	1,9 %	1,2 %	3,3 %	1,3 %	0,1 %	1,5 %	1,0 %	2,8 %
gar kein THC-Cannabis konsumiert	1,3 %	1,3 %	1,4 %	3,2 %	0,7 %	0,7 %	1,5 %	1,1 %	1,9 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis konsumiert	95,3 %	94,2 %	96,4 %	90,3 %	96,3 %	99,2 %	97,0 %	96,1 %	93,4 %
gültige Angaben	3.268	1.591	1.677	852	1.666	747	199	1.906	1.077

Tabelle 7.23:

WELLE 2: canthc_phase4 Konsum von THC-haltigem Cannabis in Phase 4: Aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich THC-Cannabis konsumiert	,3 %	,5 %	,2 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,3 %	,5 %
fast täglich THC-Cannabis konsumiert (5-6 Tage pro Woche)	,3 %	,3 %	,3 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,1 %
mehrmals pro Woche (1-4 Tage) THC-Cannabis konsumiert	,4 %	,6 %	,2 %	0,8 %	0,4 %	0,1 %	0,0 %	,4 %	,5 %
1 Tag pro Woche THC-Cannabis konsumiert	,6 %	,8 %	,3 %	0,9 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	,5 %	,7 %
seltener als 1 Tag pro Woche THC-Cannabis konsumiert	1,6 %	2,1 %	1,0 %	3,5 %	1,1 %	0,3 %	1,5 %	1,2 %	2,2 %
gar kein THC-Cannabis konsumiert	1,5 %	1,4 %	1,6 %	4,0 %	0,7 %	0,3 %	1,0 %	1,1 %	2,4 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis konsumiert	95,4 %	94,3 %	96,4 %	90,0 %	96,3 %	99,3 %	97,5 %	96,1 %	93,6 %
gültige Angaben	3266	1589	1678	854	1.666	746	198	1906	1075

Tabelle 7.24:

WELLE 2: canthc_verfügbarkeit Welche Auswirkungen hatte der Lockdown (März-Juni 2020) auf die Verfügbarkeit von THC-Cannabis für Sie?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Es war für mich während des Lockdowns deutlich schwieriger, THC-Cannabis zu bekommen.	,9 %	1,3 %	,6 %	2,1 %	0,7 %	0,1 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %
Der Lockdown hatte für mich keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von THC-Cannabis.	2,5 %	3,3 %	1,8 %	5,5 %	2,1 %	0,1 %	2,0 %	2,2 %	3,4 %
Es war für mich während des Lockdowns deutlich leichter, THC-Cannabis zu bekommen.	,2 %	,3 %	,1 %	0,4 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	,3 %
kein Cannabiskonsum in dem Zeitraum	1,0 %	,9 %	1,2 %	2,0 %	0,8 %	0,5 %	1,0 %	,6 %	1,8 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis konsumiert	95,3 %	94,3 %	96,4 %	90,0 %	96,3 %	99,2 %	97,0 %	96,1 %	93,5 %
gültige Angaben	3.268	1.590	1.678	854	1.666	747	199	1.905	1.076

Tabelle 7.25:

WELLE 2: canthc_online_phase1 Nutzen Sie auch das Internet (z. B. Kryptomärkte im Darknet), um THC-Cannabis zu kaufen? Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	,3 %	,5 %	,2 %	1,1 %	0,1 %	0,0 %	1,0 %	,5 %	0,0 %
nein	4,5 %	5,5 %	3,6 %	9,1 %	3,8 %	0,8 %	3,9 %	3,4 %	6,7 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis konsumiert	95,1 %	94,0 %	96,3 %	89,8 %	96,1 %	99,2 %	95,1 %	96,1 %	93,3 %
gültige Angaben	3.275	1.594	1.680	856	1.671	747	203	1.905	1.078

Tabelle 7.26:

WELLE 2: canthc_online_phase2 Nutzen Sie auch das Internet (z. B. Kryptomärkte im Darknet), um THC-Cannabis zu kaufen? Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März-Juni 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	,4 %	,6 %	,2 %	1,2 %	0,1 %	0,0 %	1,0 %	,5 %	0,0 %
nein	4,6 %	5,6 %	3,6 %	9,3 %	3,8 %	0,8 %	3,9 %	3,6 %	6,7 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis geraucht	95,1 %	93,9 %	96,3 %	89,5 %	96,1 %	99,2 %	95,1 %	95,9 %	93,3 %
gültige Angaben	3.278	1.597	1.680	859	1.671	747	203	1.909	1.078

Tabelle 7.27:

WELLE 2: canthc_online_phase3 Nutzen Sie auch das Internet (z. B. Kryptomärkte im Darknet), um THC-Cannabis zu kaufen? Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli – Anfang September 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	,2 %	,4 %	,1 %	0,7 %	0,1 %	0,0 %	1,0 %	,3 %	0,0 %
nein	4,6 %	5,4 %	3,7 %	9,4 %	3,8 %	0,8 %	3,0 %	3,6 %	6,5 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis konsumiert	95,2 %	94,2 %	96,2 %	89,9 %	96,2 %	99,2 %	96,0 %	96,1 %	93,5 %
gültige Angaben	3.272	1.591	1.681	855	1.669	747	201	1.905	1.076

Tabelle 7.28:

WELLE 2: canthc_online_phase4 Nutzen Sie auch das Internet (z. B. Kryptomärkte im Darknet), um THC-Cannabis zu kaufen? Phase 4: In den letzten 4 Wochen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	,2 %	,3 %	,1 %	0,6 %	0,1 %	0,0 %	1,0 %	,2 %	0,0 %
nein	4,6 %	5,6 %	3,7 %	9,6 %	3,9 %	0,8 %	3,9 %	3,7 %	6,7 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis konsumiert	95,2 %	94,1 %	96,2 %	89,8 %	96,1 %	99,2 %	95,1 %	96,1 %	93,3 %
gültige Angaben	3.274	1.593	1.681	856	1.671	747	203	1.905	1.078

Tabelle 7.29:

WELLE 2: canthc_problem1 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Haben Sie THC-Cannabis am Vormittag geraucht?*

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
oft	,2 %	,3 %	,1 %	0,5 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,3 %	0,0 %
gelegentlich	,3 %	,4 %	,2 %	0,5 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,4 %
selten	,3 %	,6 %	,1 %	1,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,7 %
nie	2,2 %	2,9 %	1,6 %	4,0 %	2,2 %	0,4 %	1,5 %	2,0 %	3,0 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis geraucht	96,9 %	95,8 %	98,0 %	94,0 %	97,2 %	99,6 %	98,5 %	97,2 %	96,0 %
gültige Angaben	3.215	1.565	1.650	818	1.652	744	196	1.884	1.048

Tabelle 7.30:

WELLE 2: canthc_problem2 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Haben Sie THC-Cannabis geraucht, als Sie allein waren?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
oft	,6 %	,7 %	,4 %	0,7 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	,5 %	,9 %
gelegentlich	,5 %	,8 %	,4 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	,6 %	,5 %
selten	,7 %	1,0 %	,2 %	1,6 %	0,4 %	0,0 %	1,0 %	,7 %	,5 %
nie	1,3 %	1,7 %	1,0 %	2,6 %	1,1 %	0,4 %	,5 %	,9 %	2,3 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis geraucht	96,9 %	95,8 %	98,0 %	94,0 %	97,1 %	99,6 %	98,5 %	97,2 %	95,9 %
gültige Angaben	3.215	1.564	1.650	818	1.653	744	196	1.884	1.049

Tabelle 7.31:

WELLE 2: canthc_problem3 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Hatten Sie Gedächtnisprobleme, als Sie THC-Cannabis geraucht haben?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
oft	,1 %	0,0 %	,1 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %
gelegentlich	,6 %	,6 %	,6 %	1,6 %	0,4 %	0,0 %	,5 %	,6 %	,7 %
selten	,5 %	1,1 %	,1 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	,3 %	1,0 %
nie	1,9 %	2,5 %	1,2 %	3,1 %	1,9 %	0,4 %	1,0 %	1,8 %	2,3 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis geraucht	96,9 %	95,8 %	98,0 %	94,0 %	97,2 %	99,6 %	98,5 %	97,2 %	96,0 %
gültige Angaben	3.215	1.565	1.650	818	1.652	744	196	1.884	1.048

Tabelle 7.32:

WELLE 2: canthc_problem4 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Haben Freundinnen/Freunde oder Mitglieder Ihrer Familie Ihnen geraten, Ihren THC-Cannabiskonsum zu reduzieren oder ganz aufzuhören?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
oft	,2 %	,3 %	,1 %	0,6 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	,3 %	,1 %
gelegentlich	,3 %	,4 %	,2 %	0,9 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,1 %
selten	,3 %	,4 %	,2 %	0,2 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,2 %
nie	2,2 %	2,9 %	1,6 %	4,3 %	2,1 %	0,3 %	1,5 %	1,7 %	3,4 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis geraucht	97,0 %	95,9 %	98,0 %	94,0 %	97,3 %	99,6 %	98,5 %	97,2 %	96,2 %
gültige Angaben	3.213	1.563	1.650	818	1.650	744	196	1.884	1.046

Tabelle 7.33:

WELLE 2: canthc_problem5 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Haben Sie erfolglos versucht, Ihren THC-Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
oft	,1 %	,1 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	,1 %
gelegentlich	,2 %	,2 %	,2 %	0,6 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,3 %	,1 %
selten	,4 %	,6 %	,2 %	0,9 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	,5 %	,4 %
nie	2,4 %	3,3 %	1,5 %	4,3 %	2,3 %	0,4 %	1,5 %	1,9 %	3,4 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis geraucht	97,0 %	95,9 %	98,0 %	94,2 %	97,2 %	99,6 %	98,5 %	97,2 %	96,0 %
gültige Angaben	3.213	1.563	1.650	816	1.651	744	196	1.883	1.048

Tabelle 7.34:

WELLE 2: canthc_problem6 Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Hatten Sie Probleme wegen Ihres THC-Cannabiskonsums wie z. B. Streit, Raufereien, Unfälle, Probleme in der Arbeit bzw. Ausbildung?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
oft	,0 %	,0 %	,0 %	,0 %	,0 %	,0 %	,0 %	,0 %	,0 %
gelegentlich	,2 %	,3 %	,1 %	0,6 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,3 %	,1 %
selten	,2 %	,3 %	,1 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,2 %
nie	2,7 %	3,7 %	1,8 %	5,0 %	2,6 %	0,4 %	1,5 %	2,3 %	3,8 %
seit Anfang 2020 kein THC-Cannabis geraucht	97,0 %	95,8 %	98,0 %	94,1 %	97,2 %	99,6 %	98,5 %	97,2 %	95,9 %
gültige Angaben	3.214	1.565	1.650	817	1.652	744	196	1.883	1.049

Tabelle 7.35:

WELLE 2: canthc_reg1 Wie stehen Sie zur medizinischen Abgabe von THC-Cannabis an Menschen mit Krankheiten, bei denen Cannabis eine Verbesserung der gesundheitlichen Situation bewirken kann?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
THC-Cannabis sollte als Medikament verschreibbar sein.	70,4 %	67,5 %	73,2 %	68,1 %	74,9 %	62,9 %	55,4 %	69,8 %	74,5 %
THC-Cannabis sollte als Medikament nicht verschreibbar sein.	5,7 %	7,5 %	3,9 %	8,7 %	5,2 %	3,1 %	9,4 %	5,5 %	5,2 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	23,9 %	25,0 %	22,9 %	23,1 %	19,9 %	34,0 %	35,1 %	24,6 %	20,3 %
gültige Angaben	3.273	1.595	1.678	860	1.670	744	202	1.907	1.076

Tabelle 7.36:

WELLE 2: canthc_reg2 Wie stehen Sie zur gesetzlichen Regelung von THC-Cannabis im Allgemeinen (abgesehen von der medizinischen Abgabe)?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Wer THC-Cannabis konsumiert, sollte strafrechtlich streng bestraft werden.	9,6 %	11,4 %	7,9 %	9,7 %	10,9 %	6,2 %	10,2 %	9,4 %	9,4 %
Wer THC-Cannabis konsumiert, sollte verwaltungsrechtlich moderat bestraft werden.	12,4 %	13,1 %	11,6 %	14,5 %	11,9 %	11,0 %	14,8 %	11,7 %	13,4 %
Der Konsum von THC-Cannabis sollte gesetzlich verboten sein, Konsumentinnen/ Konsumenten sollten aber nicht bestraft werden.	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,0 %	5,5 %	7,5 %	6,1 %	5,2 %	7,1 %
Der Konsum von THC-Cannabis sollte gesetzlich erlaubt sein, die Abgabe sollte aber genau kontrolliert werden.	42,9 %	41,6 %	44,2 %	45,7 %	45,2 %	34,4 %	27,0 %	43,1 %	46,4 %
THC-Cannabis sollte wie andere Produkte frei im Handel erhältlich sein.	6,2 %	7,4 %	5,1 %	8,3 %	6,0 %	4,2 %	6,6 %	5,7 %	6,9 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	23,1 %	20,7 %	25,4 %	16,8 %	20,4 %	36,8 %	35,2 %	24,9 %	16,8 %
gültige Angaben	3.198	1.559	1.640	844	1.644	710	196	1.854	1.060

Tabelle 7.37:

WELLE 2: cancbd Haben Sie in den letzten 12 Monaten CBD-Produkte benutzt/konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	8,7 %	7,7 %	9,6 %	10,9 %	8,9 %	5,6 %	8,4 %	8,6 %	8,8 %
nein	88,7 %	88,9 %	88,5 %	85,0 %	89,3 %	91,7 %	87,1 %	88,7 %	89,1 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	2,6 %	3,4 %	1,9 %	4,1 %	1,9 %	2,7 %	4,5 %	2,7 %	2,0 %
gültige Angaben	3.277	1.596	1.681	859	1.672	747	202	1.909	1.078

Tabelle 7.38:

WELLE 2: cancbd_form1 In welcher Form haben Sie CBD-Produkte verwendet? Bitte alles Zutreffende ankreuzen! (Mehrfachantworten möglich)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Öl	5,4 %	4,1 %	6,7 %	6,5 %	5,4 %	4,4 %	6,9 %	5,5 %	5,0 %
Rauchware	2,3 %	3,4 %	1,3 %	4,8 %	2,0 %	0,0 %	2,5 %	2,3 %	2,4 %
Tee	1,2 %	1,1 %	1,3 %	1,9 %	,9 %	,9 %	2,5 %	1,2 %	,9 %
Creme	,8 %	,3 %	1,4 %	,6 %	1,1 %	,3 %	0,0 %	1,0 %	,6 %
Sonstiges:	,8 %	,8 %	,8 %	,2 %	1,1 %	,9 %	0,0 %	,6 %	1,2 %
unsicher bezüglich CBD-Konsum	2,6 %	3,4 %	1,9 %	4,0 %	1,9 %	2,8 %	4,5 %	2,7 %	2,0 %
kein CBD-Konsum in den letzten 12 Monaten	88,7 %	88,9 %	88,6 %	85,3 %	89,2 %	91,4 %	87,1 %	88,7 %	89,1 %
gültige Angaben	3.276	1.596	1.680	858	1.671	747	202	1.908	1.078

Tabelle 7.39:

WELLE 2: cancbd_reg0 Unabhängig davon, ob Sie selbst CBD-Produkte konsumieren: Fühlen Sie sich ausreichend zum Thema CBD-Produkte informiert, um Fragen zu dessen Regulierung zu beantworten?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	34,1 %	35,3 %	33,0 %	39,9 %	34,9 %	25,6 %	24,3 %	33,0 %	37,8 %
nein	65,9 %	64,7 %	67,0 %	60,1 %	65,1 %	74,4 %	75,7 %	67,0 %	62,2 %
gültige Angaben	3.093	1.507	1.586	808	1.587	699	189	1.790	1.033

Tabelle 7.40:

WELLE 2: cancbd_reg1 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Es wäre wichtig, dass CBD-Produkte einer konsequenten behördlichen Qualitätskontrolle unterliegen.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme sehr zu	19,3 %	18,0 %	20,6 %	19,9 %	20,7 %	15,3 %	9,6 %	18,5 %	22,2 %
stimme eher zu	9,5 %	10,8 %	8,3 %	12,4 %	9,6 %	6,2 %	5,3 %	9,6 %	10,6 %
unentschieden	2,5 %	3,5 %	1,6 %	4,1 %	2,1 %	1,7 %	3,2 %	2,3 %	2,9 %
stimme eher nicht zu	1,2 %	1,3 %	1,0 %	1,9 %	1,1 %	0,6 %	1,1 %	1,4 %	,5 %
stimme überhaupt nicht zu	,7 %	,5 %	,9 %	0,5 %	0,8 %	1,0 %	2,1 %	,4 %	1,0 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	,8 %	1,1 %	,5 %	1,2 %	0,6 %	0,7 %	2,7 %	,7 %	,5 %
unzureichend informiert über CBD	66,0 %	64,7 %	67,1 %	60,1 %	65,1 %	74,5 %	76,1 %	67,1 %	62,4 %
gültige Angaben	3.090	1.507	1.584	809	1.587	698	188	1.788	1.031

Tabelle 7.41:

WELLE 2: cancbd_reg2 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Es wäre wichtig, den Verkauf von CBD-Produkten komplett zu verbieten.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme sehr zu	2,1 %	2,8 %	1,4 %	3,1 %	1,8 %	1,6 %	3,2 %	1,6 %	2,4 %
stimme eher zu	1,3 %	2,0 %	,6 %	1,2 %	1,3 %	1,1 %	1,6 %	1,3 %	1,2 %
unentschieden	1,9 %	2,3 %	1,6 %	2,6 %	1,6 %	1,9 %	2,1 %	1,7 %	2,3 %
stimme eher nicht zu	6,0 %	6,4 %	5,5 %	6,1 %	5,6 %	6,7 %	5,9 %	5,7 %	6,0 %
stimme überhaupt nicht zu	21,4 %	20,0 %	22,7 %	24,6 %	23,3 %	13,2 %	10,1 %	21,0 %	24,4 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,5 %	1,9 %	1,1 %	2,3 %	1,3 %	1,0 %	1,1 %	1,6 %	1,5 %
unzureichend informiert über CBD	66,0 %	64,7 %	67,1 %	60,1 %	65,2 %	74,5 %	76,1 %	67,1 %	62,2 %
gültige Angaben	3.090	1.508	1.584	809	1.584	698	188	1.787	1.033

Tabelle 7.42:

WELLE 2: cancbd_reg3 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Es wäre wichtig, dass CBD-Produkte nur an Volljährige (18 Jahre oder älter) verkauft werden dürfen.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme sehr zu	18,3 %	18,2 %	18,5 %	18,3 %	19,9 %	14,9 %	9,5 %	18,5 %	19,8 %
stimme eher zu	7,7 %	8,4 %	7,1 %	9,5 %	7,9 %	5,2 %	4,8 %	7,4 %	9,1 %
unentschieden	3,5 %	3,9 %	3,2 %	5,9 %	2,6 %	2,7 %	4,8 %	3,3 %	3,4 %
stimme eher nicht zu	1,8 %	2,2 %	1,6 %	2,8 %	2,0 %	0,6 %	2,1 %	1,7 %	2,0 %
stimme überhaupt nicht zu	1,4 %	1,5 %	1,5 %	1,6 %	1,5 %	1,0 %	2,1 %	1,2 %	1,7 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,6 %	0,9 %	1,3 %	1,1 %	,8 %	1,6 %
unzureichend informiert über CBD	65,9 %	64,7 %	67,1 %	60,1 %	65,2 %	74,4 %	75,7 %	67,1 %	62,3 %
gültige Angaben	3.092	1.508	1.585	808	1.585	699	189	1.788	1.032

Tabelle 7.43:

WELLE 2: cancbd_reg4 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Es wäre wichtig, die Anzahl der Verkaufsorte von CBD-Produkten gering zu halten.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme sehr zu	5,7 %	6,3 %	5,2 %	5,7 %	5,8 %	5,7 %	3,7 %	5,5 %	6,3 %
stimme eher zu	5,5 %	5,7 %	5,4 %	5,4 %	5,6 %	5,4 %	5,3 %	5,3 %	6,0 %
unentschieden	7,8 %	8,5 %	7,2 %	10,4 %	7,3 %	6,0 %	4,8 %	8,5 %	7,2 %
stimme eher nicht zu	6,9 %	6,6 %	7,0 %	10,3 %	6,8 %	3,0 %	3,2 %	6,3 %	8,7 %
stimme überhaupt nicht zu	6,5 %	6,4 %	6,7 %	6,9 %	7,5 %	4,1 %	5,9 %	6,2 %	7,3 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,5 %	1,6 %	1,3 %	1,1 %	1,6 %	1,4 %	1,1 %	1,0 %	1,9 %
unzureichend informiert über CBD	66,0 %	64,8 %	67,3 %	60,1 %	65,4 %	74,3 %	76,1 %	67,2 %	62,5 %
gültige Angaben	3.086	1.505	1.580	808	1.580	700	188	1.785	1.029

Tabelle 7.44:

WELLE 2: cancbd_reg5 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Werbung für CBD-Produkte sollte nicht erlaubt sein.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme sehr zu	8,6 %	9,4 %	7,9 %	8,2 %	9,4 %	7,5 %	5,8 %	7,5 %	11,1 %
stimme eher zu	5,0 %	4,8 %	5,2 %	5,0 %	5,2 %	4,7 %	2,1 %	5,0 %	5,8 %
unentschieden	6,5 %	7,3 %	5,7 %	8,6 %	6,4 %	4,3 %	4,8 %	6,0 %	7,7 %
stimme eher nicht zu	6,0 %	6,7 %	5,5 %	7,0 %	6,6 %	3,4 %	4,2 %	6,7 %	5,0 %
stimme überhaupt nicht zu	6,6 %	5,5 %	7,6 %	9,1 %	6,3 %	4,3 %	4,2 %	6,7 %	6,7 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,2 %	1,5 %	,9 %	1,7 %	0,9 %	1,1 %	3,2 %	,7 %	1,4 %
unzureichend informiert über CBD	66,1 %	64,9 %	67,2 %	60,4 %	65,3 %	74,6 %	75,7 %	67,3 %	62,4 %
gültige Angaben	3.083	1.502	1.582	804	1.582	697	189	1.782	1.031

Tabelle 7.45:

WELLE 2: cancbd_reg6 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Es wäre wichtig, dass CBD-Produkte für medizinische Zwecke (z. B. Schmerzlinderung) zur Verfügung stehen.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme sehr zu	25,8 %	24,8 %	26,8 %	27,1 %	27,9 %	19,5 %	12,8 %	25,4 %	28,6 %
stimme eher zu	4,9 %	6,1 %	3,8 %	7,4 %	4,2 %	3,7 %	2,7 %	4,9 %	5,5 %
unentschieden	1,3 %	2,1 %	,6 %	2,2 %	1,2 %	0,4 %	3,7 %	1,2 %	1,3 %
stimme eher nicht zu	,4 %	,5 %	,4 %	0,6 %	0,4 %	0,1 %	0,0 %	,4 %	,3 %
stimme überhaupt nicht zu	1,1 %	1,4 %	,8 %	2,3 %	0,6 %	0,7 %	3,2 %	,5 %	1,5 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	,6 %	,5 %	,6 %	0,2 %	0,4 %	1,1 %	1,6 %	,4 %	,6 %
unzureichend informiert über CBD	65,9 %	64,6 %	67,1 %	60,1 %	65,1 %	74,4 %	76,1 %	67,1 %	62,3 %
gültige Angaben	3.092	1.509	1.585	809	1.586	699	188	1.788	1.032

Tabelle 7.46:

WELLE 2: cancbd_reg7 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? CBD-Produkte sollten im Handel frei erhältlich sein.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme sehr zu	6,1 %	6,0 %	6,3 %	6,6 %	6,8 %	4,0 %	2,1 %	6,1 %	6,9 %
stimme eher zu	6,1 %	5,1 %	7,0 %	7,4 %	5,8 %	5,2 %	3,7 %	6,3 %	6,3 %
unentschieden	5,0 %	5,9 %	4,0 %	6,8 %	5,0 %	2,9 %	4,2 %	5,0 %	4,9 %
stimme eher nicht zu	6,5 %	6,4 %	6,6 %	7,8 %	7,0 %	3,9 %	4,8 %	6,2 %	7,2 %
stimme überhaupt nicht zu	9,4 %	10,7 %	8,2 %	10,3 %	9,3 %	8,7 %	8,5 %	8,1 %	11,6 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	,9 %	1,1 %	,8 %	1,0 %	0,8 %	0,9 %	1,1 %	1,0 %	,7 %
unzureichend informiert über CBD	66,0 %	64,8 %	67,2 %	60,1 %	65,3 %	74,5 %	75,7 %	67,2 %	62,4 %
gültige Angaben	3.087	1.504	1.583	808	1.582	698	189	1.785	1.031

Tabelle 7.47:

WELLE 2: cancbd_reg8 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? CBD-Produkte sollten nur in Apotheken erhältlich sein.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme sehr zu	9,1 %	8,9 %	9,3 %	7,3 %	9,7 %	9,9 %	8,6 %	8,7 %	9,8 %
stimme eher zu	7,0 %	7,2 %	6,9 %	9,5 %	6,6 %	5,0 %	3,2 %	7,0 %	7,9 %
unentschieden	6,1 %	7,0 %	5,2 %	7,9 %	6,3 %	3,7 %	3,7 %	6,1 %	6,7 %
stimme eher nicht zu	5,3 %	5,6 %	5,0 %	7,7 %	5,5 %	2,0 %	5,3 %	4,6 %	6,3 %
stimme überhaupt nicht zu	5,8 %	5,8 %	5,8 %	6,6 %	6,2 %	4,0 %	1,6 %	5,9 %	6,0 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	,7 %	,9 %	,6 %	1,0 %	0,6 %	1,0 %	1,1 %	,6 %	1,0 %
unzureichend informiert über CBD	65,9 %	64,7 %	67,1 %	60,1 %	65,1 %	74,4 %	76,5 %	67,0 %	62,3 %
gültige Angaben	3.092	1.507	1.584	809	1.586	699	187	1.789	1.032

Tabelle 7.48:

WELLE 2: cancbd_reg9 Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? CBD-Produkte sollten nur in speziellen Geschäften (verbunden mit behördlichen Auflagen) erhältlich sein.

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
stimme sehr zu	10,4 %	9,7 %	11,1 %	12,3 %	10,1 %	9,0 %	9,0 %	10,0 %	11,3 %
stimme eher zu	10,7 %	11,7 %	9,7 %	11,5 %	11,2 %	8,4 %	5,8 %	10,7 %	11,8 %
unentschieden	4,9 %	5,2 %	4,5 %	6,2 %	5,2 %	2,6 %	4,8 %	4,5 %	5,6 %
stimme eher nicht zu	2,8 %	2,4 %	3,2 %	2,9 %	3,5 %	1,0 %	1,1 %	2,6 %	3,4 %
stimme überhaupt nicht zu	4,4 %	5,3 %	3,5 %	6,2 %	3,9 %	3,1 %	2,6 %	4,1 %	4,7 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	,9 %	1,0 %	,9 %	0,6 %	0,9 %	1,4 %	1,1 %	1,0 %	,9 %
unzureichend informiert über CBD	65,9 %	64,7 %	67,1 %	60,3 %	65,1 %	74,4 %	75,7 %	67,1 %	62,2 %
gültige Angaben	3.092	1.508	1.584	806	1.586	699	189	1.787	1.033

8 Andere illegale Substanzen

Tabelle 8.1:
s1a Konsumprävalenz Ecstasy

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	96,1 %	95,3 %	96,9 %	92,3 %	96,8 %	99,4 %	94,6 %	96,3 %	96,1 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	2,7 %	3,5 %	2,0 %	4,3 %	2,9 %	0,4 %	2,2 %	2,6 %	3,1 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	,8 %	,9 %	,6 %	2,1 %	0,2 %	0,2 %	1,7 %	,8 %	,5 %
in den letzten 30 Tagen vor Ausbruch der Corona-Krise konsumiert	,3 %	,3 %	,4 %	0,9 %	0,1 %	0,0 %	1,1 %	,2 %	,3 %
in den letzten 30 Tagen konsumiert	,1 %	,1 %	,1 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,1 %	0,0 %
gültige Angaben	5.963	2.910	3.053	1.713	2.938	1.313	542	3.312	1.897

Tabelle 8.2:
s1b Konsumprävalenz Methamphetamin (Crystal Meth)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	98,0 %	97,6 %	98,5 %	94,6 %	99,3 %	99,6 %	94,7 %	98,2 %	98,7 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	1,2 %	1,4 %	1,0 %	3,0 %	0,5 %	0,3 %	2,8 %	1,1 %	,8 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	,5 %	,6 %	,4 %	1,5 %	0,1 %	0,1 %	1,5 %	,4 %	,3 %
in den letzten 30 Tagen vor Ausbruch der Corona-Krise konsumiert	,3 %	,3 %	,1 %	0,7 %	0,1 %	0,0 %	,9 %	,2 %	,1 %
in den letzten 30 Tagen konsumiert	,1 %	,1 %	,1 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,1 %	,1 %
gültige Angaben	5.964	2.910	3.052	1.712	2.938	1.313	543	3.311	1.897

Tabelle 8.3:

s1c Konsumprävalenz Amphetamin (Speed) – ausgenommen Methamphetamin / Crystal Meth

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	95,9 %	95,3 %	96,5 %	90,8 %	97,3 %	99,4 %	92,4 %	96,2 %	96,1 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	2,6 %	3,0 %	2,3 %	5,0 %	2,3 %	0,3 %	2,9 %	2,6 %	2,8 %
in den letzten 12 Mo- naten konsumiert, aber nicht in den letz- ten 30 Tagen	1,0 %	1,2 %	,8 %	2,9 %	0,2 %	0,3 %	2,8 %	,8 %	,8 %
in den letzten 30 Ta- gen vor Ausbruch der Corona-Krise consu- miert	,4 %	,4 %	,3 %	0,9 %	0,2 %	0,0 %	1,7 %	,2 %	,2 %
in den letzten 30 Ta- gen konsumiert	,1 %	,2 %	,1 %	0,4 %	0,1 %	0,0 %	,2 %	,2 %	,1 %
gültige Angaben	5.963	2.910	3.054	1.713	2.938	1.313	543	3.311	1.898

Tabelle 8.4:

s1d Konsumprävalenz Kokain

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	94,8 %	93,5 %	95,9 %	89,9 %	95,7 %	99,2 %	91,9 %	95,4 %	94,4 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	3,3 %	4,3 %	2,4 %	4,6 %	3,7 %	0,8 %	3,1 %	3,1 %	4,0 %
in den letzten 12 Mo- naten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	1,2 %	1,6 %	,9 %	3,4 %	0,5 %	0,0 %	2,4 %	1,0 %	1,3 %
in den letzten 30 Ta- gen vor Ausbruch der Corona-Krise consu- miert	,5 %	,5 %	,4 %	1,3 %	0,1 %	0,0 %	1,3 %	,4 %	,3 %
in den letzten 30 Ta- gen konsumiert	,2 %	,1 %	,3 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	1,3 %	,1 %	,1 %
gültige Angaben	5.963	2.911	3.053	1.711	2.938	1.312	544	3.312	1.897

Tabelle 8.5:
s1e Konsumprävalenz Heroin

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	98,2 %	97,7 %	98,6 %	94,9 %	99,4 %	99,8 %	94,1 %	98,3 %	99,2 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	,8 %	1,1 %	,6 %	1,9 %	0,5 %	0,0 %	2,0 %	,8 %	,4 %
in den letzten 12 Mo- naten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	,6 %	,8 %	,4 %	1,9 %	0,0 %	0,2 %	1,8 %	,6 %	,2 %
in den letzten 30 Ta- gen vor Ausbruch der Corona-Krise consu- miert	,3 %	,3 %	,3 %	0,9 %	0,1 %	0,0 %	1,5 %	,2 %	,2 %
in den letzten 30 Ta- gen konsumiert	,1 %	,1 %	,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	,6 %	,1 %	,1 %
gültige Angaben	5.964	2.910	3.054	1.712	2.939	1.312	543	3.311	1.897

Tabelle 8.6:
s1f Konsumprävalenz Euphotrem (fiktive Droge)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	98,5 %	98,0 %	98,9 %	95,2 %	99,8 %	99,9 %	94,7 %	98,6 %	99,3 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	,6 %	,7 %	,4 %	1,8 %	0,1 %	0,0 %	1,7 %	,7 %	,2 %
in den letzten 12 Mo- naten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	,4 %	,6 %	,3 %	1,4 %	0,1 %	0,0 %	1,5 %	,4 %	,3 %
in den letzten 30 Ta- gen vor Ausbruch der Corona-Krise consu- miert	,4 %	,4 %	,3 %	1,2 %	0,0 %	0,1 %	1,7 %	,3 %	,3 %
in den letzten 30 Ta- gen konsumiert	,1 %	,2 %	,0 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,6 %	,0 %	,1 %
gültige Angaben	5.962	2.911	3.052	1.712	2.939	1.312	543	3.312	1.898

Tabelle 8.7:

s1g Konsumprävalenz LSD

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	96,5 %	95,4 %	97,5 %	93,7 %	97,1 %	98,7 %	94,5 %	96,5 %	97,0 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	2,4 %	3,2 %	1,6 %	2,9 %	2,6 %	1,2 %	1,5 %	2,7 %	2,2 %
in den letzten 12 Mo- naten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	,7 %	,9 %	,5 %	2,0 %	0,2 %	0,0 %	2,2 %	,5 %	,6 %
in den letzten 30 Ta- gen vor Ausbruch der Corona-Krise consu- miert	,3 %	,4 %	,3 %	0,9 %	0,1 %	0,1 %	1,3 %	,2 %	,2 %
in den letzten 30 Ta- gen konsumiert	,1 %	,2 %	,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	,6 %	,1 %	,1 %
gültige Angaben	5.963	2.910	3.053	1.713	2.937	1.312	543	3.311	1.898

Tabelle 8.8:

s1h Konsumprävalenz biogene Drogen (psychoaktive Pilze, Engelstropfpete, Stechapfel oder Ähnliches)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	95,3 %	93,7 %	96,7 %	91,1 %	95,8 %	99,5 %	94,3 %	95,7 %	94,5 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	3,4 %	4,5 %	2,4 %	5,1 %	3,9 %	0,2 %	1,8 %	3,1 %	4,7 %
in den letzten 12 Mo- naten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	,9 %	1,3 %	,5 %	2,3 %	0,3 %	0,4 %	2,2 %	,8 %	,7 %
in den letzten 30 Ta- gen vor Ausbruch der Corona-Krise consu- miert	,3 %	,4 %	,2 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %	,3 %	,1 %
in den letzten 30 Ta- gen konsumiert	,1 %	,1 %	,1 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	,6 %	,1 %	,1 %
gültige Angaben	5.963	2.911	3.054	1.712	2.939	1.313	544	3.312	1.898

Tabelle 8.9:

s1i Konsumprävalenz Schnüffelstoffe (Poppers, Lachgas, Lösungsmittel ...)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
noch nie konsumiert	95,0 %	93,5 %	96,6 %	90,9 %	95,6 %	99,2 %	93,7 %	96,0 %	93,7 %
früher konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	3,3 %	4,5 %	2,2 %	4,9 %	3,6 %	0,5 %	1,8 %	2,7 %	4,9 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen	,9 %	1,0 %	,9 %	2,3 %	0,4 %	0,2 %	1,8 %	,8 %	,9 %
in den letzten 30 Tagen vor Ausbruch der Corona-Krise konsumiert	,4 %	,5 %	,2 %	1,1 %	0,1 %	0,0 %	1,5 %	,2 %	,2 %
in den letzten 30 Tagen konsumiert	,4 %	,6 %	,1 %	0,8 %	0,3 %	0,0 %	1,1 %	,2 %	,3 %
gültige Angaben	5.963	2.910	3.052	1.712	2.939	1.313	543	3.311	1.898

Tabelle 8.10:

WELEL 2: dro_einstellungen1 Aus Ihrer Sicht: Ist ein drogenabhängiger Mensch eher eine Straftäterin / ein Straftäter oder eher eine Kranke / ein Kranker? Was würden Sie sagen?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
eher Straftäter/-in	6,5 %	8,6 %	4,4 %	7,5 %	6,7 %	4,7 %	6,5 %	7,3 %	5,2 %
eher Kranke(r)	57,6 %	55,6 %	59,6 %	58,8 %	59,7 %	51,7 %	57,2 %	55,2 %	62,7 %
sowohl Straftäter/-in als auch Kranke(r)	32,7 %	32,2 %	33,1 %	27,2 %	31,1 %	42,5 %	30,8 %	34,3 %	29,5 %
weder Straftäter/-in noch ein Kranke(r)	3,2 %	3,6 %	2,9 %	6,5 %	2,5 %	1,1 %	5,5 %	3,3 %	2,6 %
gültige Angaben	3.264	1.589	1.673	856	1.664	741	201	1.900	1.074

Tabelle 8.11:

WELLE 2: dro_einstellungen2 Angenommen, es wird eine Beratungsstelle für Drogenabhängige in Ihrer näheren Wohnumgebung errichtet. Wie würden Sie reagieren?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
kein Problem	35,7 %	37,0 %	34,5 %	37,7 %	35,2 %	34,5 %	40,9 %	36,1 %	34,1 %
ein etwas ungu-tes Gefühl, aber „was sein muss, muss sein“	44,3 %	42,3 %	46,2 %	45,0 %	42,4 %	47,6 %	42,4 %	43,3 %	46,0 %
ein sehr ungu-tes Gefühl	17,4 %	17,6 %	17,2 %	14,6 %	19,3 %	16,4 %	14,6 %	17,8 %	17,5 %
Oder wären Sie da so aufgebracht, dass Sie dagegen aktiv protes-tieren?	2,6 %	3,1 %	2,2 %	2,7 %	3,1 %	1,5 %	2,0 %	2,7 %	2,3 %
gültige Angaben	3.252	1.588	1.666	855	1.661	737	198	1.895	1.069

Tabelle 8.12:

WELLE 2: onl2 Haben Sie jemals über das Internet Drogen, neue psychoaktive Substanzen oder verschreibungspflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente gekauft?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja:	,7 %	1,3 %	,1 %	0,8 %	0,7 %	0,4 %	0,0 %	,8 %	,6 %
nein	98,1 %	97,4 %	98,9 %	96,5 %	98,6 %	99,1 %	94,6 %	98,1 %	98,9 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	1,2 %	1,4 %	1,0 %	2,7 %	0,8 %	0,5 %	5,4 %	1,1 %	,5 %
gültige Angaben	3.279	1.596	1.681	859	1.672	746	202	1.909	1.078

Tabelle 8.13:

onl3 Haben Sie dazu das Clearnet (also das normal zugängliche Internet) oder Kryptomärkte aus dem sogenannten Darknet (also aus einem Bereich des Internets, der nur über Verschlüsselung zugänglich ist) benutzt?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ich habe dazu das „normale Internet“ benutzt.	,5 %	1,0 %	,1 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,0 %	,6 %	,5 %
Ich habe dazu Krypto-märkte im Darknet benutzt.	,1 %	,3 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	,1 %	,2 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	,0 %	,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %
Ich habe noch nie on-line Drogen gekauft.	99,3 %	98,7 %	99,9 %	99,2 %	99,3 %	99,5 %	100,0 %	99,2 %	99,3 %
gültige Angaben	3.239	1.574	1.664	836	1.659	743	191	1.888	1.073

9 Neue psychoaktive Substanzen

Tabelle 9.1:

nps1 Haben Sie jemals neue psychoaktive Substanzen (NPS) konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	1,4 %	1,9 %	1,0 %	3,9 %	0,5 %	0,4 %	3,2 %	1,2 %	1,3 %
nein	96,4 %	95,7 %	97,2 %	92,2 %	98,1 %	98,2 %	92,0 %	96,7 %	97,5 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	2,2 %	2,4 %	1,9 %	3,9 %	1,4 %	1,5 %	4,7 %	2,1 %	1,3 %
gültige Angaben	5.921	2.888	3.032	1.681	2.930	1.308	527	3.299	1.894

Tabelle 9.2:

nps2 Haben Sie in den letzten 12 Monaten NPS konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	,3 %	,4 %	,2 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	1,4 %	,2 %	,1 %
nein	,8 %	1,2 %	,4 %	1,8 %	0,5 %	0,4 %	1,4 %	,7 %	1,0 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	,2 %	,3 %	,2 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	,6 %	,3 %	,1 %
nie im Leben NPS konsumiert	98,7 %	98,1 %	99,1 %	96,3 %	99,5 %	99,6 %	96,6 %	98,9 %	98,8 %
gültige Angaben	5.786	2.816	2.972	1.609	2.888	1.289	502	3.228	1.868

Tabelle 9.3:

nps3 Haben Sie in den letzten 30 Tagen NPS konsumiert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	,1 %	,1 %	,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %	,1 %	,1 %
nein	,2 %	,2 %	,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	,6 %	,2 %	,1 %
in den letzten 12 Monaten keine NPS konsumiert	,8 %	1,2 %	,4 %	1,8 %	0,5 %	0,4 %	1,4 %	,7 %	1,0 %
nie im Leben NPS konsumiert	98,9 %	98,5 %	99,3 %	97,2 %	99,5 %	99,6 %	97,0 %	99,1 %	98,9 %
gültige Angaben	5.773	2.806	2.966	1.595	2.888	1.289	500	3.220	1.866

Tabelle 9.4:

nps5 Wie (falls überhaupt) hat sich Ihr Konsumverhalten bei NPS seit Ausbruch der Corona-Krise verändert?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
An meinem Konsum von NPS hat sich seit Ausbruch der Corona-Krise nichts geändert.	,8 %	1,2 %	,5 %	1,9 %	0,5 %	0,3 %	1,6 %	,7 %	1,0 %
Ich nehme seit Ausbruch der Corona-Krise weniger NPS oder eine geringere Dosis davon ein.	,2 %	,3 %	,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	,8 %	,1 %	,1 %
Ich habe seit Ausbruch der Corona-Krise komplett aufgehört, NPS einzunehmen.	,3 %	,3 %	,2 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	,4 %	,3 %	,1 %
Ich nehme seit Ausbruch der Corona-Krise mehr NPS oder eine größere Dosis davon als zuvor ein.	,1 %	,1 %	,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	,1 %
Ich habe seit Ausbruch der Corona-Krise wieder begonnen, NPS einzunehmen.	,0 %	,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ich habe nie im Leben NPS konsumiert.	98,7 %	98,1 %	99,2 %	96,3 %	99,5 %	99,7 %	97,2 %	98,9 %	98,8 %
gültige Angaben	5.786	2.816	2.971	1.609	2.888	1.288	499	3.228	1.869

10 Computerspiele

Tabelle 10.1:

gam1 Haben Sie jemals oder in den letzten 12 Monaten Spiele via Computer, Tablet, Spielkonsole oder Smartphone gespielt?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Ja, ich habe in den letzten 12 Monaten Computerspiele gespielt.	63,5 %	64,5 %	62,5 %	74,1 %	62,4 %	52,3 %	64,4 %	65,0 %	60,3 %
Nein, ich habe in den letzten 12 Monaten keine Computerspiele gespielt, aber früher.	16,6 %	19,0 %	14,3 %	14,8 %	19,6 %	12,0 %	12,4 %	15,5 %	20,0 %
Nein, ich habe noch nie Computerspiele gespielt.	18,4 %	15,2 %	21,5 %	8,0 %	17,3 %	34,4 %	19,1 %	18,2 %	18,8 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	1,5 %	1,3 %	1,7 %	3,1 %	0,7 %	1,3 %	4,1 %	1,3 %	,8 %
gültige Angaben	5.912	2.885	3.028	1.680	2.925	1.306	534	3.291	1.892

Tabelle 10.2:

gam2 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Spiele via Computer, Tablet, Spielkonsole oder Smartphone gespielt?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich	24,0 %	22,6 %	25,4 %	28,4 %	22,9 %	21,0 %	28,8 %	25,4 %	20,4 %
oft	13,9 %	14,9 %	12,9 %	17,2 %	12,5 %	12,9 %	15,1 %	14,5 %	11,9 %
gelegentlich	22,9 %	23,5 %	22,4 %	25,9 %	23,4 %	18,1 %	20,9 %	22,8 %	23,7 %
gar nicht	3,3 %	4,0 %	2,6 %	4,3 %	3,8 %	0,9 %	2,0 %	2,8 %	4,5 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	,3 %	,3 %	,3 %	0,6 %	0,2 %	0,1 %	,4 %	,2 %	,3 %
in den letzten 12 Monaten keine Computerspiele gespielt	16,8 %	19,3 %	14,5 %	15,3 %	19,7 %	12,2 %	12,9 %	15,7 %	20,2 %
nie im Leben Computerspiele gespielt	18,7 %	15,4 %	21,9 %	8,2 %	17,4 %	34,9 %	20,0 %	18,4 %	19,0 %
gültige Angaben	5.820	2.845	2.974	1.626	2.904	1.288	511	3.245	1.875

Tabelle 10.3:

gam3_rec Wie viele Stunden haben Sie in den letzten 30 Tagen im Durchschnitt pro Woche Spiele via Computer, Tablet, Spielkonsole oder Smartphone gespielt? (rekodiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
weniger als 10 Stunden pro Woche	42,1 %	41,6 %	42,6 %	43,7 %	43,5 %	37,1 %	36,9 %	43,3 %	41,3 %
zwischen 10 und 19 Stunden pro Woche	7,7 %	8,2 %	7,1 %	11,3 %	6,9 %	5,4 %	7,8 %	8,3 %	6,9 %
20 Stunden oder mehr pro Woche	4,6 %	5,4 %	3,7 %	9,0 %	3,2 %	2,7 %	7,8 %	5,1 %	3,1 %
in den letzten 30 Tagen keine Computerspiele gespielt	3,9 %	4,6 %	3,1 %	5,6 %	4,3 %	1,0 %	2,7 %	3,3 %	5,0 %
in den letzten 12 Monaten keine Computerspiele gespielt	19,8 %	22,3 %	17,3 %	19,8 %	22,3 %	14,0 %	17,6 %	18,4 %	22,5 %
noch nie im Leben Computerspiele gespielt	22,0 %	17,9 %	26,1 %	10,6 %	19,7 %	39,9 %	27,3 %	21,6 %	21,1 %
gültige Angaben	4.951	2.459	2.493	1.260	2.565	1.125	374	2.770	1.684

Tabelle 10.4:

gam4a Hat sich Ihr Spielverhalten am Computer, Tablet, an der Spielkonsole oder am Smartphone seit dem Ausbruch der Corona-Krise verändert oder nicht? Spielen Sie jetzt mehr, weniger oder gleich viel wie vor der Corona-Krise?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
mehr	19,8 %	21,0 %	18,7 %	33,5 %	16,1 %	10,2 %	24,1 %	19,8 %	19,3 %
gleich viel	33,7 %	33,5 %	34,0 %	26,5 %	36,9 %	36,1 %	27,3 %	36,1 %	31,0 %
weniger	3,8 %	3,3 %	4,3 %	5,2 %	3,4 %	2,7 %	4,6 %	3,7 %	3,7 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	1,8 %	1,7 %	2,0 %	2,3 %	1,6 %	1,8 %	4,1 %	1,7 %	1,4 %
in den letzten 30 Tagen keine Computerspiele gespielt	3,2 %	3,9 %	2,6 %	4,1 %	3,7 %	0,8 %	1,8 %	2,8 %	4,5 %
in den letzten 12 Monaten keine Computerspiele gespielt	16,4 %	18,8 %	14,2 %	14,5 %	19,5 %	12,0 %	12,2 %	15,4 %	20,0 %
nie im Leben Computerspiele gespielt	18,3 %	15,1 %	21,3 %	7,8 %	17,2 %	34,2 %	18,8 %	18,1 %	18,8 %
keine Antwort	2,9 %	2,7 %	3,1 %	6,1 %	1,5 %	2,1 %	7,2 %	2,4 %	1,4 %
gültige Angaben	5.964	2.909	3.053	1.713	2.938	1.312	543	3.311	1.898

Tabelle 10.5:

gam5 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Geld für den Kauf von Lootboxen ausgegeben?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ja	3,0 %	4,1 %	1,9 %	6,0 %	2,5 %	0,2 %	6,3 %	2,8 %	2,2 %
nein	54,5 %	53,8 %	55,2 %	59,1 %	54,1 %	49,4 %	50,8 %	56,9 %	51,7 %
weiß nicht / kann ich nicht beurteilen	1,6 %	1,6 %	1,7 %	2,2 %	1,5 %	1,4 %	2,9 %	1,7 %	1,4 %
in den letzten 30 Tagen keine Computerspiele gespielt	3,2 %	3,9 %	2,6 %	4,1 %	3,7 %	0,8 %	1,8 %	2,8 %	4,5 %
in den letzten 12 Monaten keine Computerspiele gespielt	16,4 %	18,8 %	14,1 %	14,5 %	19,5 %	12,0 %	12,2 %	15,4 %	20,0 %
nie im Leben Computerspiele gespielt	18,3 %	15,1 %	21,3 %	7,8 %	17,2 %	34,2 %	18,8 %	18,1 %	18,8 %
keine Antwort	3,0 %	2,7 %	3,2 %	6,2 %	1,5 %	2,0 %	7,2 %	2,4 %	1,5 %
gültige Angaben	5.963	2.910	3.054	1.713	2.939	1.312	543	3.311	1.897

Tabelle 10.6:

gam6_rec Ich habe monatlich durchschnittlich ... Euro für Lootboxen ausgegeben (rekodiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
weniger als 5 €	,9 %	1,2 %	,6 %	1,6 %	1,0 %	,1 %	1,9 %	,8 %	,9 %
6 bis 10 €	,4 %	,7 %	,2 %	,8 %	,4 %	0,0 %	,4 %	,5 %	,3 %
11 bis 15 €	,1 %	,1 %	,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	,1 %
16 bis 20 €	,3 %	,3 %	,3 %	,6 %	,2 %	0,0 %	,2 %	,3 %	,1 %
21 bis 25 €	,1 %	,2 %	,1 %	,3 %	,1 %	0,0 %	,6 %	,1 %	,2 %
26 bis 50 €	,3 %	,3 %	,2 %	,6 %	,2 %	0,0 %	,4 %	,3 %	,1 %
51 bis 99 €	,0 %	,1 %	,0 %	,1 %	,1 %	0,0 %	,2 %	0,0 %	,1 %
100 € oder mehr	,1 %	,1 %	,1 %	,4 %	,1 %	0,0 %	,6 %	,1 %	,1 %
in den letzten 12 Monaten kein Geld für Lootboxen ausgegeben	57,7 %	57,0 %	58,3 %	66,2 %	55,9 %	51,8 %	58,1 %	59,7 %	53,5 %
in den letzten 30 Tagen keine Computerspiele gespielt	3,4 %	4,1 %	2,7 %	4,5 %	3,9 %	,9 %	2,1 %	2,9 %	4,6 %
in den letzten 12 Monaten keine Computerspiele gespielt	17,4 %	19,9 %	14,9 %	16,3 %	20,0 %	12,3 %	13,9 %	16,2 %	20,7 %
nie im Leben Computerspiele gespielt	19,3 %	16,0 %	22,5 %	8,7 %	18,0 %	34,9 %	21,5 %	19,0 %	19,4 %
gültige Angaben	5.637	2.749	2.892	1.591	2.910	1.317	475	3.153	1.833

Tabelle 10.7:

WELLE 2: gam_phase1 Computerspielverhalten in Phase 1: Vor Corona (Jänner-Februar 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich Computerspiele gespielt	7,3 %	7,5 %	7,0 %	4,9 %	8,3 %	7,6 %	8,0 %	7,9 %	6,0 %
fast täglich Computerspiele gespielt (5-6 Tage pro Woche)	6,4 %	6,2 %	6,6 %	4,2 %	6,7 %	8,5 %	9,0 %	6,7 %	5,7 %
mehrmals pro Woche Computerspiele gespielt (1-4 Tage)	12,3 %	12,6 %	11,9 %	11,2 %	12,2 %	13,7 %	7,0 %	14,1 %	9,4 %
1 Tag pro Woche Computerspiele gespielt	6,6 %	7,5 %	5,7 %	9,9 %	5,6 %	5,1 %	7,0 %	7,0 %	6,0 %
seltener als 1 Tag pro Woche Computerspiele gespielt	9,7 %	11,2 %	8,3 %	15,8 %	9,2 %	3,8 %	7,5 %	9,4 %	10,5 %
gar keine Computerspiele gespielt	4,6 %	4,6 %	4,7 %	9,1 %	3,2 %	2,6 %	5,0 %	4,1 %	4,8 %
seit Anfang 2020 keine Computerspiele gespielt	53,2 %	50,3 %	55,8 %	44,9 %	54,9 %	58,7 %	56,5 %	50,8 %	57,6 %
gültige Angaben	3.264	1.593	1.672	857	1.669	738	200	1.899	1.074

Tabelle 10.8:

WELLE 2: gam_phase2 Computerspielverhalten in Phase 2: Während der ersten Einschränkungen (März–Juni 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich Computerspiele gespielt	10,8 %	10,7 %	10,9 %	10,5 %	11,2 %	10,0 %	13,8 %	11,3 %	9,7 %
fast täglich Computerspiele gespielt (5-6 Tage pro Woche)	9,1 %	9,2 %	8,9 %	8,9 %	9,1 %	9,1 %	7,1 %	10,4 %	7,2 %
mehrmals pro Woche Computerspiele gespielt (1-4 Tage)	13,2 %	14,3 %	12,1 %	15,1 %	12,2 %	13,3 %	9,2 %	14,2 %	11,9 %
1 Tag pro Woche Computerspiele gespielt	6,0 %	6,4 %	5,5 %	8,9 %	5,0 %	4,6 %	7,1 %	6,1 %	5,6 %
seltener als 1 Tag pro Woche Computerspiele gespielt	6,6 %	7,4 %	5,8 %	9,4 %	6,6 %	3,4 %	3,6 %	6,5 %	6,9 %
gar keine Computerspiele gespielt	1,2 %	1,5 %	,9 %	2,1 %	0,8 %	1,1 %	1,5 %	,8 %	1,2 %
seit Anfang 2020 keine Computerspiele gespielt	53,2 %	50,4 %	55,9 %	45,1 %	55,0 %	58,6 %	57,7 %	50,8 %	57,5 %
gültige Angaben	3.259	1.590	1.668	854	1.664	739	196	1.899	1.076

Tabelle 10.9:

WELLE 2: gam_phase3 Computerspielverhalten in Phase 3: Ab Beginn der Lockerungen (Juli – Anfang September 2020)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich Computerspiele gespielt	8,0 %	8,1 %	8,0 %	6,1 %	9,1 %	8,0 %	9,1 %	8,4 %	7,3 %
fast täglich Computerspiele gespielt (5-6 Tage pro Woche)	7,8 %	7,9 %	7,7 %	5,9 %	8,3 %	8,8 %	9,1 %	8,7 %	6,2 %
mehrmals pro Woche Computerspiele gespielt (1-4 Tage)	12,6 %	13,3 %	11,9 %	13,5 %	11,6 %	13,9 %	8,6 %	14,6 %	9,6 %
1 Tag pro Woche Computerspiele gespielt	6,6 %	7,5 %	5,7 %	9,4 %	5,6 %	5,7 %	7,6 %	6,2 %	7,2 %
seltener als 1 Tag pro Woche Computerspiele gespielt	8,6 %	9,5 %	7,8 %	13,0 %	8,5 %	3,9 %	6,6 %	8,7 %	8,4 %
gar keine Computerspiele gespielt	3,1 %	3,2 %	2,9 %	7,0 %	1,9 %	1,2 %	1,5 %	2,7 %	3,7 %
seit Anfang 2020 keine Computerspiele gespielt	53,3 %	50,4 %	55,9 %	45,1 %	55,0 %	58,5 %	57,4 %	50,7 %	57,7 %
gültige Angaben	3.257	1.590	1.668	853	1.665	740	197	1.900	1.073

Tabelle 10.10:

WELLE 2: gam_phase4 Computerspielverhalten in Phase 4: Aktuelles Spielverhalten (in den letzten 4 Wochen)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
täglich Computerspiele gespielt	8,1 %	7,9 %	8,4 %	5,8 %	9,4 %	8,0 %	10,5 %	8,6 %	7,1 %
fast täglich Computerspiele gespielt (5-6 Tage pro Woche)	7,0 %	7,0 %	6,9 %	4,8 %	7,6 %	8,0 %	9,0 %	7,4 %	5,7 %
mehrmals pro Woche Computerspiele gespielt (1-4 Tage)	12,2 %	12,5 %	11,9 %	12,1 %	11,2 %	14,7 %	8,0 %	13,7 %	10,1 %
1 Tag pro Woche Computerspiele gespielt	6,2 %	7,4 %	5,1 %	9,0 %	5,5 %	4,5 %	3,5 %	6,5 %	6,1 %
seltener als 1 Tag pro Woche Computerspiele gespielt	7,6 %	8,2 %	7,0 %	11,3 %	7,5 %	3,5 %	5,0 %	7,8 %	7,6 %
gar keine Computerspiele gespielt	5,8 %	6,6 %	5,0 %	11,9 %	3,8 %	3,0 %	7,5 %	5,3 %	5,8 %
seit Anfang 2020 keine Computerspiele gespielt	53,1 %	50,4 %	55,7 %	45,0 %	54,9 %	58,4 %	56,5 %	50,7 %	57,6 %
gültige Angaben	3.266	1.592	1.675	856	1.667	741	200	1.902	1.074

Tabelle 10.11:

WELLE 2: gam_dauer_phase1_rec Anzahl der Spielstunden an einem üblichen Spieltag (Phase 1, vor Corona, rekodiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
weniger als 1 Stunde pro Spieltag	22,5 %	20,8 %	24,1 %	14,3 %	25,4 %	25,4 %	13,8 %	23,3 %	22,6 %
mehr als 1 Stunde bis max. 3 Stunden pro Spieltag	15,1 %	18,7 %	11,6 %	22,8 %	13,2 %	10,5 %	13,8 %	17,0 %	11,8 %
mehr als 3 Stunden bis max. 5 Stunden pro Spieltag	2,9 %	3,6 %	2,3 %	5,6 %	2,0 %	2,0 %	9,2 %	3,1 %	1,5 %
mehr als 5 Stunden bis max. 10 Stunden pro Spieltag	,5 %	,8 %	,2 %	1,6 %	0,2 %	0,1 %	,5 %	,6 %	,2 %
mehr als 10 Stunden pro Spieltag	,0 %	,1 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	,1 %	,1 %
keine Computerspiele gespielt in dem Zeitraum	4,7 %	4,6 %	4,7 %	9,3 %	3,2 %	2,6 %	5,1 %	4,1 %	4,9 %
seit Anfang 2020 keine Computerspiele gespielt	54,3 %	51,4 %	57,0 %	46,5 %	56,0 %	59,2 %	57,7 %	51,7 %	59,0 %
gültige Angaben	3.196	1.561	1.636	828	1.637	732	196	1.864	1.050

Tabelle 10.12:

WELLE 2: gam_dauer_phase4_rec Anzahl der Spielstunden an einem üblichen Spieltag (Phase 4, in den letzten 4 Wochen, rekodiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
weniger als 1 Stunde pro Spieltag	20,9 %	19,9 %	21,9 %	14,7 %	23,1 %	23,3 %	13,8 %	21,4 %	21,2 %
mehr als 1 Stunde bis max. 3 Stunden pro Spieltag	15,4 %	17,5 %	13,3 %	19,9 %	14,8 %	11,8 %	12,8 %	17,8 %	11,6 %
mehr als 3 Stunden bis max. 5 Stunden pro Spieltag	2,9 %	3,3 %	2,5 %	4,9 %	2,0 %	2,6 %	6,1 %	2,9 %	2,1 %
mehr als 5 Stunden bis max. 10 Stunden pro Spieltag	,6 %	1,1 %	,1 %	1,7 %	0,3 %	0,0 %	2,0 %	,8 %	0,0 %
mehr als 10 Stunden pro Spieltag	,1 %	,1 %	,1 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,2 %
keine Computerspiele gespielt in dem Zeitraum	5,9 %	6,7 %	5,1 %	12,3 %	3,9 %	3,0 %	7,7 %	5,4 %	5,9 %
seit Anfang 2020 keine Computerspiele gespielt	54,2 %	51,3 %	57,0 %	46,3 %	55,9 %	59,3 %	57,7 %	51,7 %	59,0 %
gültige Angaben	3.199	1.564	1.637	831	1.639	730	196	1.865	1.050

11 Risikoeinschätzung

Tabelle 11.1:

WELLE 2: risiko1 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig Zigaretten rauchen*

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	47,3 %	45,4 %	49,2 %	44,4 %	46,7 %	52,1 %	44,8 %	46,4 %	49,3 %
gefährlich	45,8 %	47,3 %	44,4 %	44,7 %	47,5 %	43,5 %	43,8 %	46,6 %	45,4 %
nicht so gefährlich	4,7 %	4,9 %	4,5 %	7,0 %	4,4 %	2,5 %	8,0 %	5,0 %	3,4 %
ungefährlich	,7 %	,9 %	,5 %	1,5 %	0,4 %	0,5 %	1,0 %	,5 %	1,0 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,5 %	1,6 %	1,4 %	2,4 %	1,0 %	1,3 %	2,5 %	1,5 %	,8 %
gültige Angaben	3.275	1.596	1.679	860	1.670	747	201	1.907	1.077

Tabelle 11.2:

risiko2 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Eine oder mehrere Packungen Zigaretten täglich rauchen*

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	80,6 %	78,1 %	82,9 %	77,6 %	80,7 %	83,8 %	69,3 %	79,8 %	84,8 %
gefährlich	15,9 %	17,6 %	14,3 %	15,5 %	16,9 %	14,2 %	21,8 %	16,6 %	13,2 %
nicht so gefährlich	2,0 %	2,4 %	1,5 %	3,6 %	1,4 %	1,2 %	5,4 %	2,3 %	,7 %
ungefährlich	,3 %	,2 %	,4 %	0,8 %	0,1 %	0,0 %	1,0 %	,2 %	,4 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,3 %	1,6 %	1,0 %	2,4 %	0,9 %	0,8 %	2,5 %	1,2 %	,8 %
gültige Angaben	3.275	1.595	1.680	858	1.671	745	202	1.909	1.075

Tabelle 11.3:

risiko3 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? E-Zigaretten regelmäßig konsumieren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	30,1 %	28,4 %	31,7 %	28,6 %	30,1 %	31,8 %	31,2 %	30,3 %	29,4 %
gefährlich	47,4 %	48,2 %	46,6 %	45,5 %	49,4 %	45,0 %	45,0 %	45,9 %	51,1 %
nicht so gefährlich	13,1 %	14,3 %	12,0 %	15,6 %	12,3 %	12,3 %	12,9 %	14,1 %	11,4 %
ungefährlich	1,1 %	1,5 %	,8 %	2,1 %	0,8 %	0,5 %	2,5 %	1,1 %	,9 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	8,3 %	7,6 %	8,9 %	8,1 %	7,4 %	10,3 %	8,4 %	8,5 %	7,2 %
gültige Angaben	3.270	1.592	1.678	859	1.665	745	202	1.902	1.075

Tabelle 11.4:

risiko4 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig Alkohol trinken

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	37,3 %	29,3 %	44,8 %	32,3 %	39,2 %	38,6 %	42,3 %	38,3 %	33,9 %
gefährlich	46,7 %	50,4 %	43,2 %	46,8 %	47,1 %	45,9 %	43,3 %	45,7 %	49,8 %
nicht so gefährlich	13,3 %	16,9 %	9,9 %	15,6 %	12,0 %	13,7 %	7,0 %	13,6 %	14,4 %
ungefährlich	1,2 %	1,8 %	,5 %	3,0 %	0,4 %	0,8 %	5,5 %	,9 %	,8 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,5 %	1,6 %	1,5 %	2,3 %	1,3 %	1,1 %	2,0 %	1,5 %	1,0 %
gültige Angaben	3.266	1.590	1.677	855	1.665	747	201	1.902	1.074

Tabelle 11.5:

risiko5 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Fünf oder mehr alkoholische Getränke jedes Wochenende trinken

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	36,3 %	33,1 %	39,3 %	30,6 %	35,4 %	44,6 %	36,3 %	35,5 %	38,5 %
gefährlich	44,4 %	44,3 %	44,6 %	42,5 %	45,4 %	44,2 %	38,3 %	43,9 %	45,7 %
nicht so gefährlich	15,5 %	18,2 %	12,9 %	19,0 %	16,3 %	9,5 %	17,4 %	16,6 %	13,4 %
ungefährlich	2,2 %	2,8 %	1,5 %	5,4 %	1,4 %	0,4 %	4,0 %	2,5 %	1,3 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,7 %	1,6 %	1,7 %	2,6 %	1,4 %	1,3 %	4,0 %	1,6 %	1,1 %
gültige Angaben	3.276	1.595	1.679	859	1.670	747	201	1.908	1.075

Tabelle 11.6:

risiko6 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Ein- oder zweimal THC-haltiges Cannabis (Haschisch oder Marihuana) probieren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	26,3 %	24,6 %	27,8 %	14,3 %	24,4 %	44,4 %	43,0 %	28,1 %	18,8 %
gefährlich	23,5 %	23,8 %	23,3 %	16,9 %	24,8 %	28,3 %	23,0 %	24,9 %	22,0 %
nicht so gefährlich	26,6 %	26,3 %	27,0 %	33,9 %	28,3 %	14,4 %	17,5 %	25,0 %	31,8 %
ungefährlich	16,9 %	19,2 %	14,7 %	29,8 %	16,4 %	3,2 %	8,5 %	14,7 %	22,6 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	6,6 %	6,0 %	7,2 %	5,0 %	6,1 %	9,7 %	8,0 %	7,4 %	4,8 %
gültige Angaben	3.270	1.591	1.677	858	1.666	745	200	1.902	1.075

Tabelle 11.7:

risiko7 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig THC-haltiges Cannabis (Haschisch oder Marihuana) rauchen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	48,0 %	44,6 %	51,2 %	33,5 %	47,4 %	66,0 %	59,9 %	50,3 %	41,0 %
gefährlich	30,7 %	31,9 %	29,6 %	36,1 %	32,1 %	21,3 %	18,8 %	29,4 %	35,9 %
nicht so gefährlich	13,2 %	15,3 %	11,3 %	20,6 %	13,6 %	3,9 %	11,4 %	12,2 %	15,4 %
ungefährlich	2,0 %	2,4 %	1,6 %	3,7 %	1,8 %	0,5 %	1,5 %	1,8 %	2,5 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	6,1 %	5,8 %	6,3 %	6,1 %	5,1 %	8,3 %	8,4 %	6,3 %	5,1 %
gültige Angaben	3.273	1.593	1.679	856	1.671	746	202	1.905	1.075

Tabelle 11.8:

risiko8 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Ein- oder zweimal CBD-haltiges Cannabis probieren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	21,8 %	21,3 %	22,4 %	13,0 %	20,3 %	35,4 %	38,0 %	23,3 %	15,2 %
gefährlich	22,8 %	23,6 %	22,1 %	17,4 %	22,3 %	30,3 %	27,5 %	23,6 %	20,7 %
nicht so gefährlich	25,8 %	24,2 %	27,2 %	29,0 %	28,2 %	16,6 %	16,5 %	24,5 %	30,1 %
ungefährlich	20,9 %	22,0 %	19,9 %	32,2 %	21,1 %	7,5 %	8,5 %	19,2 %	26,6 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	8,7 %	8,9 %	8,5 %	8,4 %	8,2 %	10,2 %	9,5 %	9,4 %	7,3 %
gültige Angaben	3.268	1.592	1.677	855	1.666	746	200	1.903	1.075

Tabelle 11.9:

risiko9 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig CBD-haltiges Cannabis konsumieren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	38,9 %	37,5 %	40,2 %	27,7 %	37,7 %	54,5 %	56,5 %	40,2 %	33,0 %
gefährlich	25,5 %	26,8 %	24,4 %	25,9 %	26,5 %	23,0 %	18,5 %	25,8 %	26,5 %
nicht so gefährlich	16,3 %	16,7 %	16,0 %	20,8 %	17,8 %	8,1 %	13,0 %	14,3 %	21,2 %
ungefährlich	9,9 %	9,5 %	10,2 %	15,6 %	9,1 %	5,0 %	7,0 %	9,5 %	10,6 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	9,4 %	9,5 %	9,2 %	10,0 %	8,9 %	9,5 %	5,0 %	10,1 %	8,7 %
gültige Angaben	3.261	1.585	1.675	851	1.664	745	200	1.899	1.071

Tabelle 11.10:

risiko10 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Ein- oder zweimal Heroin probieren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	81,6 %	78,7 %	84,3 %	70,5 %	85,5 %	85,5 %	80,6 %	81,7 %	82,2 %
gefährlich	13,3 %	15,3 %	11,5 %	21,5 %	10,6 %	10,2 %	11,4 %	13,5 %	13,1 %
nicht so gefährlich	1,9 %	2,7 %	1,2 %	3,2 %	1,7 %	0,8 %	1,5 %	1,9 %	2,1 %
ungefährlich	,6 %	,7 %	,6 %	1,5 %	0,3 %	0,4 %	3,0 %	,4 %	,8 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	2,5 %	2,5 %	2,4 %	3,2 %	1,9 %	3,1 %	3,5 %	2,5 %	1,8 %
gültige Angaben	3.251	1.581	1.670	845	1.663	743	201	1.890	1.070

Tabelle 11.11:

risiko11 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig Heroin konsumieren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	93,6 %	91,0 %	96,1 %	86,7 %	96,2 %	95,8 %	88,1 %	93,5 %	95,4 %
gefährlich	3,3 %	4,6 %	2,0 %	6,3 %	2,3 %	2,0 %	3,5 %	3,6 %	2,3 %
nicht so gefährlich	,6 %	1,1 %	,2 %	2,0 %	0,1 %	0,3 %	2,5 %	,5 %	,7 %
ungefährlich	,6 %	,9 %	,2 %	2,0 %	0,1 %	0,0 %	3,5 %	,4 %	,3 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,9 %	2,5 %	1,4 %	3,0 %	1,4 %	1,9 %	2,5 %	2,0 %	1,4 %
gültige Angaben	3.271	1.591	1.680	860	1.666	746	202	1.905	1.076

Tabelle 11.12:

risiko12 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Ein- oder zweimal Kokain probieren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	74,2 %	70,6 %	77,7 %	61,7 %	77,8 %	80,6 %	75,0 %	76,3 %	71,3 %
gefährlich	18,7 %	21,0 %	16,5 %	25,9 %	16,4 %	15,5 %	16,0 %	17,8 %	20,0 %
nicht so gefährlich	3,6 %	4,4 %	2,9 %	6,2 %	3,4 %	1,1 %	2,5 %	2,9 %	5,2 %
ungefährlich	1,1 %	1,6 %	,7 %	2,9 %	0,7 %	0,1 %	3,0 %	,7 %	1,5 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	2,4 %	2,4 %	2,3 %	3,3 %	1,7 %	2,7 %	3,5 %	2,3 %	2,0 %
gültige Angaben	3.269	1.594	1.675	857	1.666	747	200	1.906	1.074

Tabelle 11.13:

risiko13 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Regelmäßig Kokain konsumieren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	91,9 %	89,5 %	94,2 %	84,3 %	94,7 %	94,2 %	87,1 %	92,4 %	92,2 %
gefährlich	4,9 %	6,2 %	3,7 %	8,9 %	3,4 %	3,9 %	5,0 %	4,7 %	5,1 %
nicht so gefährlich	,8 %	1,3 %	,3 %	2,0 %	0,4 %	0,1 %	,5 %	,8 %	,7 %
ungefährlich	,4 %	,6 %	,2 %	1,4 %	0,1 %	0,0 %	1,5 %	,4 %	,3 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	2,0 %	2,5 %	1,6 %	3,4 %	1,4 %	1,7 %	5,9 %	1,7 %	1,7 %
gültige Angaben	3.268	1.590	1.677	856	1.665	746	202	1.904	1.074

Tabelle 11.14:

risiko14 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Beim Autofahren riskant überholen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	69,8 %	65,2 %	74,2 %	52,3 %	72,1 %	84,9 %	71,8 %	68,5 %	71,1 %
gefährlich	25,6 %	29,0 %	22,4 %	37,3 %	24,9 %	13,9 %	19,3 %	27,2 %	24,7 %
nicht so gefährlich	2,8 %	3,6 %	2,1 %	6,2 %	2,0 %	0,7 %	3,5 %	2,8 %	2,8 %
ungefährlich	,6 %	,9 %	,3 %	1,5 %	0,4 %	0,1 %	1,5 %	,5 %	,7 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,2 %	1,3 %	1,0 %	2,7 %	0,7 %	0,4 %	4,0 %	1,0 %	,7 %
gültige Angaben	3.275	1.596	1.678	857	1.670	746	202	1.907	1.076

Tabelle 11.15:

risiko15 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Nicht auf die Ernährung achten

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	14,0 %	12,8 %	15,1 %	13,0 %	14,0 %	14,9 %	19,9 %	13,7 %	13,7 %
gefährlich	58,0 %	58,6 %	57,5 %	52,7 %	59,9 %	59,9 %	46,3 %	57,3 %	61,7 %
nicht so gefährlich	24,8 %	25,0 %	24,6 %	28,7 %	23,3 %	23,5 %	25,4 %	26,3 %	21,9 %
ungefährlich	1,4 %	1,3 %	1,5 %	2,2 %	1,4 %	0,7 %	4,5 %	1,1 %	1,4 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,8 %	2,4 %	1,3 %	3,4 %	1,3 %	1,1 %	4,0 %	1,7 %	1,3 %
gültige Angaben	3.271	1.590	1.679	856	1.667	746	201	1.902	1.076

Tabelle 11.16:

risiko16 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Zu wenig körperliche Bewegung machen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	15,7 %	16,3 %	15,2 %	15,2 %	16,2 %	15,4 %	17,8 %	15,4 %	16,4 %
gefährlich	56,2 %	55,4 %	57,0 %	52,6 %	56,8 %	59,3 %	55,4 %	55,3 %	57,9 %
nicht so gefährlich	24,9 %	24,5 %	25,3 %	27,0 %	24,3 %	23,6 %	19,8 %	26,2 %	23,6 %
ungefährlich	1,5 %	1,6 %	1,4 %	1,9 %	1,6 %	0,9 %	3,5 %	1,6 %	1,0 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,6 %	2,2 %	1,1 %	3,4 %	1,1 %	0,7 %	3,5 %	1,5 %	1,1 %
gültige Angaben	3.267	1.594	1.673	858	1.668	740	202	1.899	1.076

Tabelle 11.17:

risiko17 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Paragleiten oder Extrembergsteigen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	27,0 %	25,8 %	28,1 %	15,2 %	27,4 %	39,6 %	31,8 %	28,1 %	24,2 %
gefährlich	44,9 %	43,9 %	45,8 %	45,3 %	45,7 %	42,6 %	42,8 %	44,1 %	46,8 %
nicht so gefährlich	22,7 %	24,3 %	21,3 %	29,4 %	22,9 %	14,8 %	17,9 %	22,1 %	24,5 %
ungefährlich	2,7 %	3,4 %	2,1 %	5,7 %	2,1 %	0,7 %	2,0 %	2,9 %	2,7 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	2,7 %	2,6 %	2,7 %	4,3 %	1,9 %	2,4 %	5,5 %	2,7 %	1,8 %
gültige Angaben	3.266	1.592	1.674	854	1.666	745	201	1.901	1.076

Tabelle 11.18:

risiko18 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Vor dem Autofahren ein bisschen mehr trinken als erlaubt ist

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	73,0 %	66,3 %	79,2 %	63,8 %	73,4 %	82,2 %	75,4 %	74,8 %	69,9 %
gefährlich	23,6 %	28,8 %	18,6 %	29,4 %	23,7 %	16,6 %	19,7 %	22,0 %	26,7 %
nicht so gefährlich	1,9 %	2,9 %	,9 %	3,4 %	1,7 %	0,5 %	2,0 %	1,9 %	1,9 %
ungefährlich	,5 %	,8 %	,2 %	1,0 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	,3 %	,6 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,1 %	1,3 %	1,0 %	2,3 %	0,8 %	0,4 %	3,0 %	1,0 %	,7 %
gültige Angaben	3.275	1.596	1.681	860	1.670	748	203	1.906	1.077

Tabelle 11.19:

risiko19 Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach dieses Konsumverhalten bzw. diese Verhaltensweise für die Gesundheit? Im Vollrausch mit dem Auto fahren

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
sehr gefährlich	95,5 %	93,5 %	97,3 %	88,6 %	97,7 %	98,3 %	90,5 %	95,9 %	95,9 %
gefährlich	2,0 %	3,2 %	1,0 %	4,7 %	1,2 %	0,9 %	3,0 %	1,9 %	2,0 %
nicht so gefährlich	1,0 %	1,5 %	,5 %	3,1 %	0,2 %	0,1 %	1,5 %	1,0 %	,8 %
ungefährlich	,3 %	,4 %	,2 %	0,8 %	0,1 %	0,3 %	,5 %	,2 %	,5 %
weiß nicht / kann ich nicht sagen	1,2 %	1,4 %	1,0 %	2,8 %	0,8 %	0,4 %	4,5 %	,9 %	,8 %
gültige Angaben	3.275	1.594	1.681	858	1.672	746	201	1.909	1.075

12 Wissen zu Jugendschutz

Tabelle 12.1:

WELLE 2: schutzalter_bier Kennen Sie die Altersgrenze, ab der man in Ihrem Bundesland laut Gesetz Bier trinken darf?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
12 Jahre	,0 %	,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %
14 Jahre	,8 %	1,0 %	,7 %	0,8 %	0,7 %	1,2 %	0,0 %	,9 %	,8 %
15 Jahre	,2 %	,2 %	,2 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	,5 %	,2 %	,2 %
16 Jahre	66,0 %	68,3 %	63,8 %	83,3 %	68,3 %	40,9 %	47,5 %	63,8 %	74,5 %
17 Jahre	,1 %	,2 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	,5 %	,1 %	0,0 %
18 Jahre	11,9 %	10,4 %	13,2 %	5,0 %	12,3 %	18,7 %	15,8 %	13,0 %	9,2 %
19 Jahre	,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %
20 Jahre	,1 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %
21 Jahre	,0 %	,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %
24 Jahre	,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %
25 Jahre	,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %
weiß ich nicht / kann ich nicht beurteilen	20,8 %	19,7 %	21,9 %	10,6 %	18,1 %	38,8 %	35,6 %	21,9 %	15,0 %
gültige Angaben	3.271	1.592	1.678	858	1.668	743	202	1.904	1.077

Tabelle 12.2:

WELLE 2: schutzalter_wein Kennen Sie die Altersgrenze, ab der man in Ihrem Bundesland laut Gesetz Wein trinken darf?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
12 Jahre	,0 %	,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %
14 Jahre	,6 %	,8 %	,5 %	0,8 %	0,5 %	0,7 %	0,0 %	,7 %	,5 %
15 Jahre	,2 %	,1 %	,2 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,2 %	,1 %
16 Jahre	75,9 %	77,9 %	73,9 %	82,8 %	77,8 %	58,5 %	67,2 %	73,8 %	80,7 %
17 Jahre	,1 %	,2 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %	,8 %	,1 %	0,0 %
18 Jahre	21,0 %	19,3 %	22,6 %	14,9 %	19,1 %	37,0 %	27,5 %	22,6 %	16,9 %
19 Jahre	,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %
20 Jahre	,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %
21 Jahre	,1 %	,2 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %	,1 %	,1 %
24 Jahre	,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %
25 Jahre	,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %
26 Jahre	,0 %	0,0 %	,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %
weiß ich nicht / kann ich nicht beurteilen	1,9 %	1,5 %	2,4 %	1,2 %	1,8 %	3,5 %	4,6 %	2,3 %	1,2 %
gültige Angaben	2.607	1.290	1.317	773	1.374	460	131	1.497	922

Tabelle 12.3:

WELLE 2: schutzalter_spirituosen Kennen Sie die Altersgrenze, ab der man in Ihrem Bundesland laut Gesetz Spirituosen trinken darf?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
14 Jahre	,1 %	,2 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,4 %	0,0 %	,1 %	,1 %
15 Jahre	,1 %	,2 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %
16 Jahre	8,1 %	7,7 %	8,5 %	3,4 %	7,7 %	17,4 %	9,8 %	9,0 %	6,4 %
17 Jahre	,0 %	,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	,1 %
18 Jahre	87,6 %	88,4 %	86,8 %	94,8 %	88,1 %	73,8 %	86,4 %	87,2 %	88,5 %
19 Jahre	,3 %	,4 %	,2 %	0,0 %	0,2 %	0,9 %	0,0 %	,2 %	,4 %
20 Jahre	,4 %	,2 %	,7 %	0,0 %	0,1 %	2,0 %	,8 %	,2 %	,6 %
21 Jahre	,9 %	1,1 %	,8 %	0,9 %	1,2 %	0,2 %	,8 %	,7 %	1,4 %
22 Jahre	,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
24 Jahre	,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %
25 Jahre	,0 %	0,0 %	,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	,1 %
weiß ich nicht / kann ich nicht beurteilen	2,3 %	1,8 %	2,9 %	0,9 %	2,2 %	5,2 %	2,3 %	2,4 %	2,3 %
gültige Angaben	2.636	1.307	1.330	774	1.403	461	132	1.512	937

Tabelle 12.4:

WELLE 2: schutzalter_ Wie sicher sind Sie sich in Bezug auf Ihre Angaben betreffend diese Altersgrenzen?

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Sehr sicher, ich weiß es.	12,4 %	15,6 %	9,5 %	23,0 %	9,5 %	4,0 %	17,9 %	11,7 %	12,8 %
eher sicher	61,7 %	62,5 %	61,0 %	65,9 %	63,3 %	50,3 %	55,2 %	62,6 %	61,3 %
eher unsicher	23,7 %	20,9 %	26,4 %	10,0 %	25,6 %	40,5 %	23,9 %	23,4 %	24,2 %
Komplett unsicher, ich habe geraten.	2,1 %	1,0 %	3,2 %	1,2 %	1,6 %	5,2 %	3,0 %	2,3 %	1,7 %
gültige Angaben	2.671	1.318	1.353	782	1.412	477	134	1.534	942